

Meccanismi di difesa — Prontuario sintetico

Definizione generale

I **meccanismi di difesa** sono risposte **automatiche, inconsce** e attivate dall'**Io** per proteggere la persona dall'angoscia.

Punto fondamentale: non difendono necessariamente dal pericolo reale, ma dall'angoscia che quel pericolo genera.

Esempio: se una persona nega un problema di salute, il diniego può ridurre l'angoscia, ma non elimina il problema reale.

Come si valutano

Secondo Anna Freud, un meccanismo di difesa va valutato con tre criteri:

1. **Adeguatezza all'età**: è normale in quella fase di sviluppo?
2. **Intensità**: quanto distorce la realtà?
3. **Equilibrio**: la persona usa difese diverse o sempre la stessa?

Un meccanismo primitivo in un bambino può essere normale. Lo stesso meccanismo, se dominante in un adulto, segnala spesso un'angoscia molto alta.

Difese primitive

Le difese primitive compaiono precocemente nello sviluppo. Sono molto efficaci nel ridurre l'angoscia, ma distorcono molto la realtà.

Ritiro primitivo

La persona si ritira dal contatto con una realtà vissuta come troppo stimolante o minacciosa.

Esempio: un bambino sovrastimolato che si addormenta durante una festa rumorosa. Nell'adulto può comparire come fuga nel sonno, nelle sostanze, nei videogiochi o in mondi fantastici.

Diniego

La persona non riconosce una realtà angosciante, come se non esistesse.

Esempio: un genitore che non riesce a vedere la dipendenza del figlio, anche se i segnali sono evidenti.

Differenza importante: nella rimozione qualcosa viene prima percepito e poi "dimenticato"; nel diniego la realtà angosciante non viene proprio riconosciuta.

Proiezione

La persona attribuisce ad altri pensieri, emozioni o impulsi propri che non riesce a tollerare.

Esempio: una persona molto arrabbiata dice “ce l’hanno tutti con me”, senza riconoscere la propria aggressività.

Introiezione

La persona fa proprie caratteristiche, atteggiamenti o valori dell’altro.

Esempio: un bambino che imita il modo di parlare o agire di un adulto significativo.

Forma estrema: **identificazione con l’aggressore**, quando la vittima assume tratti dell’aggressore per sentirsi meno impotente.

Identificazione proiettiva

La persona proietta un proprio vissuto sull’altro e agisce nella relazione in modo da farlo provare davvero all’altro.

Esempio: un utente si sente fallito e frustrato, poi fa fallire ogni progetto dell’operatore fino a far provare anche a lui frustrazione, impotenza e rabbia.

Nel lavoro sociale è importante riconoscerla, perché alcune emozioni dell’operatore possono essere “indotte” dalla relazione.

Scissione

La realtà viene divisa in tutto buono o tutto cattivo, senza sfumature.

Esempio: un operatore è visto prima come perfetto e salvifico, poi come completamente inutile o cattivo.

È normale nei bambini piccoli; nell’adulto, se rigida e frequente, indica difficoltà a integrare aspetti positivi e negativi della stessa persona.

Idealizzazione

La persona attribuisce qualità esageratamente positive a qualcuno, per sentirsi protetta o al sicuro.

Esempio: “Lei è l’unico operatore che mi capisce davvero, tutti gli altri non valgono niente”.

Attenzione: idealizzazione forte spesso segnala angoscia. Può rovesciarsi rapidamente in svalutazione.

Svalutazione

La persona riduce drasticamente il valore dell’altro, spesso dopo una delusione o una frustrazione.

Esempio: dopo un limite posto dall'operatore, l'utente passa da "lei è bravissimo" a "lei non capisce niente".

Controllo onnipotente

La persona tenta di controllare tutto per ridurre l'angoscia e il senso di fragilità.

Esempio: una persona che pretende di decidere ogni dettaglio della relazione o del progetto perché l'imprevisto è vissuto come intollerabile.

Difese secondarie o mature

Le difese secondarie compaiono più tardi nello sviluppo. Sono più complesse, distorcono meno la realtà e mantengono un maggiore contatto con il conflitto.

Rimozione

La persona sposta nell'inconscio pensieri, ricordi o affetti angoscianti.

Esempio: dimenticare un episodio doloroso o non riuscire a ricordare un contenuto emotivamente troppo pesante.

Dissociazione

La persona vive una discontinuità nell'esperienza, nella memoria, nel corpo o nella percezione. È frequente nei traumi.

Esempio lieve: fissare il vuoto e "staccare" per qualche minuto.

Esempio grave: durante un abuso, sentirsi come fuori dal proprio corpo.

Formazione reattiva

Un'emozione inaccettabile viene trasformata nel suo opposto esagerato.

Esempio: un bambino geloso del fratellino appena nato diventa eccessivamente premuroso e protettivo verso di lui.

Spostamento

Un'emozione viene spostata da un oggetto minaccioso a uno meno pericoloso.

Esempio: una persona arrabbiata con il capo torna a casa e litiga con il partner o con i figli.

Capovolgimento

Un bisogno passivo viene trasformato in comportamento attivo.

Esempio: "Vorrei essere accudito" diventa "accudisco sempre gli altri".

Isolamento degli affetti

La persona separa il contenuto emotivo da quello cognitivo. Racconta un fatto doloroso senza contatto emotivo.

Esempio: parlare di un lutto con tono freddo, tecnico, quasi come se riguardasse qualcun altro.

Intellettualizzazione

La persona affronta un contenuto emotivo attraverso ragionamenti astratti, teorici o tecnici, evitando il vissuto.

Esempio: parlare della propria malattia solo in termini medici, statistiche e diagnosi, senza nominare paura o tristezza.

Razionalizzazione

La persona costruisce una spiegazione logica per rendere accettabile qualcosa che emotivamente fa male.

Esempio: “Non mi interessava davvero quel lavoro” dopo non essere stati assunti.

Esempio classico: la volpe che non arriva all’uva e dice che tanto era acerba.

Compartimentalizzazione

Due dimensioni incompatibili della vita psichica restano separate, senza entrare in contatto.

Esempio: una persona si considera molto corretta e morale, ma in un altro ambito agisce in modo contrario ai propri valori, senza percepire contraddizione.

Non è necessariamente ipocrisia consapevole: le due parti restano in “stanze separate”.

Annullamento retroattivo

La persona compie un gesto o un pensiero per “cancellare” simbolicamente qualcosa che ha fatto o pensato.

Esempio: dopo un pensiero aggressivo, ripete un gesto rituale per neutralizzarlo. È frequente nella logica ossessiva.

Umorismo

La persona resta in contatto con una realtà dolorosa, ma riesce a trasformarla in qualcosa di comunicabile e condivisibile.

Esempio: un paziente che riesce a fare una battuta sulla propria condizione senza negarla.

È considerato uno dei meccanismi più maturi, perché non cancella il problema: lo rende pensabile.

Sublimazione

Un impulso o un'energia interna viene trasformata in un'attività socialmente accettata e creativa.

Esempio: trasformare aggressività o dolore in sport, arte, impegno sociale o lavoro creativo.

Altruismo

La persona gestisce una propria sofferenza aiutando gli altri in modo realistico e non fusivo.

Esempio: una persona che ha vissuto una perdita si impegna in un'associazione di sostegno, senza negare il proprio dolore.

Scala sintetica di maturità

Livello	Tipo di difesa	Esempi
0	Rottura con la realtà	Negazione psicotica, distorsione psicotica, proiezione delirante
1	Difese di azione istintiva	Acting out, scissione
2	Difese borderline	Scissione, identificazione proiettiva
3	Difese di disconoscimento	Diniego, proiezione, denegazione
4	Difese narcisistiche	Idealizzazione, svalutazione, onnipotenza
5	Difese nevrotiche	Rimozione, formazione reattiva, spostamento
6	Difese ossessive	Isolamento degli affetti, intellettualizzazione, annullamento retroattivo
7	Difese mature	Umorismo, sublimazione, altruismo, affiliazione

Collegamento con le aree cliniche

Nevrosi

Angoscia prevalente: **angoscia di castrazione**, cioè paura del limite, della perdita, della prestazione.

Difese frequenti: rimozione, formazione reattiva, spostamento, isolamento degli affetti.

Organizzazione borderline

Angoscia prevalente: **angoscia di abbandono**.

Difese frequenti: scissione, identificazione proiettiva, idealizzazione e svalutazione.

Psicosi

Angoscia prevalente: **angoscia di frammentazione**, cioè paura di perdere l'unità del sé e il contatto con la realtà.

Difese frequenti: negazione psicotica, distorsione psicotica, proiezione delirante.

Frase da ricordare per l'esame

I meccanismi di difesa non sono “bugie” consapevoli: sono strategie inconscie dell'Io per ridurre l'angoscia. Più una difesa è primitiva, più riduce rapidamente l'angoscia ma distorce la realtà. Più è matura, più permette di restare in contatto con il conflitto e di elaborarlo.