

Dalla Paura alle Difese — Schema

Salute Mentale · Sessione 04



Mito: Perseo e Medusa

- **Medusa** → paura per antonomasia; pietrifica chi la guarda direttamente
- **Perseo** → si attrezza prima di affrontarla
 - Sacco, calzari alati, elmo dell'invisibilità (dagli inferi)
 - **Scudo-specchio** da Atena (dea della sapienza) → guarda Medusa di riflesso
 - Falcetto da Hermes → taglia la testa
- **Azione** → aspetta che dorma, la guarda di riflesso, la decapita
- **Dopo** → testa = risorsa per affrontare future minacce e aiutare altri

3 lezioni psicologiche:

- **Lezione 1** → paure si affrontano con preparazione adeguata
- **Lezione 2** → serve un medium (specchio/riflessione) per non essere travolti
- **Lezione 3** → paure elaborate diventano capitale per sé e per gli altri (non empatia egocentrica)

Il punto di vista di Medusa (**Ovidio**):

- Medusa era bellissima → stuprata da Poseidone nel tempio di Atena
 - **Atena trasforma la vittima** in mostro (non l'aggressore)
 - Medusa non aggredisce → pericolosa solo se ci vai tu
 - **Applicazione** → utenti "mostri" spesso = persone trasformate da ciò che hanno subito
-

⚡ Filiera della paura

Minaccia → Valutazione protocognitiva → PAURA → Fuga → Protezione

- **Valutazione** → automatica, inconscia, veloce (può sbagliare)
- **Tre risposte etologiche** → fuga · attacco (quando fuga impossibile) · mimetismo
- **Paura = emozione** → ha oggetto, durata breve, risposta comportamentale, scopo (salvezza)

Quando non funziona:

- **Intensità eccessiva** → freezing (blocco: sopra soglia di arousal si paralizza)
- **Durata eccessiva** → esaurimento risorse, uso sostanze

Schema contesto × minaccia (Pezzoli):

	Ambiente familiare	Ambiente non familiare
Minaccia presente	Area di pericolo	⚠ Area di massimo allarme
Minaccia assente	Area di comfort	Area di attenzione

🔍 Paura · Ansia · Sorpresa · Angoscia

- **Paura** → oggetto specifico · minaccia presente · durata breve · amigdala
- **Ansia** → nessun oggetto · proiettata nel futuro · durata prolungata · BNST
 - Ansia = paura + anticipazione (Plutchik)
 - **Ansia normale**: limitata, gestibile, proporzionata
 - **Ansia patologica**: intensa, frequente, compromette funzionalità
- **Sorpresa** → evento inaspettato · domanda "che cos'è?" · risposta: stop · scopo: prendere tempo
 - Se la risposta è "è una minaccia" → parte la paura
- **Angoscia** → termine freudiano: angoscia reale = paura; angoscia nevrotica = ansia

Fonti di angoscia (Freud, *Il disagio della civiltà*, 1930)

- **Corpo** → si ammala, deperisce, può non piacerci
- **Natura** → terremoti, catastrofi, forze esterne
- **Relazioni** → la più importante; può distruggere o salvare

Metafora **porcospini di Schopenhauer** → distanza giusta: né troppo fredda né troppo pungente; soggettiva, cambia nel tempo

Meccanismi di difesa (MDD)

Definizione → risposta automatica, inconscia, attivata dall'Io sotto pressione dell'angoscia

- **Non** sono strategie coscienti (quello è il coping)
- **Scopo** → difendono dall'angoscia, non dal pericolo
- **Si sviluppano** progressivamente: primitivi prima, maturi dopo

3 criteri di valutazione (Anna Freud):

- **Age adequateness** → adeguato all'età?
- **Intensity** → grado di distorsione della realtà
- **Balance** → varietà d'uso vs. rigidità

Regola operativa → MDD primitivi in un adulto = alta angoscia del soggetto

MDD Primitivi (alta distorsione realtà · comparsa precoce)

- **Ritiro primitivo** → disattiva il contatto con realtà sovrastimolante
 - **Bambino:** si addormenta · **Adulto:** sostanze, videogiochi, mondi paralleli
 - Dominanza nell'adulto → personalità schizoide

- **Diniego** → non vede (percettivamente) ciò che genera angoscia
 - Più radicale della rimozione: non c'è nemmeno contatto iniziale
 - Esempio letterario: Pollyanna (E.H. Porter, 1913)
 - **Proiezione** → attribuisce ad altri propri stati interni insostenibili
 - **Introiezione** → fa proprie caratteristiche dell'altro
 - Forma estrema: identificazione con l'aggressore
 - **Identificazione proiettiva** → agisce nella relazione per far provare all'altro ciò che ha proiettato
 - Richiede contatto diretto · molto presente nei disturbi di personalità
 - **Scissione** → mondo diviso buono/cattivo, senza sfumature
 - Klein: posizione schizoide → posizione depressiva (tollerare l'ambivalenza)
 - **Idealizzazione** → amplifica qualità positive per ridurre angoscia
 - **Svalutazione** → speculare all'idealizzazione (si attiva quando l'altro "delude")
 - **Controllo onnipotente** → necessità di controllare tutto; cela fragilità interna
 - Basi: egocentrismo primitivo (Piaget) + narcisismo primario (Freud)
-

● MDD Secondari/Maturi (minore distorsione · maggiore complessità)

Dimenticare:

- **Rimozione** → sposta nell'inconscio pensieri/affetti dopo contatto iniziale
- **Dissociazione** → discontinuità nell'esperienza mnestica/sensoriale; legata ai traumi

Spostare:

- **Formazione reattiva** → trasforma affetto negativo nel suo opposto esagerato
- **Spostamento** → sposta obiettivo dell'emozione su qualcosa di meno "pericoloso"

- **Capovolgimento** → inverte passivo/attivo ("vorrei ricevere → do")

Separare:

- **Isolamento degli affetti** → separa componente emotiva da quella cognitiva
- **Intellettualizzazione** → descrive emozioni senza entrarci in contatto
- **Razionalizzazione** → costruisce spiegazioni razionali per evitare impatto emotivo
- **Moralizzazione** → dà cornice etico-morale per non sentire
- **Compartimentalizzazione** → due sistemi cognitivi incompatibili non entrano mai in contatto

Maturo:

- **Umorismo** → mantiene contatto col problema; trasforma l'angoscia in ironia condivisibile



Scala di maturità dei MDD (Perrotta 2020, adatt. Pezzoli)

Livello	Tipo	Esempi
7°	Difese mature	Altruismo, umorismo, sublimazione, affiliazione
6°	Difese ossessive	Annullamento retroattivo, intellettualizzazione, isolamento affetti
5°	Difese nevrotiche	Rimozione, formazione reattiva, spostamento
4°	Difese narcisistiche	Idealizzazione, svalutazione, onnipotenza
3°	Difese di disconoscimento	Diniego, proiezione, denegazione
2°	Difese borderline	Scissione, identificazione proiettiva
1°		Acting-out

Livello	Tipo	Esempi
	Difese di azione istintiva	
o	Rottura con la realtà	Negazione psicotica, distorsione psicotica, proiezione delirante

Angosce per area clinica:

- **Nevrosi** → angoscia di castrazione (limite, prestazione)
- **Psicosi** → angoscia di frammentazione (identità, unità del sé)
- **Borderline** → angoscia di abbandono

Autori / Date / Riferimenti

Chi	Cosa	Quando
Charles Darwin	<i>L'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali</i>	1872
Sigmund Freud	Concetto di "difesa" introdotto	1894
Sigmund Freud	<i>Introduzione alla psicoanalisi</i> (angoscia e freezing)	1915
Sigmund Freud	<i>Il disagio della civiltà</i> (tre fonti di angoscia)	1930
Anna Freud	<i>L'Io e i meccanismi di difesa</i>	1936
Ovidio	<i>Metamorfosi</i> libro IV (storia di Medusa)	~8 d.C.
Schopenhauer	Metafora dei porcospini (<i>Parerga e paralipomena</i>)	1851
Mélanie Klein	Posizione schizoide e depressiva	XX sec.
Plutchik	Modello delle emozioni (catena paura, ansia)	2017 ed.
Grillon	Sistemi neurali paura (amigdala) vs. ansia (BNST)	2008

Chi	Cosa	Quando
Biondi	Criteri ansia normale vs. patologica	1996
Oliverio Ferraris	Paure etologiche, solitudine, buio, intensità/ durata	1998
Vaillant	MDD come processi regolatori involontari	1994
Lingiardi & Madeddu	Criteri valutazione MDD	1994
Perrotta	Potenziale disadattivo dei MDD	2020
L. Pezzoli	Schema contesto × minaccia; elaborazione filiera emozioni	2026

Parole chiave

paura · ansia · angoscia · freezing · arousal · amigdala · BNST ·
 filiera emotiva · meccanismi di difesa · age adequateness ·
 ritiro primitivo · diniego · proiezione · introiezione ·
 identificazione proiettiva · scissione · idealizzazione ·
 svalutazione · controllo onnipotente · rimozione · dissociazione
 · formazione reattiva · spostamento · isolamento degli affetti ·
 razionalizzazione · compartimentalizzazione · umorismo · acting-
 out · Medusa · Perseo · empatia egocentrica · angoscia di
 castrazione · angoscia di frammentazione · angoscia di
 abbandono