

a
184 feeding genes
0 with q < 0.1
Uts2b
Pparg
Ugcg
Pnoc
Dsp
Acacb
Lepr
Nodose log2FC, HFD/fed
(length-adjusted)
DRG log2FC, HFD/control
(12 + 36 wk combined)
Fasting opposite to nodose HFD
Fasting same direction
All other genes
b
DRG 12 wk
DRG 36 wk
Nav1.8 TRAP
Nodose HFD
Nodose early P21
SCG obese*
Stellate obese*
Nodose fasted
Pparg ↑ P=0.024
Ugcg ↑ P=0.032
Acacb ↓ P=0.12
Insr ↓ P=0.14
Crhr2 ↑ P=0.16
Twist1 ↓ P=0.18
Oprm1 ↓ P=0.19
Enpp1 ↓ P=0.21
Cnr1 ↓ P=0.25
Fbn1 ↓ P=0.26
Ubr3 ↓ P=0.26
Sgip1 ↓ P=0.27
Ace ↓ P=0.28
Tacr3 ↓ P=0.33
Agtr1a ↑ P=0.34
Pomc ↑ P=0.34
Lepr – P=1
Uts2b – P=1
Pnoc ↓ P=0.89
Oprl1 – P=1
log2 fold change (clipped at ±1.5)
○ nominal P < 0.05 × not expressed / absent · within lean between-run difference
* sympathetic: obese pool vs lean pools, diet confounded with run (descriptive)
c
DRG 12 wk
DRG 36 wk
Nodose HFD
Pparg
Cidea
Cidec
Fabp4
Plin1
Cfd
Pck1
Adipocyte markers