
a
D. amphileucus
D. gvnigeusgwotli
D. aureatus
D. mavrokoilius
D. marmoratus
28%
D. kanawha
D. intermedius
D. monticola
D. conanti
D. balsameus
D. adatsihi
D. abditus
D. tilleyi
D. carolinensis
D. cheaha
D. orestes
D. welteri
D. apalachicolae
D. santeetlah
D. valentinei
D. auriculatus
D. pascagoula
D. valtos
D. fuscus
D. bairdi
D. organi
35%
D. wrighti
D. aeneus
D. perlapsus
D. ocoee
D. lycos
D. anicetus
D. campi
D. catahoula
TE-composition topology (fitted branch lengths omitted; not a species phylogeny)
b
Aquatic eggs
55/200
Terrestrial eggs + aquatic larvae
2/200
Direct development
70/200
0%
25%
50%
Exact-edge recovery
(200 feature refits; 95% CI)
c
Reproductive strategy
PERMANOVA R² = 0.260; P = 1 × 10⁻⁵
PERMDISP P = 0.707
Observed = 2
Null mean = 9.41
0
2
4
6
8
10
Fitch steps (99,999 permutations;
P = 1 × 10⁻⁵)
Aquatic eggs
Terrestrial eggs + aquatic larvae
Direct development