

a
Phylogeny + reproductive strategy
D. anicetus
D. tilleyi
D. campi
D. monticola
D. apalachicolae
D. ocoee
D. perlapsus
D. fuscus
D. valtos
D. bairdi
D. auriculatus
D. welteri
D. orestes
D. intermedius
D. mamoratus
D. kanawha
D. mavrokoilius
D. aeneus
D. gvnigeusgwotli
D. amphileucus
D. wrighti
b
Estimated genome size
15.5
16.7
14.9
16.9
15.7
16.8
14.4
16.5
22.7
18.8
17.8
15.1
14.2
18.1
18.0
17.2
15.6
9.6
15.5
17.5
14.8
10 18 26
pg/1C*
c
Broad TE composition
0% 50% 100%
Classified base share
d
TE superfamilies 0–70% classified bases
1 2 3 4 5 6 7 8 9
e
Divergence profiles 0–3% aligned hit bp / bin
LTR
LINE
TIR
0 25 50
Sequence divergence (%)
Reproduction
Aquatic eggs
Terrestrial eggs + aquatic larvae
Direct development
TE order
LTR
LINE
TIR
Other
TE superfamily
1 Gypsy
2 hAT
3 L2
4 DIRS
5 L1
6 PIF-Harbinger
7 Mutator
8 Tc1-mariner
9 CACTA