
a
TE-composition topology
D. amphileucus
D. gvnigeusgwotli
D. aureatus
D. mavrokoilius
D. marmoratus
27.5%
D. kanawha
D. intermedius
D. monticola
D. conanti
D. balsameus
D. adatsihi
D. abditus
D. tilleyi
D. carolinensis
D. cheaha
D. orestes
D. welteri
D. apalachicolae
D. santeetlah
D. valentinei
D. auriculatus
D. pascagoula
D. valtos
D. fuscus
D. bairdi
D. organi
D. wrighti
35.0%
D. aeneus
D. perlapsus
D. ocoee
D. lycos
D. anicetus
D. campi
D. catahoula
Fitted branch lengths omitted;
not a species phylogeny
b
Feature-resampling stability
Aquatic eggs
55/200
Terrestrial eggs +
aquatic larvae
2/200
Direct development
70/200
0%
50%
100%
Exact-edge recovery
(200 feature refits; 95% interval)
c
Strategy association
Reproductive strategy
PERMANOVA R² = 0.260; P = 0.00001
PERMDISP P = 0.707
Observed = 2
Null mean = 9.41
0
2
4
6
8
10
Fitch steps (99,999 permutations;
P = 0.00001)
Aquatic eggs
Terrestrial eggs + aquatic larvae
Direct development