

a
LTR terminal-to-internal depth distributions
D. conanti
D. anicetus
D. carolinensis
D. tilleyi
D. santeetlah
D. campi
D. adatsihi
D. balsameus
D. cheaha
D. monticola
D. apalachicolae
D. ocoee
D. perlapsus
D. pascagoula
D. valentinei
D. fuscus
D. bairdi
D. auriculatus
D. welteri
D. abditus
D. orestes
D. intermedius
D. marmoratus
D. mavrokoilius
D. aeneus
D. aureatus
D. gvnigeusgwotli
D. amphileucus
D. organi
D. wrighti
n/a / 8
15.5 / 7
n/a / 7
16.7 / 50
n/a / 15
14.9 / 15
n/a / 11
n/a / 11
n/a / 9
16.9 / 11
15.7 / 4
16.8 / 8
14.4 / 12
n/a / 3
n/a / 19
16.5 / 13
18.8 / 9
17.8 / 6
15.1 / 22
n/a / 32
14.2 / 10
18.1 / 11
18.0 / 4
15.6 / 7
9.6 / 13
n/a / 12
15.5 / 11
17.5 / 11
n/a / 14
14.8 / 15
Genome size (pg/1C) / elements (n)
0.025
0.05
0.1
0.25
0.5
1
1.5
Terminal-to-internal depth ratio (log2 scale)
b
Species median ratio and genome size
1.50
1.00
0.50
0.25
Median depth ratio (log10 scale)
9
12
15
18
22
Genome size (pg/1C; log10 scale)
Aquatic eggs
Terrestrial eggs + aquatic larvae
Direct development