


a
LTR depth distributions across 30 species
D. conanti
D. anicetus
D. carolinensis
D. tilleyi
D. santeetlah
D. campi
D. adatsihi
D. balsameus
D. cheaha
D. monticola
D. apalachicolae
D. ocoee
D. perlapsus
D. pascagoula
D. valentinei
D. fuscus
D. bairdi
D. auriculatus
D. welteri
D. abditus
D. orestes
D. intermedius
D. marmoratus
D. mavrokoilius
D. aeneus
D. aureatus
D. gvnigeusgwotli
D. amphileucus
D. organi
D. wrighti
n/a / 8
15.5 / 7
n/a / 7
16.7 / 50
n/a / 15
14.9 / 15
n/a / 11
n/a / 11
n/a / 9
16.9 / 11
15.7 / 4
16.8 / 8
14.4 / 12
n/a / 3
n/a / 19
16.5 / 13
18.8 / 9
17.8 / 6
15.1 / 22
n/a / 32
14.2 / 10
18.1 / 11
18.0 / 4
15.6 / 7
9.6 / 13
n/a / 12
15.5 / 11
17.5 / 11
n/a / 14
14.8 / 15
Estimated genome size (pg/1C) / elements (n)
0.025
0.05
0.1
0.25
0.5
1
1.5
LTR terminal-to-internal depth ratio (log2 scale; 1 = equal depth)
Points: 380 elements. Blue: median and 95% bootstrap interval. n/a: genome size unavailable.


b
No detectable association with estimated genome size
PGLS: n = 19 species; lambda < 0.001
Slope = 0.024 (95% CI -0.561 to 0.609); P = 0.931
Species median LTR depth ratio (log10 scale)
1.50
1.00
0.80
0.60
0.40
0.25
D. amphileucus
D. wrighti
D. fuscus
D. auriculatus
D. campi
D. orestes
D. intermedius
D. aeneus
D. monticola
D. mavrokoilius
D. ocoee
D. welteri
D. bairdi
D. perlapsus
D. tilleyi
D. anicetus
D. marmoratus
D. apalachicolae
D. gvnigeusgwotli
9
12
15
18
22
Estimated genome size (pg/1C; log10 scale)
Blue line and band: PGLS fit and 95% coefficient interval. Gray bars: measurement intervals.
Dotted line: equal terminal and internal depth. Genome sizes: assembly-anchored IOD estimates.