

a
LTR depth distributions across 30 species
D. conanti
D. anicetus
D. carolinensis
D. tilleyi
D. santeetlah
D. campi
D. adatsihi
D. balsameus
D. cheaha
D. monticola
D. apalachicolae
D. ocoee
D. perlapsus
D. pascagoula
D. valentinei
D. fuscus
D. bairdi
D. auriculatus
D. welteri
D. abditus
D. orestes
D. intermedius
D. marmoratus
D. mavrokoilius
D. aeneus
D. aureatus
D. gvnigeusgwotli
D. amphileucus
D. organi
D. wrighti
n/a / 8
15.5 / 7
n/a / 7
16.7 / 50
n/a / 15
14.9 / 15
n/a / 11
n/a / 11
n/a / 9
16.9 / 11
15.7 / 4
16.8 / 8
14.4 / 12
n/a / 3
n/a / 19
16.5 / 13
18.8 / 9
17.8 / 6
15.1 / 22
n/a / 32
14.2 / 10
18.1 / 11
18.0 / 4
15.6 / 7
9.6 / 13
n/a / 12
15.5 / 11
17.5 / 11
n/a / 14
14.8 / 15
Estimated genome size (pg/1C) / elements (n)
0.025
0.05
0.1
0.25
0.5
1
1.5
LTR terminal-to-internal depth ratio (log2 scale; 1 = equal depth)
Points: 380 elements. Blue: median and 95% bootstrap interval. n/a: genome size unavailable.