

**FY1001/TFY4109/TFY4145. Institutt for fysikk, NTNU. Høsten 2015.**  
**Løsningsforslag til Test 12.**

**Oppgave 1**

Tyngdekraften har komponent  $mg \sin \alpha$  nedover parallelt med skråplanet. Normalkraften fra underlaget er lik tyngdekraftens normalkomponent  $mg \cos \alpha$ , siden det ikke er noen akselerasjon normalt på skråplanet. Når klossen glir, er det kinetisk friksjon, med friksjonskraft  $f = \mu N = \mu mg \cos \alpha$ . Med konstant hastighet er  $f = mg \sin \alpha$ , dvs  $\mu = \tan \alpha$ . Riktig svar: D.

**Oppgave 2**

Klossen starter med mekanisk energi

$$E = mgh + mv_0^2/2 = mgL \sin \alpha + mv_0^2/2.$$

Den har mistet all denne mekaniske energien, dvs  $E$  tilsvarer friksjonsarbeidet

$$W_f = fL = \mu mgL \cos \alpha.$$

Dermed er

$$\mu = E/mgL \cos \alpha = \tan \alpha + v_0^2/2gL \cos \alpha.$$

Riktig svar: E.

**Oppgave 3**

Total impuls er bevart i kollisjonen:  $mv_0 = 2mv$ , dvs  $v = v_0/2$ . Riktig svar: A.

**Oppgave 4**

$|\Delta K| = mv_0^2/2 - 2mv^2/2 = mv_0^2/2 - mv_0^2/4 = mv_0^2/4$ . Riktig svar: C.

**Oppgave 5**

De to massene snur i høyden  $h = L(1 - \cos \beta)$ . Der er potensiell energi lik  $2mgh$  og kinetisk energi null. Energibevarelse etter at kollisjonen er over gir da

$$mv_0^2/4 = mgh = mgL(1 - \cos \beta) \Rightarrow \beta = \arccos(1 - v_0^2/8gL).$$

Riktig svar: B.

**Oppgave 6**

Matematisk pendel med lengde  $L$  og små utsving:  $\omega_0 = \sqrt{g/L}$ , dvs  $T = 2\pi/\omega_0 = 2\pi\sqrt{L/g}$ . Riktig svar: A.

**Oppgave 7**

De fire punktmassene er alle i avstand  $d$  fra aksene, med  $d^2 = (a/2)^2 + (a/2)^2 = a^2/2$ . Dermed er  $I_0 = 4ma^2/2 = 2ma^2$ . Riktig svar: B.

**Oppgave 8**

Steiners sats, med en parallellforskyvning av aksene en lengde  $a/2$ , gir  $I_1 = I_0 + 4m(a/2)^2 = 2ma^2 + ma^2 = 3ma^2$ . Riktig svar: C.

**Oppgave 9**

Steiners sats, med en parallellforskyvning av aksene en lengde  $a/\sqrt{2}$ , gir  $I_2 = I_0 + 4m(a/\sqrt{2})^2 = 2ma^2 + 2ma^2 = 4ma^2$ . Riktig svar: D.

**Oppgave 10**

Energibevarelse gir

$$mgh = mv^2/2 + MV^2/2 = mv_x^2/2 + mv_y^2/2 + MV^2/2,$$

og impulsbevarelse horisontalt gir

$$mv_x = MV.$$

En tredje ligning får vi ved å bruke at  $m$  hele veien ned befinner seg på skråplanet, slik at en forflytning av  $m$  med  $dx$  horisontalt og en forflytning av  $M$  motsatt vei med  $dX$  må innebære en vertikal forflytning av  $m$  med  $dy = dx + dX$  (der alle størrelser regnes positive). Divisjon med  $dt$  gir  $v_y = v_x + V$ . Nå har vi 3 ligninger for 3 ukjente ( $v_x$ ,  $v_y$  og  $V$ ), og løsning mhp  $V$  gir

$$V = \sqrt{2gh \frac{1}{(1 + M/m)(1 + 2M/m)}}.$$

Riktig svar: C.

### Oppgave 11

Tilsvarende som i oppgave 10, men nå har  $m$  (ringen) kinetisk energi

$$K_m = mv^2/2 + I_0\omega^2/2 = mv^2/2 + (mr^2)(v/r)^2/2 = mv^2/2 + mv^2/2 = mv^2.$$

Energibevarelse gir da

$$mgh = mv_x^2 + mv_y^2 + MV^2/2.$$

Ellers likt, slik at svaret blir

$$V = \sqrt{gh \frac{1}{1 + 5M/2m + 2M^2/m^2}}.$$

Riktig svar: D.

### Oppgave 12

Kortvarig støtkraft  $F$  tilsier at friksjonskraften  $f$  fra underlaget kan neglisjeres gjennom støtet med varighet  $\Delta t$ . Newtons 2. lov gir  $F\Delta t = \Delta p = p = MV_0$ . Newtons 2. lov for rotasjon, om akse gjennom CM, gir  $\tau\Delta t = \Delta L = I_0\Delta\omega = I_0\omega_0$ . Støtkraften  $F$  angriper kuleskallet i høyde  $H - R$  over sentrallinjen og virker dermed på kuleskallet med et dreiemoment  $\tau = F(H - R)$  mhp aksene gjennom CM. Videre er  $I_0\omega_0 = (2MR^2/3)(V_0/R) = 2MRV_0/3$  ved ren rulling. Dermed:

$$\frac{MV_0}{\Delta t} \cdot (H - R)\Delta t = 2MRV_0/3 \Rightarrow H - R = 2R/3,$$

dvs  $H = 5R/3$ . Riktig svar: E.

### Oppgave 13

Indre dreieimpuls (spinn):

$$L_s = I_0\omega_0 = \frac{2}{3}MR^2 \cdot \frac{V_0}{R} = \frac{2}{3}MRV_0.$$

Banedreieimpuls:

$$L_b = |\mathbf{R}_{CM} \times M\mathbf{V}_0| = MRV_0.$$

Som vektorer peker disse to i samme retning, slik at total dreieimpuls blir  $L = 5MRV_0/3$ . Riktig svar: A.

### Oppgave 14

$$L_b = MRV = 4.87 \cdot 10^{24} \cdot 108 \cdot 10^9 \cdot 35.2 \cdot 10^3 = 1.85 \cdot 10^{40} \text{ kgm}^2/\text{s}.$$

Riktig svar: D.

### Oppgave 15

$$L_s \simeq \frac{2}{5}MR_0^2\omega_0,$$

som med  $M = 4.87 \cdot 10^{24}$  kg,  $R_0 = 6052 \cdot 10^3$  m og  $\omega_0 = 2\pi/T_s = 2\pi/(243 \cdot 24 \cdot 3600)$  pr sekund gir  $L_s = 2.14 \cdot 10^{31}$  kgm<sup>2</sup>/s. Riktig svar: B.

### Oppgave 16

$$\begin{aligned} v_1 &= \sqrt{10 \cdot 5.0 / 0.050} \text{ m/s} = 31.62 \text{ m/s} \\ v_2 &= \sqrt{20 \cdot 6.0 / 0.050} \text{ m/s} = 48.99 \text{ m/s} \end{aligned}$$

Prosentvis økning:

$$\frac{v_2 - v_1}{v_1} = 0.55 = 55\%.$$

Riktig svar: C.

### Oppgave 17

Akkurat i det brannbilen passerer der du står på fortauet, har den null hastighetskomponent langs forbindelseslinjen mellom deg og brannbilen. Dermed null dopplerskift i dette øyeblikket. Riktig svar: A.

### Oppgave 18

Astronauten har konstant akselerasjon  $a = 10$  m/s<sup>2</sup>, slik at astronautens hastighet ved tidspunktet  $t$  er  $v(t) = at$ . Astronauten vil da måle en stadig økende rødforskyvning av lys utsendt av en kilde på jorda, f.eks de nevnte røde neonlysene, med bølgelengde  $\lambda = 632$  nm. Astronauten måler et dopplerskift av frekvensen gitt ved

$$\bar{f} = \sqrt{\frac{c-v}{c+v}} f,$$

og dermed (siden  $c = \lambda f$ , dvs  $f = c/\lambda$ ) et dopplerskift av bølgelengden gitt ved

$$\bar{\lambda} = \sqrt{\frac{c+v}{c-v}} \lambda.$$

Løsning av denne ligningen mhp astronautens hastighet  $v = at$  gir, med  $k = (\bar{\lambda}/\lambda)^2 = (700/632)^2 = 1.2268$ ,

$$t = \frac{v}{a} = \frac{c}{a} \cdot \frac{k-1}{k+1} = 3 \cdot 10^7 \cdot \frac{0.2268}{1.2268} = 3.06 \cdot 10^6 \text{ s},$$

dvs ca 35 døgn. Riktig svar: C.

### Oppgave 19

Pr tidsenhet, dvs pr sekund, beveger både B og C seg et antall meter gitt ved tallverdien av  $0.6c$ . A måler dermed at avstanden mellom B og C øker med  $1.2 \cdot 3 \cdot 10^8 = 3.6 \cdot 10^8$  meter pr sekund. Riktig svar: D.

### Oppgave 20

Einsteins addisjonsformel for hastigheter gir

$$v_{CB} = \frac{v_{CA} + v_{AB}}{1 + v_{CA}v_{AB}/c^2} = \frac{1.2c}{1 + 0.6^2} = 0.88c.$$

Riktig svar: A.