ROZDZIAŁ 04

Stres, dotyk i układ nerwowy

Czuły kontakt może pomagać w regulacji napięcia, lecz działa najlepiej jako sygnał bezpieczeństwa - nie jako obowiązkowa technika ani zapowiedź seksu.

UMIARKOWANE Badania eksperymentalne i dzienniczkowe sugerują korzystne krótkotrwałe reakcje na wspierający dotyk, ale próby są często małe i nie pozwalają obiecywać leczenia przewlekłego stresu. [10]

Dotyk nie jest neutralny

Ten sam gest może uspokajać albo napinać - zależnie od relacji, historii, momentu i zgody. Dlatego przytulenie nie jest uniwersalnym „lekiem". W małym randomizowanym badaniu czterotygodniowa interwencja zwiększająca ciepły dotyk u małżeństw wpłynęła na wybrane wskaźniki stresu, a u mężczyzn także na całodobowe ciśnienie skurczowe. To obiecujący wynik, lecz obejmował 34 zdrowe pary. [10]

Kiedy dotyk jest chciany, przewidywalny i nie niesie ukrytego żądania, może pomagać przejść z czujności do odpoczynku. Gdy każde przytulenie ma być początkiem seksu, osoba z mniejszą ochotą może zacząć unikać nawet niewinnego kontaktu. Warto odbudować kategorię czułości, która ma pełną wartość sama w sobie.

Stres wpływa w obie strony

Przewlekłe napięcie może zmniejszać zainteresowanie seksem, utrudniać pobudzenie i nasilać ból. Z kolei konflikt wokół seksu może stać się kolejnym źródłem stresu. Nie zawsze rozwiązaniem jest „więcej seksu"; czasem najpierw trzeba zmniejszyć przeciążenie, zadbać o sen, podział obowiązków albo poczucie bezpieczeństwa.

ĆWICZENIE: CZUŁOŚĆ BEZ DALSZEGO CIĄGU

Ustalcie 10 minut kontaktu, który oboje wybieracie: trzymanie za ręce, masaż dłoni, przytulenie albo rozmowa obok siebie. Z góry

ustalcie, że ćwiczenie nie prowadzi do seksu. Po wszystkim każde mówi jedno zdanie: „co było przyjemne?” i „co zmienić następnym razem?”.

MIT

„Przytulenie zawsze obniża kortyzol.”

CO WIEMY

Nie zawsze, nie u każdego i nie w każdej relacji. Wspierający dotyk może wpływać na wybrane reakcje stresowe, ale jego znaczenie zależy od zgody i kontekstu. Małe badanie nie jest obietnicą kliniczną.

Kiedy sam dotyk nie wystarcza

Silny lęk, objawy po przemocy, odrętwienie, panika albo poczucie przymusu wymagają bezpieczeństwa i profesjonalnego wsparcia. Partner nie powinien pełnić roli terapeuty poprzez „oswajanie” ciała bez wyraźnej zgody i prowadzenia specjalisty.

Źródła do rozdziału

[10] Holt-Lunstad J, Birmingham WA, Light KC. Warm touch intervention among married couples: blood pressure, oxytocin, alpha-amylase and cortisol. Psychosomatic Medicine. 2008;70(9):976-985. Otwórz źródło