



Indukcja

Przypomnienie:

Każdy z was pewnie kojarzy indukcję. Dowód indukcyjny zawiera trzy kroki:

- Należy Sformułować hipotezę indukcyjną.
- Dowieść przypadek bazowy (lub przypadki bazowe).
- Udowodnić przypadek ogólny na podstawie sprowadzenia do jednego lub więcej poprzednich przypadków.

Kilka typów zadań kiedy indukcja może się przydać:

- Wykazywanie równości sum
- Gry, często dowiedzenie, które stany są wygrywające, można zrobić indukcyjnie
- Zadania zawierające rekurencję, bądź ciągi.
- Równania funkcyjne, przykładowo znalezienie wartości $f(nx)$ w liczbach całkowitych jak już znamy $f(x)$
- Zadania z teorii gier. Dowiedzenie, które stany są wygrywające, często wiąże się z indukcją.

Klasyczne triki:

- Wzmocnienie tezy indukcyjnej
- Wykorzystanie indukcji zupełnej. Nie należy zapominać, że dowodząc prawdziwości n mamy do dyspozycji wszystkie mniejsze przypadki.
- Czasem w zadaniach mamy podaną stałą, a może można dojść do niej indukcyjnie?

Zadania

1. Z tablicy o wymiarach $2^n \times 2^n$ usunięto jedno pole o wymiarach 1×1 . Udowodnij, że pozostałą część tablicy można pokryć niezachodzącymi na siebie płytkami w kształcie litery L , składającymi się z 3 kwadratów.
2. Bartek chce kupić przekąski na Warsztaty Matematyczne za dokładnie n dolarów. Ma nieskończoną liczbę dwuzłotówek oraz nieskończoną liczbę pięciozłotówek. Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej $n \geq 4$ będzie w stanie zapłacić za przekąski bez konieczności wydawania reszty.
3. Udowodnij, że $2^{n+2} + 3^{2n+1}$ jest podzielne przez 7 dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych n .
4. Udowodnij nierówność $1 + nx \leq (1 + x)^n$, gdzie $x > -1$
5. Udowodnij nierówność iloczynową Weierstrassa:

$$\prod_{i=1}^n (1 - x_i) \leq 1 - \sum_{i=1}^n x_i$$



Poręba Wielka 27.09.2024

Autor: Stefan Świerczewski

Prowadzący: Stefan Świerczewski

dla $0 \leq x_i \leq 1$.

6. Udowodnij, że

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \dots \cdot \frac{2n-1}{2n} < \frac{1}{\sqrt{3n}}$$

dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych n .

7. Udowodnij, że dla każdej liczby naturalnej n liczba $2^{2^n} - 1$ ma co najmniej n różnych dzielników pierwszych.

8. Dla danego zbioru punktów wewnątrz trójkąta prostokątnego udowodnij, że te punkty można połączyć łamaną, tak aby suma kwadratów długości odcinków w łamanej była mniejsza lub równa kwadratowi długości przeciwprostokątnej danego trójkąta.

9. Niech a_1, a_2, \dots, a_n będzie ciągiem liczb rzeczywistych spełniającym nierówność $a_{i+j} \leq a_i + a_j$ dla wszystkich dodatnich liczb całkowitych i, j . Udowodnij, że

$$a_1 + \frac{a_2}{2} + \dots + \frac{a_n}{n} \geq a_n$$

dla każdej dodatniej liczby całkowitej n .

10. Każdy wierzchołek skończonego grafu może być pokolorowany na czarno lub na białą. Początkowo wszystkie wierzchołki są czarne. Możemy wybrać wierzchołek P i zmienić kolor P oraz wszystkich jego sąsiadów. Czy zawsze jest możliwe, aby zmienić kolor każdego wierzchołka z czarnego na biały za pomocą ciągu operacji tego typu?

11. Niech $r \geq 2$ będzie ustaloną dodatnią liczbą całkowitą, a F nieskończoną rodziną zbiorów, z których każdy ma rozmiar r , i żadne dwa z tych zbiorów nie są rozłączne. Udowodnij, że istnieje zbiór o rozmiarze $r - 1$, który przecina każdy zbiór z rodziny F .

12. Naturalna liczba a jest zawarta w naturalnej liczbie b , jeśli możliwe jest otrzymanie a przez usunięcie pewnych cyfr z liczby b (w ich reprezentacjach dziesiętnych). Na przykład, 123 jest zawarte w 901523, ale nie jest zawarte w 3412.

Czy istnieje nieskończony zbiór liczb naturalnych, taki że żadna liczba w tym zbiorze nie jest zawarta w żadnej innej liczbie z tego zbioru?