

Corrigé - Colle 2 (Sujet 1)

MPSI2

Année 2021-2022

28 septembre 2021

Exercice 1. Soit $a \geq 0$. Montrer que pour tout entier naturel n , $(1 + a)^n \geq 1 + an$.

Solution de l'exercice 1. Montrons par récurrence que la propriété $(P_n) : (1 + a)^n \geq 1 + an$ est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- **Initialisation.** Pour $n = 0$, on a bien $(1 + a)^0 = 1 \geq 1 + 0$ donc la propriété est vraie au rang 0.
- **Hérédité.** Soit $n \geq 0$ un entier fixé. Supposons que la propriété (P_n) est vraie au rang n , i.e. que

$$(1 + a)^n \geq 1 + an.$$

Montrons que la propriété est vraie au rang $n + 1$. On a, grâce à l'hypothèse de récurrence,

$$(1 + a)^{n+1} = (1 + a)(1 + a)^n \geq (1 + a)(1 + an) = 1 + a + an + a^2n = 1 + a(n + 1) + a^2n.$$

Or, $a^2n \geq 0$ et on a donc montré que

$$(1 + a)^{n+1} \geq 1 + a(n + 1).$$

Ceci achève de démontrer que la propriété est vraie au rang $n + 1$.

- **Conclusion.** On a donc bien démontré que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $(1 + a)^n \geq 1 + an$.

Exercice 2. Soient $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Calculer

$$S_n(x) = \sum_{k=0}^n x^k.$$

2. En déduire la valeur de

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n kx^k.$$

Solution de l'exercice 2. Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}^*$.

1. Si $x = 1$, alors $S_n = n$. Si $x \neq 1$, la somme S_n est la somme des n premiers termes d'une suite géométrique d'où

$$S_n(x) = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

2. Pour tout n et pour tout x , S_n est une fonction dérivable (c'est un polynôme) donc, pour tout $n \geq 1$ et pour tout réel $x \neq 1$

$$S'_n(x) = \sum_{k=1}^n kx^{k-1} = \sum_{k=1}^n (k-1)x^{k-1} + \sum_{k=1}^n x^{k-1}$$

Exercice 3. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $x \in \mathbb{R}$, on note

$$P_n(x) = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{x}{k}\right).$$

1. Que valent $P_n(0)$, $P_n(1)$ et $P_n(-n)$?
2. Démontrer que pour tout réel non-nul x , on a

$$P_n(x) = \frac{x+n}{x} P_n(x-1).$$

3. Pour $p \in \mathbb{N}^*$, écrire $P_n(p)$ comme un coefficient binomial.

Solution de l'exercice 3. 1. On a $P_n(0) = 1$ (on ne fait que des produits de 1), $P_n(-n) = 0$, car alors $1 + \frac{-n}{n} = 0$ et donc on a un terme nul dans le produit. Enfin,

$$P_n(1) = \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = \frac{2 \times 3 \times \dots \times (n+1)}{1 \times 2 \times \dots \times n} = n+1.$$

2. On a

$$P_n(x) = \prod_{k=1}^n \frac{x+k}{k} = \frac{(x+1)(x+2)\dots(x+n)}{1 \times 2 \times \dots \times n} = \frac{x+n}{n} P_n(x-1).$$

3. On a

$$P_n(p) = \prod_{k=1}^n \frac{k+p}{k} = \frac{(p+1)\dots(p+n)}{n!} = \frac{(n+p)!}{n!p!} \binom{n+p}{p}.$$

Exercice 4. Soient n et p deux entiers tels que $n \geq 2$ et $0 \leq p \leq n$.

1. Démontrer que pour tout entier $k \geq p+1$,

$$\binom{k}{p} = \binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1}.$$

2. En déduire la valeur de

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p}.$$

Solution de l'exercice 4. 1. On rappelle que

$$\binom{k}{p} = \frac{k!}{p!(k-p)!}.$$

Ainsi,

$$\binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1} = \frac{(k+1)!}{(p+1)!(k+1-(p+1))!} - \frac{k!}{(p+1)!(k-(p+1))!}$$

et donc

$$\binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1} = \frac{(k+1)!}{(p+1)!(k-p)!} - \frac{k!}{(p+1)!(k-p-1)!}.$$

On met donc sur le même dénominateur et on obtient

$$\binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1} = \frac{(k+1)! - k!(k-p)}{(p+1)!(k-p)!} = \frac{k!(k+1-(k-p))}{(p+1)!(k-p)!} = \frac{k!(p+1)}{(p+1)!(k-p)!}.$$

On arrive donc bien à

$$\binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1} = \binom{k}{p}.$$

2. On note que

$$\sum_{k=p}^n \binom{k}{p} = \sum_{k=p}^n \left(\binom{k+1}{p+1} - \binom{k}{p+1} \right)$$

Autrement dit,

$$\begin{aligned} \sum_{k=p}^n \binom{k}{p} &= 1 + \sum_{k=p+1}^n \binom{k}{p} \\ &= 1 + \left(\binom{p+2}{p+1} - \binom{p+1}{p+1} \right) + \left(\binom{p+3}{p+1} - \binom{p+2}{p+1} \right) \\ &\quad + \dots \\ &\quad + \left(\binom{n}{p+1} - \binom{n-1}{p+1} \right) + \left(\binom{n+1}{p+1} - \binom{n}{p+1} \right) \\ &= 1 + \binom{n+1}{p+1} - \binom{p+1}{p+1} \\ &= \binom{n+1}{p+1}. \end{aligned}$$

Exercice 5. Déterminer toutes les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(y - f(x)) = 2 - x - y.$$

Solution de l'exercice 5. Procédons par analyse-synthèse.

- **Analyse.** Supposons que f est une fonction telle que pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$

$$f(y - f(x)) = 2 - x - y.$$

Appliquons cette relation au cas où $y = f(x)$. Alors,

$$f(f(x) - f(x)) = 2 - x - f(x) \Leftrightarrow f(0) = 2 - x - f(x) \Leftrightarrow f(x) = -x + 2 - f(0).$$

De plus, en appliquant la formule $f(x) = -x + 2 - f(0)$ en $x = 0$ on arrive à

$$f(0) = 2 - f(0) \Leftrightarrow 2f(0) = 2 \Leftrightarrow f(0) = 1.$$

On en déduit que si f est une fonction vérifiant la propriété en question, alors nécessairement

$$f(x) = -x + 2 - 1 = -x + 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

- **Synthèse.** Supposons que f est définie sur \mathbb{R} par

$$f(x) = -x + 2 - 1 = -x + 1$$

et montrons qu'elle vérifie bien $f(y - f(x)) = 2 - x - y$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. On a,

$$f(y - f(x)) = -(y - f(x)) + 1 = -y + f(x) + 1 = -y + (-x + 1) + 1 = -y - x + 2, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2.$$

Nous avons donc démontré par analyse-synthèse que la seule fonction vérifiant

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \quad f(y - f(x)) = 2 - x - y$$

est la fonction définie pour tout $x \in \mathbb{R}$ par

$$f(x) = -x + 1.$$