

Corrigé - Colle 7 (Sujet 3)

BCPST1B

Année 2021-2022

16 novembre 2021

Exercice 1. Soit $f: x \mapsto \frac{x}{x+1}$. Exprimer $f^n(x) = \underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}}(x)$ pour tout entier naturel $n \geq 1$.

Solution de l'exercice 1. Montrons par récurrence que la propriété $f^n(x) = \frac{x}{nx+1}$ est vraie pour tout $n \geq 1$.

- **Initialisation.** Pour $n = 1$ le résultat provient immédiatement de la définition de f .
- **Hérédité.** Soit $n \geq 1$ fixé. Supposons que le résultat est vrai au rang n , i.e. que $f^n(x) = \frac{x}{nx+1}$. Alors,

$$f^{n+1}(x) = f(f^n(x)) = f\left(\frac{x}{nx+1}\right) = \frac{\frac{x}{nx+1}}{\frac{x}{nx+1} + 1} = \frac{x}{x + (nx+1)} = \frac{x}{(n+1)x+1}.$$

Le résultat est donc vrai au rang $n+1$.

- **Conclusion.** On a donc démontré par récurrence que pour tout $n \geq 1$, $f^n(x) = \frac{x}{nx+1}$.

Exercice 2. Étudier la fonction f définie par

$$f(x) = x^{-\ln(x)}.$$

Solution de l'exercice 2. On commence par écrire que $f(x) = e^{-(\ln(x))^2}$. Ainsi, on en déduit que la fonction f est définie et dérivable sur l'intervalle $]0, +\infty[$. Sa dérivée est


$$f'(x) = -2x(\ln(x))e^{-(\ln(x))^2}.$$

f' est donc positive sur $]0, 1[$ et négative sur $]1, +\infty[$. De plus, quand $x \rightarrow 0$, on a successivement $\ln(x) \rightarrow -\infty$, $-(\ln(x))^2 \rightarrow +\infty$ et par composition $f(x) \rightarrow 0$. De la même façon, on a $f(x) \rightarrow 0$.

Ainsi, on obtient le tableau de variations suivant :

| x | 0 | e | $+\infty$ | |
|---------|-----------|-----|---------------|---|
| $f'(x)$ | | + | 0 | − |
| $f(x)$ | | | $\frac{1}{e}$ | |
| | $-\infty$ | | | 0 |

La courbe obtenue est :



Exercice 3. On considère la fonction $h : x \mapsto \frac{x^2+1}{2x-1}$.

- Déterminer l'ensemble de définition \mathcal{D}_h de h .
- Déterminer l'image de h , i.e. $f(\mathcal{D}_h)$.
- L'application h est-elle injective de \mathcal{D}_h dans \mathbb{R} ? Surjective? Bijective?

Solution de l'exercice 3. 1. L'ensemble de définition de h est $\mathcal{D}_h = \mathbb{R} \setminus \{\frac{1}{2}\}$.

- L'image de h n'est pas si évidente à trouver. Soit $y \in \mathbb{R}$. Supposons qu'il existe x tel que $h(x) = y$. Alors,

$$\frac{x^2+1}{2x-1} = y \Leftrightarrow x^2+1 = y(2x-1) \Leftrightarrow x^2-2yx+1+y=0.$$

On obtient donc un trinôme en x . Pour déterminer si ce trinôme possède des racines (et donc si y possède un antécédent), on calcule son discriminant. On a

$$\Delta = 4y^2 - 4(1+y) = 4y^2 - 4y - 4.$$

Ce discriminant est à nouveau un trinôme. Pour déterminer son signe, nous devons à présent calculer le discriminant de ce dernier trinôme. On obtient

$$\Delta' = 16 + 64 = 80 > 0.$$

Le trinôme $4y^2 - 4y - 4$ possède donc deux racines réelles distinctes

$$y_1 = \frac{4 - \sqrt{80}}{8} = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \quad \text{et} \quad y_2 = \frac{4 + 4\sqrt{80}}{8} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

Ainsi, on a deux situations possibles :

- Si $y \in \left] \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right[$ alors Δ est strictement négatif (car il est du signe de $a = 4$ sauf entre les racines). Dans ce cas, l'équation $x^2 - 2yx + 1 + y = 0$ ne possède pas de solution et y n'a donc pas d'antécédent.
- Si $y \notin \left] \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right[$ alors $\Delta \geq 0$ et dans ce cas, l'équation $x^2 - 2yx + 1 + y = 0$ possède une (si $y = y_1$ ou $y = y_2$ et donc $\Delta = 0$) ou deux solutions et y a donc bien d'antécédent.

En conclusion, on a

$$\text{Im}(h) = \left] -\infty, \frac{1 - \sqrt{5}}{2} \right] \cup \left[\frac{1 + \sqrt{5}}{2}, +\infty \right[.$$

3. h n'est pas injective de \mathcal{D}_h dans \mathbb{R} car $h(1) = 2 = h(3)$. On pourrait utiliser le fait que l'image de h n'est pas \mathbb{R} pour conclure immédiatement que h n'est pas surjective de \mathcal{D}_h dans \mathbb{R} . Néanmoins, pour montrer que l'application h n'est pas surjective de \mathcal{D}_h dans \mathbb{R} il n'est pas utile de connaître son image. En effet, 0 n'a pas d'antécédent par h car $h(x) = 0$ équivaut à $x^2 + 1 = 0$ qui n'a pas de solution réelle. h n'est pas bijective car non surjective.

Exercice 4. Écrire une fonction prenant en arguments trois réels a , b et c et renvoyant les solutions réelles de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$.

Solution de l'exercice 4. On a

Algorithme 1 : Résolution d'une équation du second degré

Entrées : les coefficients a , b et c

Sorties : Les solutions de l'équation $ax^2 + bx + c = 0$.

```

1 delta = b * 2 - 4 * a * c ;
2 solutions = [] ;
3 si delta == 0 alors
4     solutions = [-b / (2 * a)]
5 sinon
6     si delta < 0 alors
7         solutions = []
8     sinon
9         si delta < 0 alors
10            solutions = [(-b - m.sqrt(delta)) / (2 * a), (-b + m.sqrt(delta)) / (2 * a)]
11        fin
12    fin
13 fin
14 fin
15 fin
16 retourner solutions

```

Exercice 5. Discuter, selon les valeurs de $a \in \mathbb{R}$, le nombre de solutions de l'équation

$$\frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| = a.$$

Solution de l'exercice 5. Posons, pour $x \neq \pm 1$,

$$f(x) = \frac{1}{x-1} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+x}{1-x} \right| - a.$$

La fonction f est dérivable sur $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$. De plus, sa dérivée (qui ne dépend pas du signe de la quantité à l'intérieur de la valeur absolue dans le logarithme) est égale, après mise au même dénominateur, à

$$f'(x) = \frac{-2x}{(1-x)^2(1+x)}.$$

On en déduit le tableau de variations suivant pour la fonction (le calcul des limites ne pose pas de difficultés particulières ; en particulier, il n'y a pas de formes indéterminées) :

| x | $-\infty$ | -1 | 0 | 1 | $+\infty$ |
|---------|-----------|--------|-----------|-----------|-----------|
| $f'(x)$ | - | | + | 0 | - |
| $f(x)$ | $-a$ | $-a-1$ | | | $+\infty$ |
| | $-\infty$ | | $-\infty$ | $-\infty$ | $-a$ |

Par continuité de f , en utilisant de plus sa stricte monotonie sur les intervalles $] -\infty, -1[$, $] -1, 0[$, $] 0, 1[$ et $] 1, +\infty[$, on discute le nombre de solutions suivant la valeur de a :

- Si $a = 0$, l'équation n'admet pas de solutions.
- Si $a > 0$, l'équation admet une unique solution qui est située dans l'intervalle $] 1, +\infty[$.
- Si $a \in] -1, 0[$, l'équation admet une unique solution qui est située dans l'intervalle $] -\infty, -1[$.
- Si $a = -1$, l'équation admet deux solutions. L'une de ces solutions est 0, l'autre est située dans l'intervalle $] -\infty, -1[$.
- Si $a < -1$, l'équation admet exactement trois solutions. L'une est située dans l'intervalle $] -\infty, -1[$, la seconde dans l'intervalle $] -1, 0[$ et la troisième dans l'intervalle $] 0, 1[$.