ទ្រពៃលិនាអនុខនិទ្ធម៉ូលើដ

ស៊ូ បាន់វ៉ូជែម ស៊ូ បញ្ញា ស៊ឹម សេងគា សូន កូវីន

ស៊ុយ មេងស៊ាង

1. ទ្រពៃលិស្តាន់ឧទនិទនិស្តេរីង

1.1. រុទ្ធពៃណីសិខនស្គមនស្គមនៅពេលមុរាណ

នៅពេលបុរាណ គេតែងតែមានទម្លាមទម្លាប់មួយចំនួនទាំងមុនពេលសម្រាលនិងក្រោយពេលសម្រាល។

1.1.1. មុខពេលសម្រាល

កាលសម័យនោះវិទ្យាសាស្ត្រមិនទាន់ជឿនលឿន កាលសម្រាលកូនមានភាពលំបាកណាស់ ទើបគេហៅថា ឆ្លងទន្លេ។

កាលដែលស្ត្រីជាម្តាយ ដឹងថាខ្លួន មានគភ៌បាន៣ខែ គេតែងតែហាមមិនឲធ្វើការធ្ងន់។ គេបានរៀបចំវិធីមួយ ហៅថា ពីធីចងសម្រោង ដើម្បីឲកូនមានលក្ខណ:គ្រប់ នឹងឲកូនជាប់ក្នុងផ្ទៃម្តាយដល់ ថ្ងៃប្រសូត្រ។

1.1.2. ត្រូណមផ្សេចៗ

- -មិនបរិភោគអាហារមានជាតិហឺរ
- -មិនឈោងយកអ្វីដែលខ្ពស់
- -មិនស្លៀកពាក់តឹង
- -មិនបរិភោគបបរ
- -កុំ ដេកថ្ងៃ កុំងូតទឹកយប់
- -កុំដេកដំអក រហ័សហ្លេន
- -កុំទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកដែលកើតកូនពិបាក

1.1.3. ពេលសុទ្ធាល

ប្ដី បងប្អូនត្រូវរត់ទៅតាមយាយម៉ប នៅក្នុងភូមិ។ នៅតំបន់ខ្លះ គេរៀបចំពិធីបួងសួង។

1.1.4. ទ្រោយពេលសម្រាល

-ស្ត្រីជាម្ដាយនិយមអាំងភ្លើង៣ថ្ងៃទៅមួយអាទិត្យ

-អាចារ្យសូត្រមន្ត គូសខ្វែងលើសរសរ ជួនកាលយកកន្តែដាក់លើក្បាលដំណេកកូន

-មិនឲអ្នកអាំងភ្លើងនិយាយឆ្លើយឆ្លង -បន់ឲជួយការពារម្ដាយនិងកូនខ្ចី

-ប្តីយកសុកទៅកប់ ឬដុតចោល

-ស្ត្រីផឹកថ្នាំខ្មែរ នឹង ធ្លុង

ពេលទារកកើតបាន៧ថ្ងៃ គេធ្វើពិធីកាត់សក់បង្កក់ធ្មបៈ

- ឧីពុក និង ម្ដាយ រៀបចំណ្ដោប់សងគុណដល់ធ្នូប
- -គេដាក់ទារកលើពូកតូចៗ ចំកណ្ដាលផ្ទះបែរ ក្បាលទៅខាងកើត នៅចុងជើងគេរៀបចំម្ហូប សម្លៀកបំពាក់ ផង ដែរ
- -ធ្មូប និង ឪពុក អុច ធូប ទៀន អញ្ចើញ ម្ដាយដើម គ្រូបាអាចារ្យមកសោយអាហារ
- -គេប្រារព្ធពីធី បើកភ្នែក កាត់សក់ ជញ្ជាត់ព្រលឹង បង្គិលពពិល នឹងបិទពន្លៃលើបង្ហើយទារក

ក្រោយពីចប់ពិធី ធ្មបអុជទៀនធូបដោតលើដង្វាយ អញ្ជើញដូនតាមក ទទួលទាន ដង្វាយ និង ប្រសិទ្ធ ពរជ័យ ដល់កូនចៅ។ ឪពុក ម្ដាយបងប្អូន ឲពរជ័យដល់ទារកនិងចងដៃទារកតាមធនធាន។ ការខិតខំ ទ្រាំទ្រ ពោះ រក្សាគត៌ គឺ លំបាកសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរ ទើបសម័យបុរាណខិតខំរក វិធីសាស្ត្រមួយចំនួន ឲគត៌មានសុវត្តិភាព ក្រោយពេលសម្រាលនិងមុនពេលសម្រាល។ ទម្លាមទម្លាប់នេះ គេមិនសូវ អនុវត្ត នៅពេលបច្ចុប្បន្ន តែនៅតាម ជនបទ គេឃើញមានការរក្សានិងអនុវត្តខ្លះៗផងដែរ។

1.2. ម្រពៃណីនិខនន្ទាមនន្ទាច់នៅពេលមន្ទុម្បន្

1.2.1. គារសម្រាល ៣ ជំណាក់គាល

ការសម្រាលកូនគឺជាកត្តាធម្មជាតិមួយដែលស្ត្រីត្រូវជួបប្រទះ ហើយរាល់បទពិសោធន៍នៃការសម្រាលកូន របស់ម៉ាក់ៗពពោះគ្រប់រូបក៏មិនដូចគ្នាដែរ។

1.2.1.1 ជំណាត់តាលជំបុខ

ការកន្ត្រាក់ស្បូនតែងមានរយៈពេលចន្លោះពី **៣០-៦០ វិនាទី**។ ធម្មតា វាចាប់ផ្តើម **២០ នាទី/ម្តង** បន្ទាប់ មក ផ្លាស់ប្តូរមក **៥ នាទី/ម្តង**។

1.2.1.2 . ជំណាត់កាលឈឺកោះតើឥតុខ

ការកន្ត្រាក់សាច់ដុំស្បូនមានការកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងពី ៤៥-៦០វិនាទី និងចាប់ផ្តើមពី ៣-៥នាទី/ ម្តង។

1.2.1.3. ជំណាត់តាលសម្រាល

ការកន្ត្រាក់សាច់ដុំស្បូនរឹតតែខ្លាំងពី **៦០-៩០ វិនាទី** ចាប់ផ្តើមម្តងៗពី **៩០ វិនាទី ទៅ ២ ម៉ោង**។ អាច មានសម្ពាធនៅត្រគាក និងរន្ធគូទ គ្រុនក្តៅ ត្រជាក់បាតជើង និងចង់ក្អួត។ ដំណាក់កាលនេះមានរយៈពេល ខ្លី ប៉ុន្តែ តឹងតែងខ្លាំង។

- ស្បូនចាប់ផ្ដើមកន្ត្រាក់៖ ករណីកន្ត្រាក់ស្បូន ជាសញ្ញាប្រាប់ពីការឈឺពោះសម្រាល។
- **បែកទឹកភ្លោះ៖** ពេលបែកទឹកភ្លោះ មានន័យថា ស្រោមសុកក្នុងពោះដាច់រហែក។

៩ខ្មែតដំចងរមេត្របដំខ

- -សម្រាលតាំមធម្មជាតិ៖ វាជាជម្រើសដ៏ប្រសើរសំរាប់មាតាដែលមានសុខភាពល្អ និងទារកដែលមិនមាន លក្ខណៈខុសពីប្រក្រតី
- -សម្រាលតាមទ្វាមាសដោយការចាក់ថ្នាំបំបាត់ការឈឺចាប់តាម epidural
- -សម្រាលដោយការវះកាត់

្តេងអាសាសាលដំខ ខាមេហសត់តិសិទិ ខាមភូមិកាខេស្**មាស្តៃ ខ្មែ**ម ខ្មែម នៃ ន

អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានចេញសេចក្ដីអំពាវនាវ ឱ្យបន្ថយជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងពេលសម្រាលកូន ព្រោះការពរពោះនិងឆ្លងទន្លេ មិនមែនជាជំងឺទេ។

- + គុណសម្បត្តិ
- ល្អសម្រាប់ម៉ាក់ដែលត្រូវការការអន្តរាគមន៍ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រ ហើយ ម៉ាក់អាចកំណត់ពីពេលវេលាជាក់លាក់
- ម៉ាក់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការត្រៀមទុកមុន នឹងមិនមានការឈឺចាប់អំឡុងពេលសម្រាល
- ម៉ាក់អាចប្រើថ្នាំបញ្ចុះក្រោយសម្រាលចៀសវាងការឆ្លងជំងឺនានា

លម្អិតពីការសម្រាលដោយវះកាត់ ទាំងគុណសម្បត្តិនិងផលវិបាក

- + គុណវិបត្តិ
- រាងកាយម៉ាក់ប្រើពេលយូរដើម្បីត្រឡប់ទៅរកភាពដូចដើមមុនសម្រាល នឹងបាត់បង់ឈាមច្រើន
- ផលវិបាកដល់ការពពោះបន្ទាប់ នឹង ផលវិបាកពីការវះកាត់
- ប្រព័ន្ធភាពស៊ាំកូនខ្សោយ ប្រឈមបញ្ហាអាល្លែកហ្សីហើយឆាប់ឈឺថ្កាត់
- ចំណាយប្រាក់កាសច្រើនលើមុខកាំបិតវះកាត់

ការសម្រាលដោយធម្មជាតិ

- + គុណសម្បត្តិ
- ល្អសម្រាប់ម៉ាក់ដែលមានស្ថានភាពសុខភាពល្អ នឹងម៉ាក់ឆាប់ជាសះពីមុខរបួសលឿន
- បាត់បង់ឈាមតិចអំឡុងសម្រាល
- ម៉ាក់មានទឹកដោះច្រើនឲ្យកូនបៅភ្លាមៗក្រោយសម្រាល
- មិនមានហានិភ័យនិងផលវិបាកផ្សេងៗពិការវះកាត់ នឹង មិនមានបញ្ហា សម្រាប់ការយកកូនបន្ទាប់
- ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយនិងភាពធន់របស់ទារកល្អជាងទារកដែលសម្រាលដោយវះកាត់
- ការចំណាយតិចជាងសម្រាលដោយវះកាត់
- +គុណវិបត្តិ
- -ឈឺពោះយូរហើយអត់ដឹងពេលសម្រាលជាក់លាក់
- ពិបាករៀបចំឲ្យបានស្រួលបួលចំពេលមុនសម្រាល
- ម៉ាក់ទទួលការឈឺចាប់ខ្លាំងអំឡុងពេលកំពុងសម្រាល

- 1.2.2. គើទើមសម្រាលអូលរួមគួរថែរអ្យាសុខភាពមែមណា ?
- -**មិនត្រូវទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង៖** មិនគួរទទួលទានគ្រឿងស្រវឹង ឬភេសជ្ជៈដែលមានសារធាតុផ្សំពី អាល់កុល
- -អាហារដែលមិនគួរទទួលទានសម្រាប់ស្ត្រីសម្រាលកូនរួច៖ អាហារផ្អាប់ទុកយូរ អាហារស្រស់ ព្រោះអាចធ្វើ ឲ្យកើតមានបញ្ហាធ្នល់ពោះ។
- -**ថ្នាំបុរាណ៖** ឱសថបុរាណមួយចំនួនដែលអះអាងថាជួយបង្កើនទឹកដោះ ឬជួយឲ្យស្បូនមានសភាពដូច ដើមវិញ តែមិនគួរទទួលទានទេ
- -ហាមប្រើប្រាស់ថ្នាំ ៖ រាល់ថ្នាំលេប ទាំងឡាយ ដែលគ្មានវេជ្ជបញ្ហាត្រឹមត្រូវមិនគួរប្រើប្រាស់នោះទេ
- -**ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ៖** ស្ត្រីមិនគួរធ្វើលំហាត់ប្រាណខ្លាំងពេកទេ
- -មិនគួរលើកវត្ថិធ្ងន់៖ រាល់ការងារដែលប្រើកម្លាំងខ្លាំង ស្ត្រីគួរចៀសវៀង

- ១. កម្លាំងចិត្ត
- ២. ពេលស្បូនបើក: នៅពេលស្បូនចាប់ផ្ដើមបើក អ្នកអាចញ៉ាំអាហារខ្លះដើម្បីផ្ដល់កម្លាំងសម្រាប់ពេលកើត តែគួរចៀសវាងអាហារប្រភេទខ្លាញ់ និងពិបាករំលាយ
- ៣. ទឹកភ្លោះ: បើទឹកភ្លោះមិនទាន់បែកនៅឡើយ តែស្បូនចាប់ផ្តើមបើក អ្នកអាចងូតទឹកត្រជាក់ៗ ដើម្បី បំបាត់អារម្មណ៍តានតឹង និងមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល
- ៤. ការបន្ធរការឈឺចាប់: ការដកដង្ហើមវែងៗ ឬឱ្យស្វាមី ឬសមាជិកគ្រួសារម៉ាស្សាថ្នមៗ។
- ៥. មុនពេលឡើងគ្រែសម្រាលៈ ដើម្បីងាយស្រួលកើត និងមិនសូវឈឺចាប់ ស្ត្រីគួរដើរឱ្យបានច្រើន ឬធ្វើ ចលនាដោយការហាត់ប្រាណចុះឡើង

