N(p): Pascal Satırlarında Eldesiz Gösterim Sınırı

James Augustus

Özet

$M_p = 2^p - 1$ olsun ve N(p), Pascal üçgeninin n'inci satırındaki her sayının M_p'den küçük olduğu en büyük n olsun. Böylece $(M_p + 1)^n = 2^{pn}$ sayısı M_p tabanında o satır olarak yazılır. N(p) − p değerinin bir eşik dizisiyle tam olarak belirlendiğini gösteriyorum: $p_k = 2m_k - k - 1$, burada m_k, $2^k\, C(2m, m) < 4^m$ sağlayan en küçük m. Robbins'in Stirling sınırlarından, her $p \geq 7$ için $N(p) = p + \tfrac{1}{2}\log_2(\pi p/2) + E(p)$ ve $-1 < E(p) \leq 2 - \tfrac{1}{2}\log_2(7\pi/2) < 0.270575$ çıkıyor. Tam uç sınırlar keskindir. Eşikler $p_k = (2/\pi)4^k - k + O(1)$ sağlar, ardışık oranları 4'ün üstündedir ve 4'e gider, her eşik satırı tektir. Kullandığım araçlar klasiktir. Literatürde yenilik doğrulanmadı.

1. Kurulum

Bu not boyunca $p \geq 2$ bir tamsayıdır. Böylece M_p geçerli bir konumsal tabandır. p veya M_p asal olmak zorunda değildir. $c(n) = C(n, \lfloor n/2 \rfloor)$, n'inci satırın en büyük sayısı olsun. Her b tabanı için $(b + 1)^n = \Sigma_{k=0}^{n} C(n,k)\, b^k$ ve katsayılar $(b + 1)^n$ sayısının b tabanındaki haneleri ancak $c(n) < b$ ise oluyor. Tabanı $b = M_p$ olarak sabitleyip satırı değiştiriyorum:

$N(p) = \max\{\, n : c(n) < M_p \,\}$, $D(p) = N(p) - p$, $h(p) = \tfrac{1}{2}\log_2(\pi p/2)$.

Aşağıdaki Lemma 1'e göre temiz satırlar {0, 1, …, N(p)} başlangıç aralığını oluşturur. N(p), ilk başarısız satırda durarak bulunur. Ayrıca şunları kullanıyorum:

$w(m) = 4^m / C(2m, m)$ $(m \geq 1)$, $m_k = \min\{\, m : 2^k\, C(2m, m) < 4^m \,\}$, $p_k = 2m_k - k - 1$.

Örnekler: N(p) ne işe yarar?

N(p), Pascal katsayılarını bir sayının haneleri olarak kullanırken geçerlilik sınırını verir. Taban seçilmişse hangi satıra kadar gidilebileceğini söyler. Ters yönde, belirli bir satırı elde taşımadan yazmak için yeterli tabanı seçmeye yardım eder. Aşağıdaki örnekler bu kullanımları gösterir. Bunlar yeni bir hız veya sıkıştırma sonucu değildir.

Örnek 1. Elle kontrol edilebilen bir sayı

p = 3 için taban 7'dir. Dördüncü Pascal satırı [1, 4, 6, 4, 1] olur. En büyük katsayı 6 < 7 olduğu için hepsi geçerli hanedir. Gerçekten

$1 \times 7^4 + 4 \times 7^3 + 6 \times 7^2 + 4 \times 7 + 1 = 4096 = 8^4 = 2^{12}$.

Beşinci satır [1, 5, 10, 10, 5, 1] olur. 10, 7 tabanında hane değildir. Aynı katsayı açılımının değeri hâlâ $8^5 = 32768$'dir, fakat gerçek haneler [1, 6, 4, 3, 5, 1] olur. Sağdaki 10, 3 kalanı ve 1 elde verir. Soldaki 10 bu eldeyle 11 olur, 4 kalanı ve 1 elde verir. Yanındaki 5 de 6 olur. Bu yüzden N(3) = 4. Buradaki p = 3 örneği tanımı açıklar, $p \geq 7$ isteyen Teorem A'nın kapsamına girmez.

Örnek 2. Sınırdaki eşitlik de başarısızdır

p = 2 için taban 3'tür. İkinci satır [1, 2, 1] sığar. Üçüncü satır [1, 3, 3, 1] sığmaz, çünkü geçerli haneler yalnız 0, 1 ve 2'dir. Dolayısıyla N(2) = 2. Kontrol $c(n) \leq b$ değil, $c(n) < b$ olmalıdır. Bir program bu eşitlik durumunu kabul ederse yanlış hane dizisi üretir.

Örnek 3. 127 tabanında bütün satırı görmek

p = 7 için taban 127’dir. 9. satır [1, 9, 36, 84, 126, 126, 84, 36, 9, 1] olur ve 2^{63} sayısını gösterir. Merkez 126 < 127 iken bir sonraki satırın merkezi 252’dir. Böylece N(7) = 9 olur. Bu örnekte ilk notun p + 2 seçimi sınıra tam ulaşır.

Örnek 4. Güvenli satırın ötesine geçmek

p = 38 için durum farklıdır:

Satır	Merkez katsayısı	Taban 274877906943 ile karşılaştırma
40	137846528820	Küçük, haneler korunur
41	269128937220	Küçük, haneler korunur
42	538257874440	Büyük, elde gerekir

N(38) = 41. Dolayısıyla p + 2 = 40 güvenli bir seçimdir, ama son geçerli seçim değildir. Bir dönüştürücü bu tabanda 41. satırı kabul edebilir, 42. satırın katsayılarını doğrudan hane diye kabul edemez.

Örnek 5. İstenen satır için taban seçmek

42. satırı elde taşımadan yazmak istediğimizi düşünelim. Merkezi 538257874440’tır. p = 38 tabanı yetersizdir. p = 39 için taban 549755813887 olur ve merkez bu tabandan küçüktür. Bu nedenle Mersenne tabanları arasında yeterli en küçük p değeri 39’dur. N(39) = 42 olduğu da bir sonraki merkezin 1052049481860 olmasıyla doğrulanır.

Genel karar kuralı şudur: n satırı seçildiğinde $c(n) < 2^p - 1$ sağlayan en küçük $p \geq 2$ aranır. Bu, sabit p için N(p) bulma sorusunun tersidir. Bütün katsayıları ayrı ayrı sınamak yerine en büyüğünü sınamak yeterlidir.

Örnek 6. Bir milyon bitten uzun bir sayı

p = 1000 için taban $b = 2^{1000} - 1$ ve son satır N(1000) = 1005’tir. Bu satırın başı ve sonu şöyledir:

[1, 1005, 504510, …, 504510, 1005, 1].

Bu gösterimde toplam 1006 hane vardır. Ortadaki … işareti sıfırları değil, burada yazılmayan 1000 Pascal katsayısını temsil eder. En büyük katsayı onluk yazımda 301 rakamlıdır. Bütün katsayılar tabandan küçüktür. Aynı hanelerin konum değerleriyle gösterdiği sayı $2^{1\,005\,000}$ olur.

Bu sayı ikilik tabanda bir adet 1 ve arkasında 1 005 000 adet 0 ile yazılır. Dolayısıyla tam ikilik uzunluğu 1 005 001 bittir. Buradaki yarar, büyük bir sayının hangi Pascal satırıyla eldesiz temsil edilebildiğini kesin olarak bilmektir. Onluk gösterimin bütün rakamlarını basmaya gerek yoktur.

1006 hane kullanmak kendiliğinden veri sıkıştırması değildir. Her hane 1000 bite kadar yer isteyebilir. Hanelerin sayısı ile onları saklamak için gereken bit sayısı farklıdır.

Örnek 7. Ham ikilik yazımı yaklaşık 125 GB olan sayı

$p = 1\,000\,000$ seçilsin. Eşikler $667533 \le p < 2670166$ olduğu için $N(p) - p = 10$ ve $N(p) = 1\,000\,010$ olur. Taban $b = 2^{1\,000\,000} - 1$'dir.

[1, 1000010, 500009500045, …, 500009500045, 1000010, 1].

Satırda toplam 1 000 011 hane vardır. Gösterilmeyen orta bölüm 1 000 005 katsayı içerir. Temsil edilen sayı $2^{1\,000\,010\,000\,000}$ ve tam ikilik uzunluğu 1 000 010 000 001 bittir.

Bu bitleri sıkıştırmadan, sekiz bitlik baytlar halinde saklamak 125 001 250 001 bayt, yaklaşık 125 GB gerektirir. Buna karşılık "2 üzeri 1 000 010 000 000" ifadesi kısa bir sembolik tanımdır. Sembolik tanım ile sayının bütün bitlerini belleğe açmak aynı işlem değildir. Bu örnekte bütün büyük sayı veya satır üretilmiş değildir. Son satır, matematiksel eşik sonucundan belirlenmiştir.

Örnek 8. Bir trilyon parametresi

$p = 10^{12} = 1\,000\,000\,000\,000$ olsun. Bu ölçekte kısa bir tabloyu bütün satırları deneyerek üretmek yerine kanıtlanmış hata bandını kullanabiliriz. $h(p) = \tfrac{1}{2}\log_2(\pi p/2)$ için $20.257 < h(p) < 20.258$ olur. Matematik notundaki $-1 < E(p) \le 0.270575$ sınırıyla

$19.257 < N(p) - p < 20.529.$

$N(p) - p$ bir tamsayıdır. Bu aralıkta yalnız 20 vardır. Dolayısıyla $N(p) = 10^{12} + 20 = 1\,000\,000\,000\,020$.

$n = 10^{12} + 20$ yazarsak satırın düzeni $[1, n, n(n-1)/2, \ldots, n(n-1)/2, n, 1]$ olur. Toplam $10^{12} + 21$ hane vardır. Temsil edilen sayı $2^{10^{24} + 20 \times 10^{12}}$ olur. Bu sonuç bütün katsayıların tek tek hesaplandığı anlamına gelmez. Son satırın hangi satır olduğuna, kanıtlanmış sınırın izin verdiği tek tamsayı seçilerek karar verilmiştir.

Örnek 9. p'nin kendisi 101 rakamlı olduğunda

Şimdi $p = 10^{100}$ olsun. Bu, onluk yazımda bir adet 1 ve ardından 100 adet 0 demektir. Taban $b = 2^{10^{100}} - 1$ olur. $h(p)$ için $166.422 < h(p) < 166.423$ sınırları geçerlidir. Aynı hata bandı

$165.422 < N(p) - p < 166.694$

verir. Tek olası tamsayı 166'dır. Dolayısıyla $N(10^{100}) = 10^{100} + 166$ kesin olarak belirlenir.

$n = 10^{100} + 166$ olmak üzere bu dev satır yine

$[1, n, n(n-1)/2, \ldots, n(n-1)/2, n, 1]$

biçimindedir. Tam hane sayısı $10^{100} + 167$'dir. Temsil edilen sayı $2^{10^{200} + 166 \times 10^{100}}$ olur. Başındaki ve sonundaki 1, Pascal satırının uçlarıdır. Aradaki … bilinmeyen veya keyfî değerler değil, n satırının burada yazılmayan belirli binom katsayılarıdır.

Bu örnekte $N(p)$'nin yararı özellikle açıktır: yazdırılması mümkün olmayan bir satır ailesinin eldesiz geçerlilik sınırını matematikle belirler. Satırın tamamını saklayabildiğimiz veya hesaplayıp ekrana döktüğümüz iddia edilmez.

Örnek 10. Programda kullanılabilecek sınır çiftleri

p	N(p)	İlk eldesiz olmayan satır
2	2	3
3	4	5
4	5	6
7	9	10
8	10	11
37	39	40
38	41	42
39	42	43
100	103	104
158	161	162
159	163	164
1000	1005	1006

Tablonun her satırı iki kontrol sunar: N(p) satırı sığmalı, N(p) + 1 satırı sığmamalıdır. Bu çiftler taban dönüşümü veya Pascal katsayılarını hane olarak kullanan bir programın sınır denetimlerinde işe yarar. p değişince taban da değişir. Tablodaki sıçramalar aynı tabanda satır atlandığı anlamına gelmez.

Kullanımın kapsamı

N(p), bu sayı gösteriminin kesin çalışma aralığını belirleyen matematiksel bir araçtır. Eğitimde elde taşımayı açıklamak, algoritmada doğru tabanı seçmek ve sınır durumlarını denetlemek için kullanılabilir. Bütün bir Pascal satırını veya çok büyük kuvveti üretmenin daha hızlı olduğunu tek başına göstermez. Ayrı bir şifreleme, genel sıkıştırma veya asallık testi sonucu sunmaz. N(p)’nin hesaplanmasının maliyeti de kullanılan yönteme bağlıdır.

2. Sonuçlar

Teorem A. Her $p \geq 7$ tamsayısı için $N(p) \geq p + 2$.

Bu, ikinin kuvvetlerini eldesiz Pascal satırları olarak inceleyen notun Teorem 2’sidir [1].

Teorem B1 (karakterizasyon). Her $p \geq 7$ ve her $k \geq 2$ için $N(p) - p \geq k$ ancak ve ancak $p \geq p_k$. Dolayısıyla $N(p) - p = \max\{\, k : p_k \leq p \,\}$. p arttıkça azalmaz ve her p_k noktasında tam 1 artar.

k	m_k	p_k
2	5	7
3	21	38
4	82	159
5	326	646
6	1304	2601
7	5215	10422

k	m_k	p_k
8	20861	41713
9	83443	166876
10	333772	667533
11	1335089	2670166
12	5340354	10680695

Yani $N(p) - p$ değeri $7 \le p \le 37$ için 2, $38 \le p \le 158$ için 3, $159 \le p \le 645$ için 4, $646 \le p \le 2600$ için 5, $2601 \le p \le 10421$ için 6, $p = 10422$'den $p = 41712$'ye kadar 7'dir.

Teorem B2 (eşikler). Her $k \ge 2$ için

$4^k/\pi - 1/4 - 0.07/m_k < m_k < 4^k/\pi + 3/4 + 1/(36(m_k - 1))$.

Dolayısıyla $p_k = (2/\pi)4^k - k - 3/2 + 2\varphi_k$ ve $-0.07/m_k < \varphi_k < 1 + 1/(36(m_k - 1))$. Özellikle

$2\times4^k/\pi - k - 1.53 < p_k < 2\times4^k/\pi$.

$1 \le k \le 12$ için $m_k = \lceil 4^k/\pi - 1/4 \rfloor$. Bu yüzden $p_k = 2\lceil 4^k/\pi - 1/4 \rfloor - k - 1$ ve $7 \le p \le 42\,700\,000$ için $N(p) - p = \max\{ k \le 12 : 2\lceil 4^k/\pi - 1/4 \rfloor - k - 1 \le p \}$.

Teorem B3 (hata bandı). Her $p \ge 7$ için

$h(p) - 1 < N(p) - p \le h(p) + E_{max}$,

$E_{max} = 2 - h(7) = 0.270574474235\ldots < 0.270575$.

Tam üst sınır E_{max} yalnız $p = 7$'de tutulur. 0.270575 dışa yuvarlanmış bir değerdir, tutulan bir uç nokta değildir. Alt değer -1 hiç tutulmaz ama ona istenildiği kadar yaklaşılır. $N(p) - p = k \ge 3$ ise üst sınır şuna iner:

$N(p) - p - h(p) < e(k) = -\tfrac{1}{2}\log_2(1 - (\pi/2)(k + 1.53)/4^k)$,

$e(3) < 0.0851$, $e(4) < 0.0250$, $e(5) < 0.0073$, $e(6) < 0.0021$, $e(7) < 0.00060$. Tamsayı biçiminde: bir k için $p_k \le p < 2\times4^k/\pi$ ise $N(p) - p = \lfloor h(p) \rfloor + 1$, değilse $N(p) - p = \lfloor h(p) \rfloor$. Her böyle pencerede k ile $k + 2$ arasında tamsayı vardır: 7 ile 10, 38 ile 40, 159 ile 162, 646 ile 651, 2601 ile 2607, 10422 ile 10430.

Teorem B4 (oranlar). Her $k \ge 2$ için $3k - 5 < p_{k+1} - 4p_k < 3k + 6$. Dolayısıyla $p_{k+1}/p_k > 4$ ve $p_{k+1}/p_k \to 4$. Fark yaklaşık $p_{k+1}/p_k - 4 \approx 3\pi k/(2\times4^k)$.

p_k	p_{k+1}	$p_{k+1} - 4p_k$	p_{k+1}/p_k
38	159	7	4.184210
159	646	10	4.062893
646	2601	17	4.026315
2601	10422	18	4.006920
10422	41713	25	4.002398
41713	166876	24	4.000575
166876	667533	29	4.000173
667533	2670166	34	4.000050
2670166	10680695	31	4.000011

Teorem C (eşik satırları). $k \ge 3$, $p = p_k$ ve $N = N(p)$ olsun. $N = 2m_k - 1$ tektir ve

$1 - 1/(N+1) \le c(N)/2^p < c(N)/M_p < 1$.

Örneğin $c(N)/M_p$ değeri $p = 38$'de ($N = 41$) 0.979085, $p = 159$'da 0.995350, $p = 646$'da 0.999538, $p = 2601$'de 0.999826, $p = 10422$'de 0.999994.

3. Lemmalar

Lemma 1 (monotonluk). $c(0) = c(1) = 1$ ve her $n \ge 1$ için $c(n+1) > c(n)$. Ayrıca her n için $c(n+1) \le 2c(n)$. Eşitlik $c(n+1) = 2c(n)$ tam olarak n tek iken tutar.

Kanıt. $n = 2x$ için $c(2x+1)/c(2x) = (2x+1)/(x+1)$. Bu oran $[1, 2)$ aralığındadır ve 1'e yalnız $x = 0$'da eşittir. $n = 2x+1$ için Pascal kuralı ve simetriden $c(2x+2) = C(2x+1, x) + C(2x+1, x+1) = 2c(2x+1)$.

$c(n+1) = c(n)$ eşitliği yalnız $n = 0$'da olur. $c(n+1) = 2c(n)$ ise tam olarak n tek iken tutar.

Lemma 2. $c(n) = 2^q - 1$ eşitliği yalnız $n = 0, 1$ ($c = 1$) ve $n = 3$ ($c = 3$) için tutar. Sonuç olarak $n \ge 4$ için $c(n) < 2^p - 1$ ancak ve ancak $c(n) < 2^p$.

Kanıt. Çift $n \ge 2$ için $c(n) = 2c(n-1)$ çifttir. $n = 2x+1$ için $c(n) = C(2x+2, x+1)/2$ ve Legendre formülü $v_2(C(2y, y)) = s_2(y)$ verir. $s_2(y)$, y'nin ikilik yazımındaki 1 sayısıdır [3]. Gerçekten $v_2(t!) = \Sigma_{j \ge 1} \lfloor t/2^j \rfloor = t - s_2(t)$ ve $s_2(2y) = s_2(y)$. Bu yüzden $c(n)$ ancak $x+1$ ikinin kuvveti iken, yani $n = 2^M - 1$ iken tektir. $M \ge 3$ için

$$C(2^M - 1, 2^{M-1} - 1) = \prod_{i=1}^{K} (2^M - i)/i, \quad K = 2^{M-1} - 1.$$

$i = 2^v u$ (u tek) yazınca çarpan $(2^{M-v} - u)/u$ olur. Pay ve payda tektir ve çarpan 2^{M-v} modülünde -1'e denktir. $i < 2^{M-1}$ olduğundan $v \le M-2$. $v \le M-3$ olan çarpanlar 8 modülünde -1'dir. $v = M-2$ olan tek çarpan $i = 2^{M-2}$ içindir ve değeri 3'tür. K tek olduğundan çarpım 8 modülünde $(-1)^{K-1} \times 3 = 3$ olur. Oysa $q \ge 3$ için $2^q - 1 \equiv 7 \pmod 8$. $c(7) = 35$ olduğundan $M \ge 3$ durumu $q \ge 6$ gerektirirdi. Geriye kalan $M \le 2$ durumları $n = 0, 1, 3$'tür.

Lemma 3 (eşlik). Her $n \ge 1$ için $2^n/c(n) = w(\lceil n/2 \rceil)$. Ayrıca $w(m+1)/w(m) = 2(m+1)/(2m+1) > 1$, yani w kesin artar.

Kanıt. $n = 2m$ için tanımdır. $n = 2m-1$ için Lemma 1'den $C(2m, m) = 2C(2m-1, m-1)$, bu yüzden $2^{2m-1}/C(2m-1, m-1) = 4^m/C(2m, m)$. Oran, $C(2m+2, m+1) = C(2m, m)(2m+1)(2m+2)/(m+1)^2$ eşitliğinden gelir.

Böylece $2^n/c(n)$ yalnız çift satırdan sonraki tek satıra geçerken büyür, tek satırdan sonraki çift satıra geçerken değişmez.

Lemma W. Her $m \ge 1$ için

$$\pi(m + 1/4 - 1/(36m+3)) < w(m)^2 < \pi(m + 1/4 + 0.07/m).$$

Kanıt. Robbins'in Stirling formülü biçimi [2]: $n! = \sqrt{(2\pi n)}(n/e)^n e^{r_n}$, $1/(12n+1) < r_n < 1/(12n)$. $(2m)!$ ve $m!$ için uygulanınca $w(m)^2 = \pi m e^s$, $s = 2(2r_m - r_{2m})$ ve

$$ms > (36m-1)/(12(12m+1)) = 1/4 - 1/(36m+3), \quad ms < (18m+1)/(72m+3) = 1/4 + 1/(288m+12).$$

$e^s > 1 + s$. $0 < s < 1$ için de $e^s < 1 + s + s^2$, çünkü üstel serinin kuyruğu en çok $s^2(e-2)$'dir. Burada $s < 19/(75m)$, bu yüzden $ms^2 < 0.0642/m$ ve $1/(288m+12) + 0.0642/m < 0.07/m$.

Satır bazında, θ hata terimi olmak üzere: çift n için $(2^n/c(n))^2 = (\pi/2)(n + 1/2 + \theta)$, $-2/(18n+3) < \theta < 0.28/n$. Tek n için $(2^n/c(n))^2 = (\pi/2)(n + 3/2 + \theta)$, $-2/(18n+21) < \theta < 0.28/(n+1)$. İki eşlik $\log_2 c(n)$ içinde yaklaşık $0.72/n$ kadar ayrılır. Bu küçük bir farktır ama eşik satırının hangisi olduğunu belirler (Teorem C).

4. Kanıtlar

Teorem A. Her n için c(n + 2)/c(n), n = 2x iken 2(2x + 1)/(x + 1) = 4 − 2/(x + 1), n = 2x + 1 iken 2(2x + 3)/(x + 2) = 4 − 2/(x + 2) olur. Yani c(n + 2) < 4c(n). Başlangıç durumları C(9, 4) = 126 < 127 = M_7 ve C(10, 5) = 252 < 255 = M_8. c(p + 2) ≤ M_p − 1 ise c(p + 4) < 4(2^p − 2) = 2^{p+2} − 8 < M_{p+2}. Tek zincir p = 7'den, çift zincir p = 8'den başlar. Teorem A, p_2 = 7 olduğundan Teorem B1'den de çıkar.

Teorem B1. p ≥ 7 ve k ≥ 2 olsun. Böylece p + k ≥ 9. O zaman

N(p) − p ≥ k ⟺ c(p + k) < 2^p − 1 (Lemma 1) ⟺ c(p + k) < 2^p (Lemma 2) ⟺ w(⌈(p + k)/2⌉) > 2^k (Lemma 3) ⟺ ⌈(p + k)/2⌉ ≥ m_k ⟺ p ≥ 2m_k − k − 1.

Lemma W'ye göre w sınırsızdır, bu yüzden m_k vardır. w(m + 1)/w(m) oranı 2'den küçüktür. w(m_k − 1) ≤ 2^k olduğundan w(m_k) < 2^{k+1}, dolayısıyla m_{k+1} ≥ m_k + 1 ve p_{k+1} > p_k olur.

Teorem B2. w(m_k)² > 4^k ve Lemma W'nin üst sınırından 4^k/π < m_k + 1/4 + 0.07/m_k. w(m_k − 1)² ≤ 4^k ve alt sınırdan m_k − 3/4 − 1/(36m_k − 33) < 4^k/π. Bunlar p_k = 2m_k − k − 1 içine konur. k ≥ 2 için m_k ≥ 5. Elde edilen daha geniş aralık her zaman ⌈4^k/π − 1/4⌉ sayısını içerir. İkinci bir tamsayıyı ancak 4^k/π − 1/4 sayısının kesir kısmı 0.07/m_k'den küçük ya da 1 − 1/(36(m_k − 1))'den büyükse içerebilir. k ≤ 12 değerleri tam olarak hesaplandı (Bölüm 5). p_{13} > 2×4^{13}/π − 14.53 > 42 722 815 olduğundan N(p) için kapalı biçim 42 700 000'e kadar geçerlidir.

Teorem B3. N(p) − p = k olsun, yani p_k ≤ p < p_{k+1}. Alt sınır: p < p_{k+1} < 2×4^{k+1}/π, bu yüzden πp/2 < 4^{k+1} ve h(p) < k + 1. Üst sınır: p > 2×4^k/π − k − 1.53, bu yüzden πp/2 > 4^k(1 − (π/2)(k + 1.53)/4^k). Logaritma alınınca e(k) çıkar. k = 2 platosunda p ≥ 7 kullanılır ve değer 2 − h(7) olur. e(k) azaldığı ve e(3) < 0.0851 < 2 − h(7) olduğu için genel en büyük değer 2 − h(7)'dir. Plato içinde h arttığından uç değerler p = p_k ve p = p_{k+1} − 1 noktalarındadır. İkincisi Teorem B2'ye göre −1'e gider. Tamsayı biçimi için: platoda h(p) değeri (k − e(k), k + 1) aralığındadır ve h(p) ≥ k ancak ve ancak p ≥ 2×4^k/π.

Pencere sayımı için T_k = 2×4^k/π yazılır. Pencerede ⌈T_k⌉ − p_k = k + 1 + ⌈1/2 − 2φ_k⌉ tamsayı vardır. B2 sınırları k ≥ 2 için −1.514 < 1/2 − 2φ_k < 0.528 verir. Son tavan değeri −1, 0 veya 1 olduğundan sayı k ile k + 2 arasındadır.

Teorem B4. Teorem B2, k ve k + 1 için yazılınca p_{k+1} − 4p_k = 3k + 7/2 + 2φ_{k+1} − 8φ_k olur. m_2 = 5 ve m_3 = 21 olduğundan bu değer 3k + 3.5 − 0.03 − 8.06 > 3k − 5 değerinin üstünde, 3k + 3.5 + 2.01 + 0.12 < 3k + 6 değerinin altındadır. k ≥ 2 için 3k − 5 > 0. p_k > 2×4^k/π − k − 1.53 olduğundan (3k + 6)/p_k → 0.

Teorem C. p = p_k için N(p) = p + k ve N(p − 1) = N − 2. Bu yüzden c(N − 1) ≥ 2^{p-1} − 1 ve Lemma 2'den c(N − 1) ≥ 2^{p-1}. N çift olsaydı c(N) = 2c(N − 1) ≥ 2^p > M_p olurdu. Çelişki. N = 2x + 1 için c(N) = c(2x)(2x + 1)/(x + 1) ≥ 2^{p-1}(2 − 1/(x + 1)) = 2^p(1 − 1/(N + 1)). Teorem B1'den doğrudan N = p_k + k = 2m_k − 1.

5. Hesaplar

Ekteki doğrulayıcı ifadelerin sonlu örneklerini sınar. Deponun kökünde Python 3.10 veya sonrası yeterlidir:

```
python3 -B tests/verify_np.py --quick
python3 -B tests/verify_np.py
```

Normal koşu 7 ile 20000 arasındaki her p'yi sınar. Hızlı koşu p = 1000'de durur ve normal koşunun yerine geçmeyen kısa bir kontroldür. `--json PATH` verilmedikçe iki kip de dosya yazmaz.

Kontrol	Normal koşu	Hızlı koşu
Yineleme ve math.comb ile merkez katsayıları	n = 0..20012	n = 0..1012
N(p), Teorem A, hata sınırları ve eşik karakterizasyonu	p = 7..20000	p = 7..1000

Kontrol	Normal koşu	Hızlı koşu
N(p) için yalnız toplama kullanan Pascal karşılaştırması	p = 7..128	p = 7..128
Lemma W	m = 1..10006	m = 1..506
m_k için doğrudan tarama	k = 1..8	k = 1..8
Kesin eşik sınırı kontrolleri	k = 1..12	k = 1..8
Özel kalan $c(2^M - 1)$ modulo 8	M = 3..20	M = 3..12
Oran sınırları	k = 2..11	k = 2..7
Eşik satırı sınırları	k = 3..12	k = 3..8

Karşılaştırmalar Python tamsayılarıyla yapılır. Machin özdeşliği $\pi = 16\arctan(1/5) - 4\arctan(1/239)$, her terimin kesme hatasını hesaba katarak rasyonel bir aralık verir. Ölçek 10^{90}’dır ve toplam aralık genişliğinin 10^{-80}’den küçük olduğu kontrol edilir. π içeren her karşılaştırmada bu aralık karar vermeye yeterli olmalıdır. Yetmezse program tahmin etmek yerine hata verir. Bilinen 50 basamakla uyum yalnız ek kontroldür, aralığın gerekçesi değildir.

Her eşik adayı için hem $2^k\,C(2m_k, m_k) < 4^{m_k}$ hem de $m_k - 1$’de bu sıkı eşitsizliğin sağlanmaması kontrol edilir. Tarama sınırının üstünde adayı tavan ifadesi önerir, fakat aday ancak kesin sınır kontrollerinden sonra kabul edilir. Genel üst hata sınırı, logaritmasız olarak $7\times4^{D(p)-2} \le p$ biçiminde sınanır. Logaritmalar yalnız yaklaşık uç değerleri göstermek için Decimal ile hesaplanır, bir kontrolün geçmesine karar vermez.

Normal aralıkta D(p), 38, 159, 646, 2601 ve 10422’de değişir. D(p) − h(p) hatası p = 7’de yaklaşık 0.270574 ile en büyük, p = 10421’de yaklaşık −0.999351 ile en küçüktür. Kayıtlı sonuç, gerçek koşu kapsamını ve kontrol sayısını verir. Normal koşu bütün kontroller geçtikten sonra 0 çıkış kodu döndürür. Süre makineye bağlıdır, özellikle k = 12’deki büyük kesin binom katsayıları süreyi belirler.

Bunlar sonlu hesap kontrolleridir. Yineleme, math.comb ve yalnız toplama kullanan karşılaştırma aynı Python tamsayı uygulamasını kullanır, bağımsız aritmetik altyapıları değildir. Genel ifadeler kanıtlara dayanır. Bütün k değerleri için tavan formülü açık kalır.

6. Açık soru

$p_k = 2\lceil 4^k/\pi - 1/4\rceil - k - 1$ eşitliğinin her k için tuttuğu KANITLANMADI. $4^k/\pi - 1/4$ sayısının kesir kısmı hiçbir zaman bir tamsayıya yaklaşık 4^{-k} kadar yaklaşmazsa eşitlik çıkar. π hakkında bunu çözen bir sonuç bilmiyorum. Teorem B1, B2, B3, B4 ve C buna dayanmıyor. Stirling serisinin daha fazla terimi istisna bandını daraltır ama ortadan kaldırmaz.

7. Notlar

1. Aynı eldesiz yazım ilkesi Islam ve ark. (2022) [4] çalışmasında da kullanılıyor. Onlar verilen bir n satırı için $b = 10^d$ tabanını seçiyor. d, c(n)’nin onluk basamak sayısıdır, böylece b > c(n) olur ve satır $(b + 1)^n$ sayısının bloklarından okunur. c(n) < b koşulu burada kullanılanla aynıdır. Onların çalışması satırı sabitleyip tabanı büyütüyor. Bu not tabanı M_p olarak sabitleyip en büyük satırı soruyor. Jiu ve Vignat [5], b-ary binom katsayılarıyla ilişkili sayısal binom özdeşliklerini inceler. Bu nesneler burada kullanılan normal binom katsayılarından farklıdır ve bu kanıtlarda o makalenin bir teoremi kullanılmaz. 2019 düzeltmesi de kaynakla birlikte bağlıdır.

2. Kullanılan parçalar Pascal kuralı, Legendre formülü, Robbins sınırları ve temel eşitsizliklerdir. Lemma 2, $c(2^M - 1) \equiv 3 \pmod 8$ için kısa modüler kanıtı içerir. Bu bir öncelik iddiası değildir.

3. $N(p) \approx p + \tfrac{1}{2}\log_2(\pi p/2)$ yaklaşımı $p + \tfrac{1}{2}\log_2(\pi p/2) + \text{sabit} + o(1)$ biçimine keskinleştirilemez: $N(p) - p$ bir tamsayıdır ve $N(p) - p - h(p)$ her platoda yaklaşık 0'dan neredeyse -1'e iner.

4. Önceki not [1], $p = 38$'den itibaren $p + 3$'üncü satırın da temiz olduğunu söylüyor. Teorem B1 bu ifadeyi her k için genişletiyor.

Kaynaklar

1. J. Augustus, Mersenne tabanlarında ikinin kuvvetleri, eldesiz Pascal satırları, bu depodaki önceki not.

2. H. Robbins, A remark on Stirling's formula, Amer. Math. Monthly 62 (1955), sayı 1, s. 26 ile 29. https://doi.org/10.2307/2308012

3. K. Conrad, Proofs of integrality of binomial coefficients, Bölüm 5, Legendre faktöriyel değerleme formülü.

4. M. S. Islam, M. R. Islam, M. S. Hossan, M. H. Kibria, Generating binomial coefficients in a row of Pascal's triangle from extensions of powers of eleven, Heliyon 8 (2022), sayı 11, e11651. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11651, ön baskı https://arxiv.org/abs/2005.14490

5. L. Jiu, C. Vignat, On binomial identities in arbitrary bases, J. Integer Sequences 19 (2016), makale 16.5.5. Makale, 2019 düzeltmesi.

6. OEIS A001405, dizi kaynağı olarak merkez katsayıları $C(n, \lfloor n/2 \rfloor)$.

Metin CC BY 4.0, kod MIT.