



A型肝炎疫苗 (Hepatitis A)

A型肝炎疫苗 (Hepatitis A)



◎疾病簡介

A型肝炎為一存在已久的疾病，其流行與環境有密切關係，好發於衛生條件不佳的地區。其主要的傳染途徑是經口（亦稱糞口）感染，亦即食用遭A型肝炎病毒汙染之食物或水而感染。潛伏期約2至6星期，感染後之症狀包括疲倦、厭食、發燒，黃疸、尿的顏色變濃、上腹部疼痛等。許多人感染後只有輕微的症狀或沒有症狀，大多數都會自然痊癒，然後產生抗體。惟極少數病例會發生猛爆型肝炎，嚴重的話可能致死，A型肝炎的致死率約千分之三。

◎認識疫苗

接種A型肝炎疫苗為預防A型肝炎病毒感染相當有效的方法之一。目前國內上市的A型肝炎疫苗有三種廠牌，均為不活化疫苗，核准的接種年齡為出生滿12個月以上，接種劑次無論成人或兒童都是2劑，2劑間隔至少6個月，接種1劑後約95%以上可產生保護抗體，完成2劑後，可提供20年以上的保護力。

◎接種禁忌

先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。

◎注意事項

- 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 孕婦。

◎接種後可能發生的反應

偶有注射部位疼痛、紅腫、熱感、輕微發燒、倦怠等反應，通常2-3天會恢復，如症狀持續或有其他不良反應，應請醫師診治。

◎我國A型肝炎疫苗接種政策

1. 政策歷程及實施地區對象

- 由於A型肝炎為經食物飲水傳染之急性傳染病，早期在山地偏遠地區因環境衛生較差，一旦有人感染，極易爆發流行。為阻遏山地鄉A型肝炎之聚集感染與流行，衛生署自民國84年(參閱我國預防接種政策[推行歷程](#))起陸續針對設籍30山地鄉及9個鄰近山地鄉之平地鄉等高風險地區之學幼童實施A型肝炎疫苗接種，執行至今，該等地區之A型肝炎均獲得有效控制。另因小三通可能造成A型肝炎引入之危機，故自91年起對金門、連江兩縣之兒童實施接種。107年1月起，提供106年1月1日(含)以後出生年滿12個月以上之幼兒常規接種，可提供20年以上的保護力，並自114年1月1日起調整為滿18個月、27個月接種第1、2劑。

2. 接種時程

- 出生滿18個月、27個月接種第1、2劑。

連結

[幼兒A型肝炎預防接種計畫](#) [預防接種紀要](#)

最後更新日期 2025/1/2
