



首頁



預防接種



疫苗簡介



公費疫苗



破傷風、白喉及百日咳相關疫苗



## 破傷風、白喉及百日咳相關疫苗



### ◎認識疫苗

白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺混合疫苗（DTaP-IPV）含全量百日咳成分，對於百日咳能提供更佳的免疫保護力。

### ◎接種時程

106年10月起滿5歲至入小學前接種1劑DTaP-IPV，以提升百日咳疫苗的追加接種效果。

### ◎接種禁忌

- 先前接種白喉破傷風百日咳相關疫苗及小兒麻痺疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
- 接種含百日咳疫苗後7天內曾發生腦病變，且無其他可解釋病因者。

### ◎注意事項

- 患有進行性痙攣症或神經系統疾病者，宜於醫師判斷病情已經穩定後才注射疫苗。
- 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 先前接種含破傷風疫苗後6週內曾發生過GBS者。
- 曾接種含破傷風類毒素疫苗後，發生Arthus過敏反應者，與次劑含破傷風類毒素疫苗應間隔10年以上再接種。

### ◎接種後可能發生的反應：

- 接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。上述反應，通常都是短暫的，會在數日內恢復，請勿揉、抓注射部位。

- 如接種部位紅腫十分嚴重或經過數日不退、出現化膿或持續發燒，請儘速就醫。

## 連結

[四合一疫苗Q&A](#)

最後更新日期 2025/3/5

---