



首頁



預防接種



疫苗簡介



自費疫苗



帶狀疱疹疫苗 (Zoster Vaccine)



帶狀疱疹疫苗 (Zoster Vaccine)



◎疾病簡介

1. 帶狀疱疹是水痘-帶狀疱疹病毒 (varicella-zoster virus) 再活化的表現，此種病毒初次感染時會引發水痘，之後此病毒會潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，直到再度活化引發帶狀疱疹。
2. 帶狀疱疹一般特徵為沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹。急性期皮疹及疼痛持續時間約數周，部分病患會併發帶狀疱疹後神經痛，此併發症疼痛可能持續數月甚至超過一年的時間。其他併發症包含眼部帶狀疱疹，嚴重可能導致失明。曾經得過帶狀疱疹者，痊癒後可能會再復發。
3. 危險因子：帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者、及免疫功能低下族群，包含人類免疫缺乏病毒感染、癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風溼性關節炎、使用免疫抑制劑患者等。

◎認識疫苗

接種帶狀疱疹疫苗可提高水痘-帶狀疱疹病毒特異性免疫力，預防帶狀疱疹及其併發症。目前取得我國藥品許可證之帶狀疱疹疫苗，為非活性基因重組帶狀疱疹疫苗。

◎自費接種建議

如具接種需求，建議可至醫院或診所洽詢，經醫師評估後自費接種：

50

18

◎接種禁忌

先前接種本疫苗或對本疫苗的任何成份曾發生嚴重過敏者。

◎注意事項

1. 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
2. 懷孕婦女應避免接種

◎接種後可能發生的反應

1. 接種部位可能有發紅、疼痛或腫脹等局部反應。
2. 可能有頭痛、四肢疼痛、發燒、疲倦等全身性反應。

最後更新日期 2023/6/14
