



輪狀病毒疫苗 (Rotavirus Vaccine)

輪狀病毒疫苗 (Rotavirus Vaccine)



◎疾病簡介

輪狀病毒是5歲以下幼兒腸胃炎的主要原因之一，它可引起嘔吐、水瀉、發燒、腹痛、食慾不振、甚或脫水。在已開發中國家，輪狀病毒腸胃炎很少造成死亡，但因嚴重水瀉而致需住院的比率仍高。由於我國具完善的健保及醫療體系，感染的幼童皆能妥適治療及照護。

◎認識疫苗

輪狀病毒疫苗目前國內上市的廠牌有兩種(分別為2劑、3劑時程)，皆為口服疫苗，第1劑最早之接種年齡為出生滿6週，每劑最短接種間隔為4週。

■ 建議接種時程：

- 2劑時程為出生滿2、4個月（最後1劑不得晚於出生後24週接種）。
- 3劑時程為出生滿2、4、6個月（最後1劑不得晚於出生後32週接種）。

◎自費接種建議

父母可評估寶寶的需求，至醫院診所自費接種。

◎接種禁忌

- 先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
- 患有嚴重複合型免疫功能不全(SCID)相關疾病者。
- 有腸套疊病史或有未經矯正之胃腸道畸形(如梅爾氏憩室)者。

◎注意事項

- 發生急性嚴重發燒性疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 有腹瀉或嘔吐症狀者，應延後接種。
- 免疫功能不全之嬰兒應審慎衡量效益及風險，再據以決定是否接種。

◎**接種後可能發生的反應**
常見的不良反應為腹瀉。

最後更新日期 2019/3/28
