

跳到主要內容 ::: | 網站導覽 (/sitemap_new) | 登入 (/gsplogin) | 註冊 (/gspsignup)



衛生福利部食品藥物管理署

藥品仿單查詢平台

(/)

::: 公告訊息 (/notice) 仿單查詢 (/im) 批次訂閱 (/im_batch)
訂閱清單 (/im_subscribe) 藥品外觀資料查詢 (/shape_list)

:::

字級

中文品名 ▶ 凍結乾燥卡介苗
英文品名 ▶ **FREEZE-DRIED BCG VACCINE**
許可證號 ▶ 衛署菌疫製字第**000085**號
藥品類別 ▶ 須由醫師處方使用
劑型 ▶ 注射劑
申請商名稱 ▶ 衛生福利部疾病管制署
申請商地址 ▶ 臺北市南港區研究院路2段**128**號
發證日期 ▶ **103-05-21**
有效日期 ▶ **118-05-25**
通關簽審文件編號 ▶ **DHY00900008509**
限制項目 ▶ 委託製造,國 產
包裝 ▶ **1**
3
5
10ml安瓿
100支以下盒裝

主製造廠

製造廠名稱 ▶ 財團法人國家衛生研究院生物製劑廠
(製程：受託製造廠)
製造廠地址 ▶ 苗栗縣竹南鎮科研路**35**號 (**TAIWAN**，**ROC**)

(/im_shape/衛署菌疫製字第000085號)

全部縮合

1 性狀

1.1 有效成分及含量

本品含牛型結核分枝桿菌。

1.2 賦形劑

賦形劑為麩胺酸鈉，不含保存劑。

1.3 劑型

注射劑。

1.4 藥品外觀

本品為牛型結核分枝桿菌（*Mycobacterium tuberculosis* var. *Bovis*）菌種 Tokyo 172培養之菌膜，經收集並凍結乾燥而成之白色至乳白色粉末，經稀釋液復原後為乳白色之懸浮液。

2 適應症

預防結核病。

3 用法及用量

3.1 用法用量

3.1.1 稀釋方法

1. 將安瓿頸部用酒精消毒，必須等到酒精全蒸發後，以滅菌膠紙在安瓿頸部緊密捲妥再折斷，將膠紙慢慢取下使空氣緩慢入安瓿內。
2. 用滅菌乾燥注射器，取適量稀釋液，徐徐注入疫苗安瓿中，輕搖數次直到裡頭的凍乾卡介苗粉末完全回溶為止，成為每毫升（mL）含0.5 毫克（mg）之懸浮液。每次抽取前應輕輕搖動安瓿，使之均勻分佈並呈現乳白不透明狀。

3.1.2 適用年齡

出生後即可接種，但潛伏結核感染檢驗陽性者不宜接種。

3.1.3 注射部位

左上臂三角肌中央皮內。

3.1.4 注射劑量

0.1 mL。

3.1.5 施打方法

1. 注射部位應保持乾燥與乾淨，如用消毒劑（例如酒精）擦拭，必須等到酒精完全蒸發後再行注射疫苗。
2. 注射位置：在肱骨上方三角肌末端位置（位置接近於上手臂算起1/3處進行皮內注射）。
3. 托住左手臂，大拇指置於接種部位下方，食指置於接種部位上方固定，勿繃緊。
4. 持針使針頭斜面朝上，針座置與手臂呈15度斜角平放輕壓，使皮膚略下陷後輕輕向前刺入後，持針手略為放鬆並繼續使針筒與皮膚平行前推至針頭斜面完全沒入皮內2毫米（mm）之真皮層後，固定針座，緩慢注入疫苗。
5. 正確注射後注射部位會呈現直徑8mm變白凸起。
6. 注射部位保持乾爽將有助於癒合結痂。
7. 卡介苗注射針筒最小刻度需至0.01mL，針頭使用28G/0.50 mm或是27G/0.50mm。

3.2 調製方式

如3.1.1稀釋方法。

4 禁忌

4.1 凡有下列病症或體質者不宜注射：

- 4.1.1 接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
- 4.1.2 嚴重濕疹與有明顯皮膚缺損的皮膚病。
- 4.1.3 免疫功能不全或因治療可能產生免疫不全者。
- 4.1.4 人類免疫缺乏病毒感染者，無論是否有症狀。
- 4.1.5 孕婦。

4.2 下列情況請先經醫師評估診察後，再決定是否接種：

- 4.2.1 疑似結核病人及疑似被結核菌感染者，勿直接接種卡介苗。應先進行胸部X光檢查及潛伏結核感染檢驗。
- 4.2.2 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 4.2.3 麻疹及水痘感染，待復原期（6週）後再接種。
- 4.2.4 請父母確認父母雙方家人沒有疑似先天性免疫缺失之家族史（如幼年因不明原因感染而死亡）。
- 4.2.5 生母為愛滋病毒感染者，其嬰幼兒應待追蹤滿4個月後，確定未受感染再接種。
- 4.2.6 提早接種之嬰兒體重應達2,500公克以上。
- 4.2.7 生母懷孕期間或哺乳期間曾使用免疫抑制治療藥物(如：TNF- α 拮抗劑)之嬰兒。

5 警語及注意事項

5.1 警語/注意事項

- 5.1.1 裝有卡介苗之安瓿未開啟前經檢視有龜裂時，不宜使用，因其效價可能降低甚鉅。
- 5.1.2 每安瓿一經打開稀釋後應立即使用，必須二小時內用完，並持續保冷（2~4°C）及避光儲存。
- 5.1.3 稀釋液亦應低溫保存，因其溫變若超過25°C易使疫苗凝集及效價降低。
- 5.1.4 接種部位應用適當消毒劑清潔，並待消毒劑揮發後再接種。
- 5.1.5 注射器須經高壓滅菌或使用滅菌完全之塑膠注射器（Sterile disposable needle & syringe）每人一套。
- 5.1.6 接種當日及次日應避免劇烈運動，接種部位及周圍應保持乾燥及清潔，並避免磨擦及沾濕。
- 5.1.7 對於駕駛與使用機器之影響：卡介苗接種後不會對駕駛與使用機器方面有任何影響。

6 特殊族群注意事項

6.8 其他族群

- 6.8.1 生母懷孕期間曾接受免疫抑制治療(如：TNF- α 拮抗劑治療)所生產之嬰兒，嬰兒之免疫狀態在出生後仍可能受影響，建議先經醫師評估後，於出生12個月後再進行卡介苗接種。若經醫師評估出生12個月內接種卡介苗具有明確之臨床效益或免疫抑制治療藥物暴露時間僅限於第一孕期，則經評估可於12個月內接種卡介苗，但建議不應早於6個月。
- 6.8.2 生母哺乳期間曾接受免疫抑制治療(如：TNF- α 拮抗劑治療)之嬰兒，建議在血清中檢測不到免疫抑制治療藥物濃度後才可接種卡介苗。

7 交互作用

7.1 卡介苗可與其他活性減毒疫苗同時或間隔任何時間接種。

7.2 卡介苗接種後不得於3個月內再度接種，否則容易產生有局部淋巴腺炎之不良反應。

8 副作用/不良反應

8.1 臨床重要副作用/不良反應

- 8.1.1 常見不良反應為接種部位發生局部紅腫疼痛，少數情形（<1/100，>1/1000）有發生局部淋巴結腫大（>1釐米（cm））形成膿泡，潰爛並流出膿液。若產生膿瘡應該保持乾燥且盡量不要磨擦到傷口。另依世界衛生組織於西元2018年報告指出，卡介苗嚴重不良反應發生率如下：

嚴重不良反應	每百萬劑發生率
化膿性淋巴結炎	710-10,140
骨炎、骨髓炎	0.01-700
瀰漫性卡介苗感染症	2-34

- 8.1.2 如有發生嚴重卡介苗不良反應事件時，請洽地方衛生局（所）協助轉介醫院診治及進一步釐清病因。

8.4 卡介苗接種後反應：

8.4.1 5個月大後接種之嬰兒接種部位正常樣態：

1. 發紅、小紅結節：近七成嬰幼兒在接種1至2週後開始發紅，1個月後超過九成嬰幼兒有發紅反應，之後逐漸變淡。形成小紅結節，微有痛癢但不發燒。
2. 腫脹：平均3週時會開始腫脹，約有四分之三的嬰幼兒接種部位腫脹小於1公分，約1%大於2公分。腫脹會逐漸變小，在4個月時約有三成仍有腫脹。
3. 瘀青：平均5週後約二成的嬰幼兒會產生瘀青。
4. 膿瘍或潰爛：平均6週開始化膿，約四成嬰幼兒會發生膿瘍或潰爛。不必擦藥，只要保持清潔及乾燥。如果有膿流出可用無菌紗布或棉花拭淨後覆蓋，避免擠壓及磨擦。
5. 癒合結痂：平均4個月開始結痂癒合，留下一個淡紅色小疤痕，經過一段時間後會變成膚色。
6. 部分嬰幼兒接種後，在同側腋下會出現淋巴腺腫脹現象，大多不必特別處理，會自行消退。少部分嬰兒接種後，局部嚴重紅腫、有受感染情形、疤痕經4至5個月無法癒合、腋窩淋巴腺異常腫大時，應請醫師診治。

8.4.2 提前接種之嬰兒（體重2500公克以上、有居住或經常前往結核病高盛行地區或國家者）接種部位正常樣態：

1. 發紅、小紅結節：接種卡介苗後之1至2週內出現，注射部位會呈現一個小紅結節，之後逐漸變大，微有痛癢但不發燒。
2. 膿泡或潰爛：4至6週可能發生膿瘍或潰爛。不必擦藥，只要保持清潔及乾燥。如果有膿流出可用無菌紗布或棉花拭淨後覆蓋，避免擠壓及磨擦。
3. 癒合結痂：平均2至3個月開始結痂癒合，留下一個淡紅色小疤痕，經過一段時間後會變成膚色。
4. 部分嬰兒接種後，在同側腋下會出現淋巴腺腫脹現象，大多不必特別處理，會自行消退。少部分嬰兒接種後，局部嚴重紅腫、有受感染情形、疤痕經2至3個月無法癒合、腋窩淋巴腺異常腫大時，應請醫師診治。

9 過量

目前尚無資訊。

10 藥理特性

10.1 作用機轉

目前尚無資訊。

10.2 藥效藥理特性

目前尚無資訊。

10.3 臨床前安全性資料

目前尚無資訊。

11 藥物動力學特性

目前尚無資訊。

12 臨床試驗資料

目前尚無資訊。

13 包裝及儲存

13.1 包裝

每安瓿1，3，5，10mL，10支以下盒裝。

13.2 效期

製造日期及保存期限詳示標籤。

13.3 儲存條件

本品應置於滅菌之中性茶褐色安瓿內，於2-8°C遮光保存，高溫放置效價驟減。

15 其他

15.1 本品經過嚴密之試驗，確知其效價及安全性均符合中華藥典之規定，並經國家檢定合格之活菌減毒疫苗。

15.2 稀釋液為生理食鹽水。

訂閱
...



(<https://accessibility.moda.gov.tw/Applications/Detail?category=20230922142826>)



衛生福利部食品藥物管理署
Food and Drug Administration

本網站所刊出內容之著作權屬於衛生福利部食品藥物管理署所有，未經本署之同意或授權，任何人不得以任何形式重製、轉載、散佈、引用、變更、播送或出版該內容之全部或局部，亦不得為其他任何違反本署著作權之行為。

☎ 服務專線：02-7737-2958

✉ 服務信箱：mcp@tradevan.com.tw

🕒 服務時間：週一～週五08:30~17:30

Copyright © 2019 衛生福利部食品藥物管理署

Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare. All rights reserved.