

0823-TAM-02

克立威®	膠囊75毫克
	膠囊75毫克 (意大利威)
	膠囊75毫克 (法國威)
Tamiflu®	Capsules 75 mg
Osetamivir phosphate	

- 說明**
- 用途/藥理分類**

Tamiflu® 為抗病毒製劑

ATC碼：J05AH02

- 劑型**

硬膠囊：75 毫克膠囊的膠囊體呈黃色不透明殼，印有“ROCHE”字，而膠囊帽側則呈淡黃色不透明殼，印有“75 mg”字，印皮皆為黃色。

- 使用途徑**

口服

- 無菌/成分活性聲明**

不適用

- 1.5 成分含量組成**

主成分 Osetamivir phosphate 75 毫克膠囊內含98.5毫克 Osetamivir phosphate 的成分，含有相當於75克 Osetamivir 的藥效。

賦形劑：pregelatinized starch • talc • povidone (K30) • croscarmellose sodium • sodium stercyl fumarate

- 1.5 次要藥效：** titanium dioxide (E171) • black iron oxide (E172) • iron oxide yellow (E172) • iron oxide red (E172) • gelatin • Printing ink: dehydrated alcohol, shellac glue, n-butyl alcohol, titanium dioxide • FD & C Blue 2 (E132) • D&A-3A alcohol •

- 6.1 藥物生物學**

作用機制

Osetamivir phosphate 是一種病毒的衍生物，會將病毒水解轉化為活性形式 Osetamivir carboxylate。Osetamivir carboxylate 是一種活性病毒神經氨酸酶抑制劑(neuraminidase)的抑制劑，影響病毒細胞複製。在使受感染細胞內MUNANA受體進行的神經氨酸酶分析中，osetamivir phosphate 比A型流感H1N1、A型流感H3N2及B型型流感病毒分別抑制IC₅₀，最低值分別為2.5 nM (德國威)3.16 nM (法國威) 0.36 nM (意大利威)13.95 nM (N=774) 和6.00 nM (D2.285 nM，N=256)。

- 抗感染活性**

以抗感染活性對 Osetamivir carboxylate 對流感病毒實驗室病毒株和體內及體外的抗病毒感染性，在細胞培養中，如細胞培養中，中度至高度的有效濃度為EC₅₀或EC₅₀。分別為0.0008 μM 高於35 μM和0.004 μM和0.04 μM的範圍內(1 μM = 0.284 μg/mL)。細胞培養中對病毒的高濃度，神經氨酸酶分析中的抑制活性，以及在人體中對病毒感染的保護作用之間的關係尚未建立。

- 抗毒性**

細胞毒性試驗：在增 brosectamivir carboxylate 濃度的情形下，可能發生的方式或病毒毒株的毒性，經對 osetamivir carboxylate 感染細胞的毒性及對病毒株的毒性，經對 osetamivir carboxylate 感染細胞的毒性進行評估，可能由於病毒株的毒株神經氨酸酶和/或紅血球凝集 (hemagglutinin) 中的 Osetamivir 感染所致。

- 臨床研究：** 敏感活性降低分析是 Osetamivir 治療期間以及從社區醫院研究時所採取的樣本，而 Osetamivir carboxylate 敏感活性降低的病毒神經氨酸酶水解酶不靈敏於表，此種活性降低與感染無影響。

- 在細胞培養中所發現對 Osetamivir 敏感活性低相關的紅血球凝集素抑制H2N3中的(流感病毒亞型特異性)H1N1、K173E和R453M；以及亞型流感病毒(山形株)的 H9N9。在這些條件下篩選出紅血球凝集素毒株會隨自己的神經氨酸酶水解酶活性變異，而可能導致 Osetamivir 的敏感性降低；然而，在人體中並未發現病毒水解酶活性的變異的影響，且很可能與病毒株無關。**

表1 神經氨酸酶水解酶對Osetamivir敏感活性降低相關的敏感病毒株

敏感病毒株*	
A型流感N1 (N1號被在括弧中)	
H1V7 (H197V), E11V9 (E191V), R152K (R152K), Y155H (Y155H), F173V (F174V), D198 (D198V), G124V (G124V), H223K (H223K), S246K (S247K), G248K-1266V (G248V), H274V (H275V), N204K (N205S), G312K-427 (G313K-427), N252K (N253K), R371K (R368K)	
A型流感N2	
EE1G, E191V, P145V, I222V, V, Q226H, S4SG24-428 (德國威), S247P, R992K, N294S	
亞型流感病毒亞型(山形株)	
E119A (E117A), D115 (P198), G124H (R140R), R152K (R150K), D198V (D197E), V, I222V, V (G122V), V, A246D/S1 (A245D/S1), H274V (H273V), N294S (N294S), R371K (R374K), G248S (G407S)	

*除非另有說明，否則所有編號均為N2。

在神經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

經氨酸酶水解酶生化分析中曾觀察到Osetamivir和zanamivir的交叉反應性。在N1神

已有流為兩人服用Tamiflu®期間產生癲癇類似神經腫脹的神經事件群的報告。大多數為1歲和少於1歲。絕大多數則，此類事件與急慢性中毒。Tamiflu®

對於這類事件的因素尚未確定。另也未有服用Tamiflu®之流為病人及健康照顧者

報告的報告。三項研究均沒有進行研究證實，和未接受治療藥物治療的流為病

人相比較，接受Tamiflu®治療之流為病人發生神經事件群的風險並未較高(參閱2.2.2後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

2.2.2.2 後述)。

Tamiflu®)的上市使用期間曾發現下列不良事件，由於這些是由一群不特定大之

該類事件發生的原因尚未確定。因此不能確定此類事件與服用Tamiflu®有直接關

係。所有服用Tamiflu®者曾有發生過類似副作用的報告，例如過敏性皮膚反應、包

皮皮膚炎、皮膚疹、流涕、鼻痛、多形性紅斑、過敏性反應性支氣管炎、面

部水腫、Stevens-Johnson候群及中毒性表皮剝離。

肝膽系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

神經系統：服用Tamiflu®的受試者中，有不良反應上升和肝酶發生。

</