



[首頁](#) > [傳染病與防疫專題](#) > [傳染病介紹](#) >

[第四類法定傳染病](#) > [流感併發重症](#) > [Q & A](#) >

[季節性流感疫苗](#) > [流感疫苗重點訊息](#) > [接種注意事項](#)

接種注意事項



全部展開

Q：流感疫苗可否和其他疫苗或COVID-19疫苗同時接種？



Q：接種流感疫苗有哪些禁忌症(contraindications)？



絕大部分流感疫苗是不活化疫苗，民眾可安心接種，僅有以下接種禁忌症者不建議接種：

1. 已知對疫苗的成分有嚴重過敏者，不予接種。
2. 過去注射曾經發生嚴重不良反應者，不予接種。
3. 另外未滿6個月大之嬰兒因缺乏安全性與保護力相關資料，不建議接種。除此以外包括食物過敏、輕微上呼吸道症狀者，均可安心接種流感疫苗。

另外，鼻噴式流感疫苗(LAIV)為活性減毒疫苗，仿單記載接種禁忌症包括以下：

1. 如果對此疫苗任何成分(包括蛋類蛋白質) 曾有嚴重過敏反應 (例如立即型嚴重過敏反應[anaphylaxis])，或曾在接種任何流感疫苗後出現嚴重過敏反應，請勿接種。
2. 雷氏症候群(Reye syndrome)與同時使用阿斯匹靈(aspirin)或水楊酸類藥物的17歲以下兒童及青少年，請勿接種。

3. 嚴重免疫缺陷者，例如因急性和慢性白血病、淋巴瘤、有症狀的HIV感染、細胞免疫缺陷、正在使用高劑量皮質類固醇或免疫抑制療法等具有臨床免疫缺陷的兒童和青少年，請勿接種。

最後更新日期 2026/8/7

Q：接種流感疫苗有哪些注意事項（precautions）？



1. 發燒或正患有急性中重疾病者，宜待病情穩定後再接種。
2. 出生未滿6個月，因無使用效益及安全性等臨床資料，故不予接種。
3. 先前接種本疫苗6週內曾發生Guillain-Barré症候群（GBS）者，宜請醫師評估。
4. 其他經醫師評估不適合接種者，不予接種。

最後更新日期 2026/8/7

Q：對雞蛋/蛋的蛋白質過敏者是否可接種流感疫苗？



可以。因大部分使用之流感疫苗，其病毒來自於雞胚蛋培養，傳統上認為疫苗中可能含有雞蛋蛋白成分，曾經建議有雞蛋過敏史者，接種疫苗後需觀察一段時間，確定未產生過敏反應。但近期研究顯示，因流感疫苗製程進步，內含的雞蛋蛋白成分已極少，雞蛋過敏者接種雞胚蛋培養之流感疫苗並不會增加過敏反應發生率，因此國際上皆建議雞蛋過敏者可安心照一般流程接種流感疫苗。

最後更新日期 2026/8/14

Q：有過敏體質的民眾，可以接種流感疫苗嗎？



接種流感疫苗前，皆須先經醫師評估身體狀況，若為過敏體質，應於接種前告知醫師，由醫師評估是否接種疫苗。

最後更新日期 2026/8/7

Q：使用抗血小板或抗凝血藥物（如Aspirin、Warfarin、Clopidogrel、Ticlopidine）者是否可採以肌肉注射接種流感疫苗？注意事項為何？

建議接種，使用抗血小板或抗凝血藥物（如Aspirin、Warfarin、Clopidogrel、Ticlopidine）者多為罹患流感之高風險群，若無禁忌症，建議仍應接種流感疫苗，惟醫師應列入問診事項，於接種時使用23號或直徑更小的針頭，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。

最後更新日期 2026/8/14

Q：流感疫苗接種後注意事項？

1. 接種疫苗後有相當小的機率會發生立即型過敏反應，並導致過敏性休克。為了能在事件發生後立即進行醫療處置，接種疫苗後應於接種單位或附近稍做休息，並建議於接種後應坐或躺約15分鐘，離開後請自我密切觀察15分鐘，以避免因發生昏厥而摔倒受傷。
2. 使用抗血小板或抗凝血藥物或凝血功能異常者，施打後於注射部位加壓至少2分鐘，並觀察是否仍有出血或血腫情形。
3. 接種後應注意有無持續發燒（超過48小時）、呼吸困難、心跳加速、意識或行為改變等異常狀況，如有不適，應儘速就醫，告知醫師相關症狀、症狀發生時間、疫苗接種時間，以做為診斷參考，並通報當地衛生局。
4. 完成疫苗接種後，雖可有效降低感染流感病毒的機率，但仍可能罹患其他呼吸道感染，故仍請注意個人衛生保健及各種預防措施，維護身體健康。
5. 若是接種鼻噴式流感疫苗(LAIV)，接種後應避免密切接觸免疫功能嚴重低下者。

最後更新日期 2026/8/7

Q：流感疫苗接種劑量錯誤之補接種原則為何？

流感疫苗為單劑型，每劑0.5mL。不論是幼兒還是成人均接種0.5mL劑型，3歲以下幼兒接種劑量無須減半。

如發生接種劑量不足時，應於當日立即補足至個案應接種之劑量，如於隔天或隔天之後補接種，則須補接種完整0.5mL疫苗；如發生接種劑量超出應接種量時，視為完成接種，無須再補接種。

如發生接種劑量錯誤時，醫療單位均應通知/告知當事人，並應向轄區衛生局(所)通報接種異常事件。

最後更新日期 2026/8/7

Q：倘誤接種非該年齡適用之流感疫苗，其因應處置方式為何？

倘發生誤接種非該年齡適用之流感疫苗，醫療院所均應將其視為「接種異常事件」，並依循下列步驟進行妥善處置：

1. 不須補接種：確認發生誤接種情事後，不須再為當事人補接種其他任何流感疫苗。
2. 主動告知當事人：醫療人員應主動且明確地向民眾說明誤接種狀況。
 - A. 若為「不符仿單適用對象」（如未滿3歲幼兒接種國光公司安定伏裂解型流感疫苗或高端公司福喜健三價流感疫苗、未滿65歲接種高劑量加強型疫苗、未滿50歲接種含佐劑加強型疫苗），須向當事人說明目前尚無該年齡層之安全性與有效性臨床資料。
 - B. 若為「不符公費政策」（如50-64歲接種公費含佐劑加強型疫苗），須說明其雖符合藥品仿單適用範圍，惟不符合現行公費補助規定。
3. 追蹤個案狀況：院所應建立健康關懷機制，持續追蹤當事人後續之身體健康狀況並留存紀錄，以確保民眾用藥安全。
4. 通報衛生單位：備妥相關資料，主動向轄區衛生局(所)完成「接種異常事件」之通報作業。後續則依「衛生福利部疾病管制署公

費疫苗毀損賠償等級」等相關規定辦理。

最後更新日期 2026/8/7

Q：為何國光公司安定伏裂解型流感疫苗及高端公司福喜健三價流感疫苗不可接種於未滿3歲幼兒？若未滿3歲幼兒誤接種該兩廠牌流感疫苗之因應處置為何？

依據國光公司安定伏裂解型流感疫苗及高端公司福喜健三價流感疫苗之仿單說明，該兩廠牌疫苗適應年齡為3歲以上兒童及成人，故不建議接種於未滿3歲幼兒，另廠商目前並無未滿3歲幼兒接種該疫苗之臨床資料可供解釋或說明其安全性及有效性。如未滿3歲幼兒誤接種該兩廠牌流感疫苗時，由於其疫苗內含抗原劑量與其他流感疫苗一樣，故不必再補接種其他適用疫苗，惟醫療單位均應通知/告知當事人，追蹤個案狀況並向轄區衛生局(所)通報接種異常事件。

最後更新日期 2026/5/11

Q：若接種完公費流感疫苗後才發現個案本季已接種過流感疫苗應如何處理？

醫療單位應告知當事人，追蹤個案狀況並向轄區衛生局(所)通報接種異常事件。

最後更新日期 2026/8/14