

凍結乾燥卡介苗

Freeze-Dried BCG Vaccine

衛署菌疫製字第000085號

本品為牛型結核分枝桿菌 (*Mycobacterium tuberculosis* var. *Bovis*) 菌種 Tokyo 172 培養之菌膜，經收集並凍結乾燥而成之白色至乳白色粉末，經稀釋液復原後為乳白色之懸浮液。本品經過嚴密之試驗，確知其效價及安全性均符合中華藥典之規定，並經國家檢定合格之活菌減毒疫苗。

成份

本品含牛型結核分枝桿菌；賦形劑為麩胺酸鈉，不含保存劑。

適應症

預防結核病

用法用量

稀釋方法：1. 將安瓿頸部用酒精消毒，必須等到酒精完全蒸發後，以滅菌膠紙在安瓿頸部緊密捲妥再折斷，將膠紙慢慢取下使空氣緩慢入安瓿內。
2. 用滅菌乾燥注射器，取適量稀釋液，徐徐注入疫苗安瓿中，輕搖數次直到裡頭的凍乾卡介苗粉末完全回溶為止，成為每毫升 (mL) 含 0.5 毫克 (mg) 之懸浮液。每次抽取前應輕輕搖動安瓿，使之均勻分佈並呈現乳白不透明狀。

適用年齡：出生後即可接種，但結核菌素測驗反應陽性者不宜接種。

注射部位：左上臂三角肌中央皮內。

注射劑量：0.1 mL，本藥須由醫師處方使用。

施打方法：1. 注射部位應保持乾燥與乾淨，如用消毒劑（例如酒精）擦拭，必須等到酒精完全蒸發後再行注射疫苗。
2. 注射位置：在肱骨上方三角肌末端位置（位置接近於上手臂算起 1/3 處進行皮內注射）。
3. 托住左手臂，大拇指置於接種部位下方，食指置於接種部位上方固定，勿繃緊。
4. 持針使針頭斜面朝上，針座置與手臂呈 15 度斜角平放輕壓，使皮膚略下陷後輕輕向前刺入後，持針手略為放鬆並繼續使針筒與皮膚平行前推至針頭斜面完全沒入皮內 2 毫米 (mm) 之真皮層後，固定針座，緩慢注入疫苗。
5. 正確注射後注射部位會呈現直徑 8mm 變白凸起。
6. 注射部位保持乾爽將有助於癒合結痂。
7. 卡介苗注射針筒最小刻度需至 0.01mL，針頭使用 28G/0.50 mm 或是 27 G/0.50mm。

注意事項

1. 裝有卡介苗之安瓿未開啟前經檢視有龜裂時，不宜使用，因其效價可能降低甚鉅。
2. 每安瓿一經打開稀釋後應立即使用，必須二小時內用完，並持續保冷（2~4℃）及避光儲存。
3. 稀釋液亦應低溫保存，因其溫變若超過 25℃ 易使疫苗凝集及效價降低。
4. 接種部位應用適當消毒劑清潔，並待消毒劑揮發後再接種。
5. 注射器須經高壓滅菌或使用滅菌完全之塑膠注射器 (Sterile disposable needle & syringe) 每人一套。
6. 接種當日及次日應避免劇烈運動，接種部位及周圍應保持乾燥及清潔，並避免磨擦及沾濕。
7. 對於駕駛與使用機器之影響：卡介苗接種後不會對駕駛與使用機器方面有任何影響。

禁忌

凡有下列病症或體質者不宜注射：

1. 接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
2. 嚴重濕疹與有明顯皮膚缺損的皮膚病。
3. 免疫功能不全。
4. 人類免疫不全病毒感染者，無論是否有症狀。
5. 孕婦。

下列情況請先經醫師評估診察後，再決定是否接種：

1. 疑似結核病人及疑似被結核菌感染者，勿直接接種卡介苗。應先進行結核菌素測驗及胸部 X 光檢查。
2. 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
3. 麻疹及水痘感染，待復原期 (6 週) 後再接種。
4. 請父母確認父母雙方家人沒有疑似先天性免疫缺失之家族史 (如幼年因不明原因感染而死亡)。
5. 生母為愛滋病毒感染，其嬰幼兒應待追蹤滿 4 個月後，確定未受感染再接種。
6. 提早接種之嬰兒體重應達 2,500 公克以上。

與其他藥物間之交互作用

1. 卡介苗可與其他活性減毒疫苗同時或間隔任何時間接種。
2. 卡介苗接種後不得於 3 個月內再度接種，否則容易產生有局部淋巴腺炎之不良反應。

接種後反應

卡介苗接種後反應：

1. 小紅結節期：卡介苗初次接種之正常反應是在 7 至 14 天，由注射之部位呈現出來。
2. 膿泡或潰爛期：小紅結節逐漸長大，微有痛癢，不會發燒，四至六週可變成膿泡或潰爛，膿液流出時可用無菌棉花或紗布拭除，不可擠壓，不可擦藥或包紮，保持清潔。
3. 癒合結痂：平均二至三個月間，潰爛自會癒合，留有一個微紅色的疤，經過一段時間後變成膚色。嬰兒接種後，在同側腋窩偶而有淋巴腺稍脹大之現象，並不要緊，會自行消失。

上述各種反應嚴重時，應請醫師診治。

接種後不良反應

常見不良反應為接種部位發生局部紅腫疼痛，少數情形 (<1/100, >1/1000) 有發生局部淋巴結腫大 (>1 釐米 (cm)) 形成膿泡，潰爛並流出膿液。若產生膿瘡應該保持乾燥且盡量不要磨擦到傷口。另依世界衛生組織於西元 2018 年報告指出，卡介苗嚴重不良反應發生率如下：

嚴重不良反應	每百萬劑發生率
化膿性淋巴結炎	710-10,140
骨炎、骨髓炎	0.01-700
瀰漫性卡介苗感染症	2-34

如有發生嚴重卡介苗不良反應事件時，請洽地方衛生局（所）協助轉介醫院診治及進一步釐清病因。

貯藏與效期

本品應置於滅菌之中性茶褐色安瓿內，於 8℃ 以下遮光保存，高溫放置效價驟減，製造日期及保存期限詳示標籤。

包裝

每安瓿 1, 3, 5, 10mL, 10 支以下盒裝。稀釋液為生理食鹽水。

委託者：衛生福利部疾病管制署
地 址：台北市南港區昆陽街 161 號
製造廠：財團法人國家衛生研究院生物製劑廠
廠 址：苗栗縣竹南鎮科研路 35 號