



**Раствор
для инфузий**

**5% L-аминокислот/
Флаконы по 100 мл и 250 мл**

Инфузиол-НЭД

L-изолейцин
L-лейцин
L-лизин гидрохлорид
L-метионин
L-фенилаланин
L-треонин
L-триптофан
L-валин
L-аргинина

3,52
4,9
4,3
2,25
5,33
2,5
0,9
3,6
5

Незаменимая
Незаменимая
Незаменимая
Незаменимая
Незаменимая
Незаменимая
Незаменимая
Незаменимая
Условно незаменимая

L-гистидина
L-аланин
Глицин
L-пролин
L-серин
L-цистеин
Сорбитол
Натрий метабисульфит
Вода для инъекций

2,5
2
7,6
1
1
0,1
50,0 г
0,2
До 1 л

Условно незаменимая
Заменяемая
Заменяемая
Заменяемая
Заменяемая
Заменяемая

Сила аминокислот для восстановления жизни!

Сбалансированный состав

L-аминокислоты, включая все незаменимые и условно незаменимые

Клиническая эффективность

Поддержка анаболических процессов, восстановление тканей

Безопасность

Стерильный раствор, подходит для длительного применения

Гибкость применения

Доступен во флаконах 100 и 250 мл, легко комбинируется с жирами и углеводами

Совместимость

Может использоваться в составе полного парентерального питания

Инфузиол-НED

Сбалансированный аминокислотный раствор, предназначенный для питательной поддержки пациентов в критических и катаболических состояниях, при невозможности энтерального питания

Показания к применению Инфузиол-НED

Тяжёлые травмы и ожоги	Высокий катаболизм, потребность в азоте и аминокислотах
Обширные хирургические вмешательства	Поддержка регенерации и профилактика гипопроteinемии
Сепсис, шок, системные воспаления	Поддержка метаболической адаптации и иммунной функции
Истощение, белково-энергетическая недостаточность	Восполнение аминокислот и поддержка азотистого баланса
Невозможность энтерального питания	Парентеральное питание как основной источник нутриентов
Периоперационный и постреанимационный период	Ускорение восстановления, предотвращение катаболизма

Дозы и способ применения:

Возраст	Суточная доза	Примечание
Взрослые	От 0,6 до 1,0 г аминокислот (до 20 мл раствора/кг массы тела в сутки) При катаболических состояниях - 1,3 - 2 г аминокислот (до 40 мл раствора/кг массы тела в сутки)	При парентеральном питании у взрослых общее количество введенной жидкости не должно превышать 40 мл/кг массы тела в сутки
Дети от 2 до 6 лет	10 мл/кг массы тела ~ 1,0 г аминокислот/кг массы тела	
Дети от 6 до 14 лет	15 мл/кг массы тела ~ 1,5 г аминокислот/кг массы тела	

Особые указания:

При печеночной и почечной недостаточности требуется индивидуальная дозировка.
При печеночной и почечной недостаточности, ацидозе, шоке препарат применяют только после достижения адекватного диуреза.
При использовании «Инфузиол-НED» требуется контроль водно-электролитного баланса, концентрации глюкозы в крови, кислотно-щелочного равновесия.
Взаимодействие с другими лекарствами:
Одновременное введение аргинина с тиазидными диуретиками и аминофиллином увеличивает содержание инсулина в крови. При одновременном применении аргинина со спиронолактоном возможна тяжелая гиперкалиемия.
Несовместим с другими лекарственными средствами (не следует бесконтрольно смешивать с другими лекарственными средствами). При введении препарата следует учитывать, что аргинин не совместим с тиопенталом.

Производитель

Jiangsu Pengyao Pharmaceutical Co., Ltd 10 Chayuan Road, Yixing, China
Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:
ООО «DAANTEC»
Республика Узбекистан,
г. Ташкент, Сергелийский район,
улица Хонобод, дом 46Б.
Тел.: +998950522552

