



ЛЕТОКАР

L-аргинин
гидрохлорид
4,2 г/100 мл

Показания к применению

- Метаболический алкалоз
- Гипераммониемия
- Атеросклероз сосудов сердца и головного мозга
- Атеросклероз периферических сосудов
- Диабетическая ангиопатия
- Артериальная гипертензия
- Хроническая сердечная недостаточность
- Гиперхолестеринемия ХОЗЛ (хронические обструктивные заболевания лёгких)
- Лёгочная гипертензия
- Задержка развития плода
- Преэклампсия

Способ применения

Способ введения	Внутривенно капельно
Начальная скорость инфузии	10 капель в минуту (первые 10-15 минут)
Увеличенная скорость инфузии	До 30 капель в минуту (после 10-15 минут)
Стандартная суточная доза	100 мл раствора
Повышенная суточная доза (при тяжелых состояниях: нарушения кровообращения, интоксикация, гипоксия, астенция)	До 200 мл в сутки
Максимальная скорость введения	Не более 20 ммоль/час
Детская доза (до 12 лет)	5-10 мл на 1 кг массы тела в сутки
Особенности введения при алкалозе	Начинать с ½ рассчитанной дозы; дополнительная коррекция — после анализа кислотно-щелочного состояния

Дети

Препарат применяют детям в возрасте от 3 лет.

Применение в период беременности или кормления грудью

Препарат проникает через плаценту, поэтому в период беременности его можно применять только тогда, когда ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату
Тяжелые нарушения функции почек, гиперхлоремический ацидоз
Аллергические реакции в анамнезе
Применение калийсберегающих диуретиков, а также спиронолактона

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При применении Летокара необходимо учитывать, что он может вызвать выраженную и стойкую гиперкалиемию на фоне почечной недостаточности у больных, принимающих или принимавших спиронолактон.
Предварительное применение калийсберегающих диуретиков также может способствовать повышению уровня концентрации калия в крови.

Производитель

Shijiazhuang No.4 Pharmaceutical Co. Ltd Китай

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения)
по качеству лекарственных средств: ООО «DAANTEC» Республика Узбекистан,
Ташкент, Сергелийский район улица Ханабад 46 Б
Телефон: +998(95)052-25-52



Раствор
для инфузий

ЛЕТОКАР

L-аргинин
гидрохлорид
4,2 г/100 мл

ТОЧНАЯ ФОРМУЛА СОСУДИСТОГО КОМФОРТА

Донатор NO и корректор эндотелиальной дисфункции

Обладает выраженным сосудорасширяющим и
антиагрегационным действием

Увеличивает образование оксида азота в организме человека

Является активным и разносторонним клеточным
регулятором многочисленных жизненно важных
функций организма

Оказывает эффективное гепатопротекторное действие




L-аргинин в инфузионной форме с оптимальной дозировкой 4,2 г/100 мл для быстрой и контролируемой поддержки сосудистой и метаболической функции организма.

МОЩНЫЙ ВАЗОДИЛАТОР, РЕГУЛЯТОР ТОНУСА СОСУДОВ

L-Аргинин расширяет диаметр сосуда согласно тканевым нуждам

Как L-Аргинин работает в нашем организме

Сечение сосуда
Гладкие мышцы
Эндотелий



- L-аргинин является одним из основных субстратов в цикле синтеза мочевины в печени.
- Гипоаммониемический эффект препарата реализуется путем активации превращения аммиака в мочевины.
- Оказывает гепатопротекторное действие, положительно влияет на процессы энергообеспечения в гепатоцитах.



Препарат Летокар рекомендован для широкого клинического применения в РУз

КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

В соответствии с утвержденным протоколом и стандартов лечения на базе Ташкентской областной специализированной соматической больницы в отделениях кардиологии и неврологии, было проведено постмаркетинговое клиническое исследование препарата **ЛЕТОКАР** 500 флаконов у 100 больных с заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы.

Результаты клинического исследования

Кардиологическая

- ↓ Частота стенокардии
- ↑ Физическая выносливость
- ↑ Фракция выброса
- Стабилизация АД

Неврологическая

- ↑ Память, внимание
- ↓ Головная боль, головокружение
- ↑ Мозговой кровоток
- ↓ Вегетативные симптомы

Хорошая переносимость

Не выявлено серьезных побочных реакций

Не вызывает аритмий или ортостатических реакций

Показания Летокара

Кардиология	Неврология
Ишемическая болезнь сердца	Хроническая ишемия мозга
Хроническая сердечная недостаточность	Энцефалопатия
	Постинсультные состояния
	Когнитивные и вегетативные нарушения

Выводы: Летокар – эффективное средство для:

- Улучшения системной и церебральной гемодинамики
- Снижения симптомов ишемии и когнитивных расстройств
- Повышения качества жизни пациентов

Препарат может использоваться в составе комплексной терапии и вторичной профилактики осложнений после инсульта и при ХСН.