



Раствор для инфузий
Флаконы 100 мл и 250 мл

МЕГАСОЛ

*Тройная поддержка:
энергия, электролиты, гидратация*

СОСТАВ (на 1 мл):

Глюкоза 50 мг

Калия хлорид 1,5 мг

Натрия хлорид 4,5 мг



Физиологически сбалансированный состав

Низкий риск гиперосмолярности

Готовность к немедленному применению

Безопасен для широкого круга пациентов (включая детей)

Прозрачный и понятный протокол назначения

Подходит для начальной терапии

Низкая осмолярность (≈ 315 мОсм/л)

Удобные объемы (100 и 250 мл)

МЕГАСОЛ

Оптимальное решение для быстрой и сбалансированной инфузионной коррекции энергии, жидкости и электролитов при лёгкой и умеренной дегидратации, гипогликемии и нарушениях водно-электролитного баланса.

Фармакологические компоненты и их действия:

Компонент	Концентрация	Ключевая функция
ГЛЮКОЗА	50 мг/мл	ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Поддержание метаболизма		
Профилактика гипогликемии		
КАЛИЯ ХЛОРИД	1,5 мг/мл	КОРРЕКЦИЯ ГИПОКАЛИЕМИИ
Поддержка сердечного ритма		
Нервно-мышечная передача		
НАТРИЯ ХЛОРИД	4,5 мг/мл	ВОСПОЛНЕНИЕ ОБЪЁМА ЦИРКУЛИРУЮЩЕЙ КРОВИ
Осморегуляция		
Поддержание артериального давления		

Клинические ситуации и рекомендации по применению

Состояние	Цель терапии	Рекомендованная доза	Дополнительно
Гипогликемия (лёгкая/средняя)	Восполнение глюкозы, предупреждение осложнений	200–400 мл в/в капельно	Струйно 40–60 мл 40% глюкозы при необходимости
Постоперационный период	Энергоподдержка, коррекция ОЦК	500–1500 мл/сут в/в капельно	Контроль диуреза, мониторинг электролитов
Рвота/диарея, дегидратация	Восполнение жидкости и электролитов	Дети: 20–50 мл/кг/сут Взрослые: 500–1500 мл/сут	Контроль натрия/калия
Лёгкая гипокалиемия	Устранение дефицита калия	500–1000 мл/сут в/в капельно	Возможно добавление К ⁺ под контролем ЭКГ
Интоксикация с полиурией	Коррекция ОЦК, детоксикация	1000–2000 мл/сут	Комбинация с диуретиками, витаминами, сорбентами

Внутривенно капельно со скоростью 20–30 капель в минуту. Перед подачей раствор необходимо подогреть до 36–38 °С. Дозы для взрослых - 10–20 ммоль (0,5–1,0 л), калийсберегающий раствор (2,0 л) максимально до 40 ммоль вводят в течение 1–3 часов. Детям - 0,3–0,5 ммоль/кг в час. Следует отметить, что концентрация калия в 1 л раствора составляет 20 ммоль.

Беременность и лактация:

При необходимости применения во время беременности следует взвесить ожидаемую пользу для матери и потенциальный риск для плода. В период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания.

Противопоказания к применению:

- Нарушение выделительной функции почек;
- Полная блокада сердца;
- Гиперкалиемия различной этиологии.

Производитель

ООО «Samarkand England Eco-Medical»,
Республика Узбекистан, 140163, г. Самарканд, ул. Фарход, дом 9.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО «DAANTEC»

Республика Узбекистан,
г. Ташкент, Сергелийский район,
улица Хонобод, дом 46Б.
Тел.: +998950522552

