


**Раствор для полной
и быстрой коррекции
метаболических
нарушений!**



СТОЛАКСОЛ

Раствор 100 мл, 200 мл для инфузий

Сорбитол
Натрия лактат
Натрия хлорид
Кальция хлорид (в пересчете на сухое вещество)
Калия хлорид
Магния хлорид (в пересчете на сухое вещество)
Вспомогательные вещества: вода для инъекций –

60 мг
19 мг
6 мг
0,1 мг
0,3 мг
0,2 мг
до 1 мл



Для улучшения капиллярного кровотока с целью профилактики и лечения травматического, операционного, гемолитического, токсического и ожогового шока, при острой кровопотере, ожоговой болезни

Инфекционные заболевания, сопровождающиеся интоксикацией, обострением хронического гепатита

Сепсис

Для предоперационной подготовки и в послеоперационный период

Для улучшения артериального и венозного кровообращения с целью профилактики и лечения тромбозов, тромбофлебитов, эндартериитов

Болезнь Рейно

Обладает реологическим, противошоковым, дезинтоксикационным, а также ощелачивающим действием!

Сорбитол В печени сорбитол вначале преобразуется в фруктозу, которая в дальнейшем преобразуется в глюкозу, а потом в гликоген. Часть сорбитола используется для срочных энергетических потребностей, другая часть откладывается как запас в виде гликогена.	Натрия лактат Действием натрия лактата происходит коррекция метаболического ацидоза по мере включения его в обмен веществ. Не возникает резких колебаний pH. Действие натрия лактата проявляется через 20-30 мин после введения.
Натрия хлорид Имеет регидрирующее действие.	Кальция хлорид Восполняет дефицит ионов кальция.
Калия хлорид Восстанавливает водно-электролитный баланс.	Магния хлорид Активирует витамины, ферменты и антитела, укрепляющих иммунную систему. Стимулирует выработку энергии в клетках.

Способ применения

Взрослым в/в струйно или капельно.

В/в капельно со скоростью 40-60 капель в минуту. При необходимости допускается струйное введение препарата после проведения пробы путем капельного введения со скоростью 30 капель в минуту. После введения 15 капель, инфузию препарата прекращают, а через 3 мин, при отсутствии реакции, Столаксол вводят струйно.

	Дозировка
При хронических гепатитах	По 400 мл (6-7 мл/кг массы тела) капельно, повторно
При тромбооблитерирующих заболеваниях кровеносных сосудов	Из расчета 8-10 мл/кг массы тела, капельно, повторно, через день, до 10 инфузий на курс лечения
В предоперационном периоде и после различных хирургических вмешательств	В дозе 400 мл (6-7 мл/кг массы тела) капельно, однократно или повторно, ежедневно, на протяжении 3-5 дней
При острой кровопотере	По 1500-1800 мл (до 25 мл/кг массы тела). Рекомендуется проводить на догоспитальном этапе, в специализированной машине скорой помощи
При травматическом, ожоговом, послеоперационном и гемолитическом шоке	По 600-1000 мл (10-15 мл/кг массы тела) однократно и повторно, сначала струйно, затем капельным методом
Детям в возрасте до 6 лет	В дозе из расчета 10 мл/кг массы тела
Детям от 6 до 12 лет	В дозе, составляющей половину дозы для взрослых
Детям старше 12 лет	В дозе, такой же, как и для взрослых

Побочные действия

Могут возникнуть явления алкалоза, аллергические реакции (высыпания на коже, зуд).

Особые указания

Препарат применяют под контролем показателей КЩС и электролитов крови, а также функционального состояния печени. С осторожностью применяют у больных, страдающих калькулезным холециститом.

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств:

ООО «**DAANTEC**» Республика Узбекистан, Ташкент, Сергелийский район улица Ханабад 46 Б
Телефон: +998(95)052-25-52