




Когда телу нужны
строительные блоки —
дайте ему лучшее!



Раствор для инъекций

8% L-аминокислот/Флакон 250 мл

АМИНОМАГТ

L-пролин	8,00 г
L-серин	5,00 г
L-аланин	7,70 г
L-изолейцин	9,00 г
L-лейцин	11,00 г
L-фенилаланин	1,00 г
L-валин	8,40 г
L-треонин	4,50 г

L-аргинина гидрохлорид	6,00 г
L-лизина ацетат	8,60 г
L-гистидин	2,40 г
L-триптофан	0,66 г
L-метионин	1,00 г
L-цистеина гидрохлорид	<0,20 г
Глицин	9,00 г
Вспомогательные вещества: натрия метабисульфит, вода для инъекций.	

- Биодоступность Аминомагт составляет 100%
- Полный профиль жизненно важных аминокислот
- Акцент на восстановление, регенерацию и иммунитет
- Идеален для стационаров, реанимаций и интенсивной терапии
- Сочетается с другими инфузионными препаратами

АМИНОМАГТ

АМИНОМАГТ

Это современный аминокислотный раствор для инфузионной терапии, разработанный с учетом потребностей организма в стрессовых и восстановительных состояниях.

ПРОФИЛЬ АКТИВНЫХ АМИНОКИСЛОТ:

	Аминокислоты
Незаменимые (8)	Лизин, Валин, Лейцин, Изолейцин, Треонин, Метионин, Фенилаланин, Триптофан
Условно-заменимые (2)	Аргинин, Гистидин
Заменимые (5)	L-аланин, L-глицин, L-серин, L-пролин, L-цистеин

L-лизин, L-валин и L-треонин

в **2 раза** выше по концентрации для максимального эффекта.

Эти компоненты – катализаторы восстановления, иммунной поддержки и тканевой регенерации.

Как работает АМИНОМАГТ?

Хирургия	Неврология	Инфекционные состояния
- Быстрое восстановление тканей - Предотвращение белкового дефицита - Улучшение заживления и уменьшение осложнений	- Питание нейронов - Поддержка нейротрофики и синаптической передачи - Устранение хронической усталости, астении, кахексии	- Поддержка иммунной системы - Устранение аминокислотного дефицита после ОРВИ, COVID, сепсиса - Снижение воспалительного ответа
Показание к применению:	Парентеральное белковое питание при: гипопроотеинемии и потерях жидкости различного генеза.	

Дозы и способ применения:

Возраст	Суточная доза	Примечание
Взрослые	От 0,6 до 1,0 г аминокислот (до 20 мл раствора/кг массы тела в сутки)	При парентеральном питании у взрослых общее количество введенной жидкости не должно превышать 40 мл/кг массы тела в сутки
	При катаболических состояниях – 1,3 – 2 г аминокислот (до 40 мл раствора/кг массы тела в сутки)	
Дети от 2 до 6 лет	10 мл/кг массы тела – 1,0 г аминокислот/кг массы тела	
Дети от 6 до 14 лет	15 мл/кг массы тела – 1,5 г аминокислот/кг массы тела	

Противопоказания:

- Почечная/печеночная недостаточность (тяжелая)
- Нарушение аминокислотного обмена
- Индивидуальная непереносимость компонентов

Лекарственные взаимодействия

Несовместим с другими лекарственными средствами (не следует смешивать в одном растворе).

Производитель

Shijiazhuang №4 Pharmaceutical Co., Ltd.
No.288 Zhujiang Road, High-tech Industrial Development Zone, Shijiazhuang, Hebei Province, Китай.

Наименование и адрес организации, принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств на территории Республики Узбекистан:

ООО «DAANTEC»

Республика Узбекистан, г. Ташкент, Сергели район, улица Хонобод, дом 46Б. Тел.: +998950522552

