



ПЕПТАЗОЛ

Пантопразол натрия сесквигидрата - 45,1 мг
лиофилизат для приготовления
раствора для инъекций



Показания к применению

Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки (в фазе обострения), эрозивный гастрит (в том числе, связанные с приемом нестероидных противовоспалительных препаратов НПВП)

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ, симптоматическое лечение ГЭРБ)

Синдром Золлингера-Эллисона

Эрадикация *Helicobacter pylori* в комбинации с антибактериальными средствами

Лечение и профилактика стрессовых язв, а также их осложнений (кровотечение, перфорация, пенетрация)

Способ применения и дозы

	РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗА
Рефлюкс-эзофагит и язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки	1 флакон Пептазола (40 мг) 1 раз в сутки
Синдром Золлингера-Эллисона и другие патологические состояния, связанные с повышенной желудочной секрецией	Начальная доза - 80 мг пантопразола (2 флакона) 1 раз в сутки.
	Затем, дозу можно увеличить или уменьшить в зависимости от секреции соляной кислоты.
	Если доза препарата Пептазол превышает 80 мг в сутки, ее следует разделить и вводить 2 раза в день. Временное увеличение дозы выше 160 мг до приемлемого контроля кислотности.



Способ приготовления раствора

Для приготовления готового к употреблению раствора для инъекций 10 мл 0,9% раствора натрия хлорида добавляют во флакон, содержащий сухое вещество. Этот раствор может быть применен после смешивания со 100 мл 0,9% раствора натрия хлорида, а также с 5% раствором глюкозы.

После приготовления раствор необходимо использовать в течение 12 ч.

Применение в педиатрии

Опыт применения у детей ограничен. Таким образом, пантопразол не рекомендуется для применения у пациентов моложе 18 лет.

Форма выпуска

45,1 мг порошка во флаконе. 1 флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в картонной коробке.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Производитель

HANLIM PHARM. CO., LTD. 2-27, Yeongmun-ro, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea.

Наименование и адрес организации принимающей претензии (предложения) по качеству лекарственных средств: ООО «ДААНТЕС» Республика Узбекистан, Ташкент, Сергелийский район улица Ханабад 46 Б
Телефон: +998(95)052-25-52

Инновационное решение
для здоровья вашего
желудка и пищевода



ПЕПТАЗОЛ

Пантопразол натрия сесквигидрата - 45,1 мг
лиофилизат для приготовления раствора для инъекций

Высокоэффективное средство для решения проблем с желудочно-кишечным трактом в условиях стационара.

Быстрое снижение кислотности и безопасность применения делают его идеальным выбором для экстренной терапии.

Эффективное снижение кислотности уже через 30 минут после введения.

Обеспечивает надежное снижение кислотности на протяжении 24 часов.

Обладает хорошей переносимостью и минимальными побочными эффектами.

Центральным звеном в секреции HCl является H⁺/K⁺-АТФаза, выполняющая роль протонного насоса, обеспечивающего перенос H⁺ через мембрану в пространство желудка в обмен на ионы K⁺, используя для этого энергию гидролиза молекулы АТФ

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Пептазол ингибирует выделение соляной кислоты в желудке посредством блокады протонного насоса париетальных клеток.



1. Абсорбция из кишечника с проникновением в системный кровоток
2. Концентрирование в секреторных канальцах париетальных клеток
3. Связывание протона в кислой среде канальце
4. Превращение из пролекарства в лекарство (активация ИПП под действием кислоты)
5. Ковалентное связывание с SH-группами протонного насоса и его ингибирование

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пептазол действует долго — до 24 часов, обеспечивая стабильное снижение кислотности в течение дня. Это позволяет его принимать один раз в сутки.
- Метаболизируется в печени через ферменты, принадлежащие системе CYP2C19, и CYP3A4, что делает его менее подверженным взаимодействиям с другими препаратами
- Активно используется в комбинации с антибиотиками при лечении инфекции, вызванной *Helicobacter pylori*. Он используется как часть стандартных схем эрадикационной терапии.
- Чаще используется при длительном лечении заболеваний желудка, таких как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), язвенная болезнь, а также при профилактике язв у пациентов, принимающих нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Это связано с его хорошей переносимостью и стабильностью действия.
- Может быть предпочтительнее при лечении пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, поскольку его длительный эффект позволяет лучше контролировать кислотный рефлюкс в течение дня и ночи.



**Быстро и стабильно
ингибирует
секрецию кислоты
желудка!**

**Эффективное
заживление
пептических
эрозий и язв!**