Marcus Zibrowius Jan Hennig 26.11.2024

Topologie I Blatt 6

So fern nicht weiter spezifiziert arbeiten wir in der Kategorie der lokal kompakt erzeugten, schwach Hausdorff Räumen und bezeichnen diese Kategorie mit **Top**, bzw. der punktierten Version **Top**_{*}.

1 | Stegreiffragen: Faserungen und ...

Alle Fragen sollten lediglich eine kurze Antwort benötigen:

- (a) Wahr oder falsch: $\operatorname{pr}_1: \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid y=0 \text{ oder } x=y\} \to \mathbb{R}$ ist eine Faserung.
- (b) Was ist die universelle Eigenschaft des Smash-Produkts? (Kommt Ihnen diese bekannt vor?)

2 | Smash-Produkte

Seien X, Y, Z Objekte in **Top**_{*}.

- (a) Zeigen Sie, dass es folgende natürliche Isomorphien gibt:
 - (i) $(X \times Y)_+ \cong X_+ \wedge Y_+$
 - (ii) $X \wedge Y \cong Y \wedge X$
 - (iii) $* \wedge X \cong *$
 - (iv) $S^0 \wedge X \cong X$
 - (v) $X \wedge (Y \vee Z) \cong (X \wedge Y) \vee (X \wedge Z)$
 - (vi) $X \wedge (Y \wedge Z) \cong (X \wedge Y) \wedge Z$
- (b) Zeigen Sie, dass die Assoziativität (vi) für $X = Y = (\mathbb{Q}, 0)$ und $Z = (\mathbb{Z}, 0)$ nicht gilt. (Hinweis: \mathbb{Z} ist lokal kompakt, aber \mathbb{Q} nicht. Betrachten Sie die Quotientenabbildungen.)

3 | Kokomposition

Seien X, Y, Z, T Objekte in **Top*** und $f: X \to Y, g: Y \to Z$ Morphismen.

(a) Zeigen Sie:

$$\begin{split} [Z,T] &\stackrel{g^*}{\to} [Y,T] \stackrel{f^*}{\to} [X,T] \text{ ist exakte Sequenz von punktierten Mengen} \\ \Leftrightarrow & \forall t \colon Y \to T \quad \exists \overline{t} \colon Z \to T \colon \quad t \circ f \simeq \mathrm{const}_* \Rightarrow \overline{t} \circ g \simeq t \end{split}$$