

# MATEMATIKA

Srednje strokovno izobraževanje

ZAPISKI

19. julij 2026



Pred vami so zapiski za predmet Matematika v srednjem strokovnem izobraževanju. Sproti bodo nastajali od šolskega leta 2026/2027 naprej. V besedilu so mogoče prisotne še kake napake. Če kakšno opazite, mi javite.

Jan Kastelic



# Kazalo

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Naravna in cela števila</b>                                    | <b>1</b>  |
| 1.1      | Naravna števila . . . . .                                         | 1         |
| 1.2      | Operacije v množici $\mathbb{N}$ . . . . .                        | 1         |
| 1.2.1    | Seštevanje . . . . .                                              | 1         |
| 1.2.2    | Množenje . . . . .                                                | 2         |
| 1.2.3    | Odštevanje . . . . .                                              | 2         |
| 1.2.4    | Vrstni red operacij . . . . .                                     | 2         |
| 1.3      | Osnovni računski zakoni . . . . .                                 | 3         |
| 1.4      | Cela števila . . . . .                                            | 4         |
| 1.5      | Operacije v množici $\mathbb{Z}$ . . . . .                        | 4         |
| 1.5.1    | Seštevanje . . . . .                                              | 4         |
| 1.5.2    | Odštevanje . . . . .                                              | 4         |
| 1.5.3    | Množenje . . . . .                                                | 5         |
| 1.6      | Osnovni računski zakoni v $\mathbb{Z}$ . . . . .                  | 5         |
| 1.7      | Urejenost naravnih in celih števil . . . . .                      | 7         |
| 1.7.1    | Linearna urejenost . . . . .                                      | 7         |
| 1.7.2    | Lastnosti relacij $\leq$ in $<$ . . . . .                         | 8         |
| <b>2</b> | <b>Potence in izrazi</b>                                          | <b>9</b>  |
| 2.1      | Potence z naravnim eksponentom . . . . .                          | 9         |
| 2.2      | Pravila za računanje s potencami . . . . .                        | 9         |
| 2.3      | Večkratniki . . . . .                                             | 11        |
| 2.4      | Algebrski izrazi . . . . .                                        | 11        |
| 2.5      | Računanje z algebrskimi izrazi . . . . .                          | 11        |
| 2.5.1    | Seštevanje in izpostavljanje izrazov . . . . .                    | 11        |
| 2.5.2    | Množenje izrazov . . . . .                                        | 12        |
| 2.6      | Potenciranje izrazov . . . . .                                    | 13        |
| 2.7      | Razstavljanje izrazov . . . . .                                   | 14        |
| <b>3</b> | <b>Deljivost</b>                                                  | <b>17</b> |
| 3.1      | Relacija deljivosti . . . . .                                     | 17        |
| 3.2      | Kriteriji deljivosti . . . . .                                    | 19        |
| 3.3      | Osnovni izrek o deljenju . . . . .                                | 21        |
| 3.4      | Praštevila in sestavljena števila . . . . .                       | 22        |
| 3.5      | Osnovni izrek aritmetike . . . . .                                | 22        |
| 3.6      | Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik . . . . . | 23        |
| <b>4</b> | <b>Racionalna števila</b>                                         | <b>25</b> |
| 4.1      | Ulomki in racionalna števila . . . . .                            | 25        |
| 4.2      | Razširjanje in krajšanje ulomkov . . . . .                        | 27        |
| 4.3      | Seštevanje in odštevanje ulomkov . . . . .                        | 28        |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 4.4      | Množenje ulomkov . . . . .                               | 28        |
| 4.5      | Deljenje ulomkov . . . . .                               | 29        |
| 4.6      | Urejenost racionalnih števil . . . . .                   | 30        |
| 4.7      | Potence s celimi eksponenti . . . . .                    | 32        |
| 4.8      | Decimalni zapis . . . . .                                | 33        |
| 4.9      | Sklepni račun . . . . .                                  | 34        |
| 4.10     | Odstotni račun . . . . .                                 | 35        |
| <b>5</b> | <b>Realna števila</b>                                    | <b>37</b> |
| 5.1      | Realna števila . . . . .                                 | 37        |
| 5.2      | Kvadratni koren . . . . .                                | 39        |
| 5.3      | Kubični koren . . . . .                                  | 41        |
| 5.4      | Interval . . . . .                                       | 42        |
| 5.4.1    | Vrste intervalov . . . . .                               | 42        |
| 5.5      | Reševanje enačb . . . . .                                | 44        |
| 5.6      | Reševanje neenačb . . . . .                              | 46        |
| 5.7      | Reševanje sistemov enačb . . . . .                       | 47        |
| 5.7.1    | Sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama . . . . . | 47        |
| 5.7.2    | Sistem treh linearnih enačb s tremi neznankami . . . . . | 48        |
| 5.8      | Obravnava enačb in neenačb . . . . .                     | 49        |
| 5.9      | Absolutna vrednost . . . . .                             | 50        |
| 5.10     | Zaokroževanje, približki, napake . . . . .               | 51        |
| <b>6</b> | <b>Pravokotni koordinatni sistem</b>                     | <b>53</b> |
| 6.1      | Pravokotni koordinatni sistem . . . . .                  | 53        |
| 6.2      | Razdalja med točkama in razpolovišče daljice . . . . .   | 57        |
| 6.3      | Ploščina trikotnika . . . . .                            | 59        |
| <b>7</b> | <b>Funkcija</b>                                          | <b>61</b> |
| 7.1      | Preslikava in funkcija . . . . .                         | 61        |
| 7.2      | Definicijsko območje in zaloga vrednosti . . . . .       | 62        |
| 7.3      | Ničila in začetna vrednost funkcije . . . . .            | 63        |
| 7.4      | Graf funkcije . . . . .                                  | 64        |
| 7.5      | Naraščanje in padanje . . . . .                          | 64        |
| 7.6      | Injektivnost in surjektivnost . . . . .                  | 64        |
| 7.7      | Predpis linearne funkcije . . . . .                      | 66        |
| 7.8      | Graf linearne funkcije . . . . .                         | 68        |
| <b>8</b> | <b>Premica</b>                                           | <b>71</b> |
| 8.1      | Enačba premice . . . . .                                 | 71        |
| 8.2      | Presečišče premic . . . . .                              | 74        |
| <b>9</b> | <b>Statistika</b>                                        | <b>75</b> |
| 9.1      | Osnovni pojmi statistike . . . . .                       | 75        |
| 9.2      | Urejanje in grupiranje podatkov . . . . .                | 77        |
| 9.3      | Mere osredinjenosti . . . . .                            | 79        |
| 9.4      | Mere razpršenosti . . . . .                              | 81        |
| 9.5      | Grafično prikazovanje podatkov . . . . .                 | 83        |

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>10 Geometrija v ravnini</b>                                      | <b>87</b>  |
| 10.1 Osnovni geometrijski pojmi . . . . .                           | 87         |
| 10.2 Skladnost in merjenje . . . . .                                | 91         |
| 10.3 Vzporednost in pravokotnost . . . . .                          | 94         |
| 10.4 Trikotnik . . . . .                                            | 99         |
| 10.5 Krožnica, krog, lok . . . . .                                  | 104        |
| 10.6 Štirikotnik in pravilni $n$ -kotnik . . . . .                  | 107        |
| 10.7 Podobnost . . . . .                                            | 111        |
| <b>11 Kotne funkcije</b>                                            | <b>115</b> |
| 11.1 Definicija kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku . . . . .   | 115        |
| 11.2 Računanje vrednosti kotnih funkcij . . . . .                   | 116        |
| 11.3 Zveze med kotnimi funkcijami . . . . .                         | 118        |
| 11.4 Razširitev pojma kotne funkcije do polnega kota . . . . .      | 119        |
| <b>12 Potence in koreni</b>                                         | <b>123</b> |
| 12.1 Koreni poljubnih stopenj . . . . .                             | 123        |
| 12.2 Potence z racionalnimi eksponenti . . . . .                    | 125        |
| 12.3 Iracionalne enačbe . . . . .                                   | 126        |
| <b>13 Funkcija</b>                                                  | <b>127</b> |
| 13.1 Funkcija in njene lastnosti . . . . .                          | 127        |
| 13.1.1 Definijsko območje in zaloga vrednosti funkcije . . . . .    | 128        |
| 13.1.2 Ničla in začetna vrednost funkcije . . . . .                 | 128        |
| 13.1.3 Graf funkcije . . . . .                                      | 128        |
| 13.1.4 Naraščanje in padanje funkcije . . . . .                     | 128        |
| 13.1.5 Injektivnost in surjektivnost . . . . .                      | 129        |
| 13.1.6 Omejenost funkcije . . . . .                                 | 129        |
| 13.1.7 Predznak funkcije . . . . .                                  | 130        |
| 13.1.8 Sodost in lihost funkcije . . . . .                          | 130        |
| 13.1.9 Konveksnost in konkavnost funkcije . . . . .                 | 130        |
| 13.2 Transformacije funkcij . . . . .                               | 134        |
| 13.2.1 Zrcaljenja . . . . .                                         | 134        |
| 13.2.2 Premiki . . . . .                                            | 135        |
| 13.2.3 Raztegi . . . . .                                            | 136        |
| 13.3 Inverzna funkcija . . . . .                                    | 143        |
| <b>14 Potenčna funkcija</b>                                         | <b>145</b> |
| 14.1 Potenčna funkcija z naravnim eksponentom . . . . .             | 146        |
| 14.2 Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom . . . . .     | 149        |
| <b>15 Korenska funkcija</b>                                         | <b>153</b> |
| 15.1 Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom . . . . .      | 153        |
| 15.2 Korenska funkcija s sodim korenskim eksponentom . . . . .      | 153        |
| <b>16 Kvadratna funkcija</b>                                        | <b>155</b> |
| 16.1 Kvadratna funkcija v splošni in temenski obliki . . . . .      | 155        |
| 16.2 Ničle kvadratne funkcije in rešitve kvadratne enačbe . . . . . | 158        |
| 16.3 Kvadratna neenačba . . . . .                                   | 160        |
| 16.4 Presečišče dveh krivulj . . . . .                              | 162        |
| 16.5 Uporaba kvadratne funkcije . . . . .                           | 164        |

---

|                                                  |            |
|--------------------------------------------------|------------|
| <b>17 Eksponentna funkcija</b>                   | <b>167</b> |
| 17.1 Eksponentna funkcija in njen graf . . . . . | 167        |
| 17.2 Eksponentna enačba . . . . .                | 170        |
| 17.3 Eksponentna neenačba . . . . .              | 172        |
| 17.4 Uporaba eksponentne funkcije . . . . .      | 174        |
| <b>18 Logaritemska funkcija</b>                  | <b>175</b> |







# Poglavje 1

## Naravna in cela števila

### 1.1 Naravna števila


**Naravna števila** so števila s katerimi štejemo.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

Množico naravnih števil definirajo **Peanovi aksiomi**:

1. Vsako naravno število  $n$  ima svojega **naslednika**  $n + 1$ .
2. Število 1 je naravno število, ki ni naslednik nobenega naravnega števila.
3. Različni naravni števili imata različna naslednika:  $n + 1 \neq m + 1; n \neq m$ .
4. Če neka trditev velja z vsakim naravnim številom tudi za njegovega naslednika, velja za vsa naravna števila. (*aksiom/princip popolne indukcije*)

Naravna števila uredimo po velikosti in predstavimo s **točko** na **številski premici**.



Vsako število zapišemo s **številko**. Za zapis številke uporabljamo **števke**. Te so 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Posamezne števke večmestnega števila od desne proti levi predstavljajo: **enice**, **desetice**, **stotice**, **tisočice**, ...

Število, ki je zapisano s črkovnimi oznakami števk označimo s črto nad zapsiom črkovne oznake.


$$\overline{xy} = 10x + y \quad \overline{xyz} = 100x + 10y + z$$

### 1.2 Operacije v množici $\mathbb{N}$

#### 1.2.1 Seštevanje

Poljubnima naravnima številoma  $x$  in  $y$  priredimo **vsoto**  $x + y$ .

Število  $x$  oziroma  $y$  imenujemo **seštevanec** ali **sumand** ali **člen**. Število  $x + y$  pa imenujemo **vsota** ali **summa**.




Vsota naravnih števil je naravno število:  $x, y \in \mathbb{N} \Rightarrow x + y \in \mathbb{N}$ .

### 1.2.2 Množenje

Poljubnima naravnima številoma  $x$  in  $y$  priredimo **produkt**  $x \cdot y$ .

Število  $x$  oziroma  $y$  imenujemo **množenec** ali **faktor**. Število  $x \cdot y$  pa imenujemo **zmnožek** ali **produkt**.



Produkt naravnih števil je naravno število:  $x, y \in \mathbb{N} \Rightarrow x \cdot y \in \mathbb{N}$ .


Število **1** je **nevtralni element** za množenje:  $1 \cdot x = x$ .

Seštevanje in množenje sta *dvočleni notranji operaciji* v množici naravnih števil  $\mathbb{N}$ .

### 1.2.3 Odštevanje

Številoma  $x$  in  $y$ , pri čemer je  $y$  večje od  $x$  ( $x > y$ ), priredimo **razliko**  $x - y$ .

Število  $x$  imenujemo **zmanjševanec** ali **minuend**, število  $y$  pa imenujemo **odštevane** ali **subtrahend**. Številu  $x - y$  rečemo **razlika** ali **diferenca**.



Razlika je število, ki ga moramo prišteti številu  $y$ , da dobimo število  $x$ .

$$(x - y) + y = x$$

Odštevanje ni notranja operacija v množici naravnih števil  $\mathbb{N}$ .

### 1.2.4 Vrstni red operacij

Prednost pri računanju imajo **oklepaji** (najprej najbolj notranji), nato sledi **množenje**, na koncu pa imamo še **seštevanje** in **odštevanje**.

Kadar v izrazu nastopajo enakovredne računske operacije, računamo od leve proti desni.

Pri množenju količin, ki so označene s črkovnimi oznakami, piko, ki označuje operacijo množenja ponavadi opustimo.

$$x \cdot y = xy$$

## 1.3 Osnovni računski zakoni

### Komutativnost seštevanja – zakon o zamenjavi členov

$$\mathbf{x + y = y + x}$$

Vsota ni odvisna od vrstnega reda seštevanja.

### Asociativnost seštevanja – zakon o poljubnem združevanju členov

$$(\mathbf{x + y}) + \mathbf{z = x + (y + z)}$$

Vsota več kot dveh sumandov ni odvisna od združevanja po dveh sumandov.

### Komutativnost množenja – zakon o zamenjavi faktorjev

$$\mathbf{x \cdot y = y \cdot x}$$

Produkt ni odvisna od vrstnega reda faktorjev.

### Asociativnost množenja – zakon o poljubnem združevanju faktorjev

$$(\mathbf{x \cdot y}) \cdot \mathbf{z = x \cdot (y \cdot z)}$$

Produkt več kot dveh sumandov ni odvisen od združevanja faktorjev.

### Distributivnost – zakon o razčlenjevanju

$$\mathbf{x \cdot z + y \cdot z = (x + y) \cdot z}$$

Če to beremo iz desne proti levi, rečemo tudi *pravilo izpostavljanja skupnega faktorja*.

#### Naloga 1.1. Izračunajte.

- $(1 + 2 \cdot 7) + 3 \cdot (2 \cdot 2 + 7)$
- $3 \cdot (2 + 3 \cdot 5) \cdot (2 + 1)$
- $7 + (2 + 6 \cdot 3) + (8 + 4 \cdot 5)$
- $11 \cdot 4 + (12 - 6) \cdot 5$
- $8 + 2 \cdot (3 + 7) - 15$
- $37 - 5 \cdot (10 - 3)$

#### Naloga 1.2. Hitro izračunajte.

- $45 + 37 + 15$
- $108 + 46 - 28$
- $5 \cdot 13 \cdot 8$
- $4 \cdot 7 \cdot 25$
- $(7 + 3) \cdot 2 \cdot 5$
- $15 \cdot (4 + 6) \cdot 2$
- $3 \cdot 5 + 7 \cdot 5$
- $8 \cdot 12 + 6 \cdot 8$

#### Naloga 1.3. Zapišite račun glede na besedilo in izračunajte.

- Produktu števil 12 in 27 odštejte razliko števil 19 in 11.
- Vsoti produkta 4 in 12 ter produkta 5 in 16 odštejte 8.
- Vsoto števil 42 in 23 pomnožite z razliko števil 58 in 29.
- Produkt števil 14 in 17 pomnožite z vsoto števil 5 in 16.

#### Naloga 1.4. Rešite besedilno nalogo.

- V trgovini kupimo tri litre mleka in štiri čokoladne pudinge v prahu. Če stane liter mleka 95 centov, čokoladni puding v prahu pa 24 centov, koliko moramo plačati?
- Manca bo kuhala rižoto za štiri otroke in šest odraslih. Za otroško porcijo rižote zadošča 45 g riža, za odraslo pa 75 g. Koliko riža mora dati kuhati za rižoto?

## 1.4 Cela Števila

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Množica celih števil  $\mathbb{Z}$  je definirana kot unija treh množic:

- množica **pozitivnih celih števil** ( $\mathbb{Z}^+$ ) – naravna števila  $\mathbb{N}$ ;
- **število 0**;
- množica **negativnih celih števil** ( $\mathbb{Z}^-$ ) – nasprotna števila vseh naravnih števil.

$$\mathbb{Z} = \mathbb{Z}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Z}^+$$

**Nasprotna vrednost** števila  $n$  je število  $-n$ .

## 1.5 Operacije v množici $\mathbb{Z}$

### 1.5.1 Seštevanje

$$\mathbf{x} + \mathbf{0} = \mathbf{x}; \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

Število 0 je **nevtralni element** pri seštevanju.

$$\mathbf{x} + (-\mathbf{x}) = \mathbf{0}; \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

Vsota celega števila in njemu nasprotnega števila je enaka 0.

$$-(-\mathbf{x}) = \mathbf{x}; \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

Nasprotna vrednost nasprotne vrednosti je enaka prvotni vrednosti.

Vsota dveh pozitivnih števil je pozitivno število, vsota dveh negativnih števil pa je negativno število.

$$-\mathbf{x} + (-\mathbf{y}) = -(\mathbf{x} + \mathbf{y})$$

Vsota nasprotnih vrednosti je enaka nasprotni vrednosti vsote.

Naj bosta  $x$  in  $y$  naravni števili. Vsota pozitivnega števila  $x$  in negativnega števila  $-y$  je:

- pozitivno število, če je  $x > y$  in
- negativno število, če je  $x < y$ .

### 1.5.2 Odštevanje

Razlika  $x - y$  dveh pozitivnih števil  $x$  in  $y$  je:

- pozitivno število, če je  $x > y$  in
- negativno število, če je  $x < y$ .

Razlika dveh negativnih števil  $(-x) - (-y)$  je:

- pozitivno število, če je  $x < y$  in
- negativno število, če je  $x > y$ .

Razlika pozitivnega števila  $x$  in negativnega števila  $-y$  je pozitivno število.

*Odštevanje v množici  $\mathbb{Z}$  je prištevanje nasprotne vrednosti.*

$$\mathbf{x} - \mathbf{y} = \mathbf{x} + (-\mathbf{y})$$

### 1.5.3 Množenje

$$1 \cdot x = x; \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

Število 1 je **nevtralni element** za množenje.

$$(-1) \cdot x = -x; \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

Pri množenju celega števila  $x$  z  $-1$  dobimo nasprotno število  $-x$ .

$$0 \cdot x = 0; \quad \forall x \in \mathbb{Z}$$

Rezultat množenja števila s številom 0 je enak 0.

$$(-x)(-y) = xy$$

Produkt sodo mnogo negativnih števil je pozitivno število.

$$-x \cdot y = -(xy)$$

$$x(-y) = -(xy)$$

Produkt pozitivnega in negativnega števila je negativno število.

$$(-x)(-y) = xy$$

Produkt liho mnogo negativnih faktorjev je negativno število.

Seštevanje, odštevanje in množenje so v množici  $\mathbb{Z}$  dvočlene notranje operacije.

## 1.6 Osnovni računski zakoni v $\mathbb{Z}$

### Komutativnost seštevanja

$$x + y = y + x$$

Vsota ni odvisna od vrstnega reda seštevanja.

### Asociativnost seštevanja

$$(x + y) + z = x + (y + z)$$

Vsota več kot dveh sumandov ni odvisna od združevanja po dveh sumandov.

### Komutativnost množenja

$$x \cdot y = y \cdot x$$

Produkt ni odvisna od vrstnega reda faktorjev.

### Asociativnost množenja

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$$

Produkt več kot dveh sumandov ni odvisen od združevanja faktorjev.

**Distributivnost seštevanja in množenja ter odštevanja in množenja**

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{z} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{z} = (\mathbf{x} + \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z}$$

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{z} - \mathbf{y} \cdot \mathbf{z} = (\mathbf{x} - \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z}$$

Če to beremo iz desne proti levi, rečemo tudi *pravilo izpostavljanja skupnega faktorja*.

**Naloga 1.5.** *Izračunajte.*

- $17 - 13 - 2 + 10$
- $50 + 11 - 32 - 14$
- $3 + ((5 + 2(7 - 9)) \cdot 2 - 1)$
- $(2 - 5(6 - 10)) \cdot (5 - 2(7 - 5))$
- $9(11 - 3) + 7(10 - 15)$
- $8 + 9(11 - 18) - 2 \cdot 5$

**Naloga 1.6.** *Spretno izračunajte.*

- $7 \cdot 8 - 12 \cdot 8$
- $5 \cdot 18 + 9 \cdot 5 - 5 \cdot 2$
- $8 \cdot (4 - 9) \cdot 2$
- $5 \cdot 3 \cdot (12 - 8)$
- $(15 - 6)(12 - 3 \cdot 4)$

**Naloga 1.7.** *Rešite besedilne naloge.*

- V hotelu imajo na voljo osemnajst enoposteljnih, štiriintrideset dvoposteljnih in petindevetdeset triposteljnih sob. Koliko ljudi lahko še prespi v hotelu, če je v njem že sto triinštirideset gostov?
- Pohod na bližnji hrib traja tri ure. Koliko minut moramo še hoditi, če smo na poti že 145 minut?
- S Ptuja in iz Postojne (razdalja med njima je približno 190 km) sočasno odpeljeta dva motorista drug proti drugemu. En vozi povprečno 40 km/h, drugi pa 5 km/h manj. Kolikšna bo razdalja med njima po dveh urah vožnje?

**Naloga 1.8.** *Zapišite enačbe in jih poenostavite.*

- Razlika petkratnika  $a$  in  $b$  je enaka trikratniku vsote štirikratnika  $a$  in petkratnika  $b$ .
- Vsota  $x$  in dvakratnika  $y$  je enaka razliki petkratnika  $x$  in dvanajstkratnika  $y$ .



## 1.7 Urejenost naravnih in celih števil

Številsko množico je **urejena**, kadar lahko po velikosti primerjamo njena poljubna elementa. Pri urejanju števil uporabljamo naslednje znake:

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| $<$    | manjše / manj                   |
| $>$    | večje / več                     |
| $\leq$ | manjše ali enako / največ       |
| $\geq$ | večje ali enako / vsaj, najmanj |
| $=$    | enako                           |

Za poljubni števili  $x, y \in \mathbb{Z}$  velja natanko ena izmed naslednjih možnosti:  $x > y$ ,  $x < y$  ali  $x = y$ .

Slika števila  $x$  leži na številski premici desno od slike števila  $y$ :

$$x > y \Leftrightarrow x - y > 0$$

Slika števila  $x$  leži na številski premici levo od slike števila  $y$ :

$$x < y \Leftrightarrow x - y < 0$$

Slika števila  $x$  sovpada s sliko števila  $y$ :

$$x = y \Leftrightarrow x - y = 0$$

Velja pa tudi:

$$x \leq y \Leftrightarrow x - y \leq 0$$

$$x \geq y \Leftrightarrow x - y \geq 0$$

### Pozitivna in negativna števila

V množici  $\mathbb{Z}$  so pozitivna tista števila, ki so večja od števila 0 in njihove slike ležijo desno od izhodišča, negativna pa tista števila, ki so manjša od števila 0 in njihove slike ležijo levo od izhodišča.

Vsako pozitivno celo število (vsako naravno število) je večje od katerega koli negativnega celega števila.

#### 1.7.1 Linearna urejenost

Z relacijo *biti manjši ali enak* je množica  $\mathbb{Z}$  **linearno urejena**, to pomeni, da veljajo naslednje lastnosti: refleksivnost, antisimetričnost, tranzitivnost, stroga sovisnost.

##### Refleksivnost

$$\forall x \in \mathbb{Z} : x \leq x$$

##### Antisimetričnost

$$\forall x, y \in \mathbb{Z} : x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$$

**Tranzitivnost**

$$\forall x, y, z \in \mathbb{Z} : x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$$

**Stroga sovisnost**

$$\forall x, y \in \mathbb{Z} : x \leq y \vee y \leq x$$

**1.7.2 Lastnosti relacij  $\leq$  in  $<$** **Monotonost vsote**

$$x < y \Rightarrow x + z < y + z \quad x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$$

Če na obeh straneh neenakosti prištejemo isto število, se neenakost ohrani.

$$x < y \wedge z > 0 \Rightarrow x \cdot z < y \cdot z \quad x \leq y \wedge z > 0 \Rightarrow x \cdot z \leq y \cdot z$$

Pri množenju neenakosti z negativnim številom se znak neenakosti ohrani.

$$x < y \wedge z < 0 \Rightarrow x \cdot z > y \cdot z \quad x \leq y \wedge z < 0 \Rightarrow x \cdot z \geq y \cdot z$$

Pri množenju neenakosti z negativnim številom se znak neenakosti obrne.

Obravnavane lastnosti veljajo tudi za relaciji  $\geq$  in  $>$ .

**Naloga 1.9.** Uredite števila 3, -2, 5, -1, 0, -7, 6, -6 po velikosti in jih predstavite na številski premici.

**Naloga 1.10.** Uredite števila 104, -27, 35, -107, 36, -26, 25, -28, 81 po velikosti.

**Naloga 1.11.** Gladina Mrtvega morja leži v depresiji na -423 m nadmorske višine, njegova največja globina pa je 378 m. Kolikšna je najmanjša nadmorska višina dna Mrtvega morja?

**Naloga 1.12.** Za katera cela števila  $x$  ima izraz  $3x - 5(x + 2)$  večjo ali enako vrednost od izraza  $4 - (12 + x)$ ?

## Poglavje 2

# Potence in izrazi

### 2.1 Potence z naravnim eksponentom

Potenca  $x^n$  z **osnovo/bazo**  $x$  in **eksponentom/stopnjo**  $n \in \mathbb{N}$ , je produkt  $n$  faktorjev enakih  $x$ .

$$x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_{n \text{ faktorjev}}$$

### 2.2 Pravila za računanje s potencami

Dve potenci z isto osnovo zmnožimo tako, da osnovo ohranimo, eksponenta pa seštejemo.

$$x^n \cdot x^m = \underbrace{(x \cdot x \cdot \dots \cdot x)}_{n \text{ faktorjev}} \cdot \underbrace{(x \cdot x \cdot \dots \cdot x)}_{m \text{ faktorjev}} = x^{n+m}$$

Potenco potenciramo tako, da osnovo ohranimo, eksponenta pa zmnožimo.

$$(x^n)^m = \underbrace{\underbrace{(x \cdot x \cdot \dots \cdot x)}_{n \text{ faktorjev}} \cdot \underbrace{(x \cdot x \cdot \dots \cdot x)}_{n \text{ faktorjev}} \cdot \dots \cdot \underbrace{(x \cdot x \cdot \dots \cdot x)}_{n \text{ faktorjev}}}_{m \text{ faktorjev}} = x^{n \cdot m}$$

Produkt dveh ali več števil potenciramo tako, da potenciramo posamezne faktorje in jih potem zmnožimo.

$$(xy)^n = \underbrace{(xy \cdot xy \cdot \dots \cdot xy)}_{n \text{ faktorjev}} = \underbrace{(x \cdot x \cdot \dots \cdot x)}_{n \text{ faktorjev}} \cdot \underbrace{(y \cdot y \cdot \dots \cdot y)}_{n \text{ faktorjev}} = x^n y^n$$

Za naravne eksponente velja še:

$$\begin{aligned} (-x)^{2n} &= x^{2n} \\ (-x)^{2n+1} &= -x^{2n+1} \end{aligned}$$

$$(-1)^n = \begin{cases} 1; & n = 2k \\ -1; & n = 2k - 1 \end{cases}; k \in \mathbb{N}$$

**Naloga 2.1.** Števila  $-3^2$ ,  $(-4)^2$ ,  $-2^4$ ,  $(-1)^{2024}$ ,  $(-2)^3$  in  $(-3)^2$  uredite po velikosti od najmanjšega do največjega.

**Naloga 2.2.** Poiščite podatke in jih zapišite na dva načina: s potenco in številom brez potence.

- Razdalja med Zemljo in Soncem
- Zemljina masa
- Masa Sonca
- Število zvezd v naši Galaksiji

**Naloga 2.3.** Izračunajte.

- $(-3)^2 + 2^4$
- $(5 - 3)^3 + (-3)^2$
- $(2^2 + 1)^2 + (-3)^3 + (-2)^4$
- $(-1)^{2024} + ((-2)^5 + 5^2 - (7 - 3^2)^3)^2$
- $-1^{2n-1} + (-1)^{2n-1}$

**Naloga 2.4.** Poenostavite izraz.

- $2^7 \cdot 2^3$
- $a^3 \cdot a^{12} \cdot a^5$
- $(2z)^3$
- $(m^2 \cdot m^4)^3$
- $a^3 + 2a^3 - 6a^3$
- $x^2 \cdot x^4 + (-2x^3)^2 - 2(-x)^6$

**Naloga 2.5.** Izračunajte, rezultat zapišite s potenco.

- $2 \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^2 \cdot 5 \cdot 10^6$
- $(10^3)^2 \cdot 5 \cdot 10^4 \cdot 2 \cdot 10^3$
- $(-2)^3 \cdot 2^7$
- $-2^3 \cdot (-2)^4 \cdot 2^3$
- $2^3 \cdot (-3)^2 \cdot 6^4 \cdot 3$
- $(-3)^3 \cdot (-7)^2 \cdot 21^7 \cdot 7$

**Naloga 2.6.** Poenostavite.

- $2^3 \cdot 3^4 \cdot (2^4 \cdot 3^2)^5$
- $(5^2 \cdot 7)^3 \cdot 5^2 \cdot 7^3$
- $(-2^3 \cdot 3^5)^4 \cdot 2^6 \cdot 3^5$
- $(-4)^2 \cdot (-7)^{13} \cdot (-28)^5 \cdot (-7^2)^3$
- $-6^2 \cdot (-3)^2 \cdot 8^5 \cdot (-3^2)^3$

**Naloga 2.7.** Poenostavite.

- $a^3 \cdot b^2 \cdot a^7 \cdot b^3 \cdot b^5$
- $4x^4 \cdot (2x^3)^2$
- $(k^3 \cdot 2h^5)^2$
- $(x^2y^4)^2 \cdot (x^3y)^3$
- $(a^2b^5)^3(ab^3)^2$
- $x^2y^3(x^3y^6)^2$

**Naloga 2.8.** Poenostavite.

- $2^3 \cdot x^2 \cdot 3^2 \cdot (-x)^6$
- $(-a^3b)^4(-a^2b^5a^3)^3$
- $(2s^2 \cdot (-s^2)^5)^5$
- $(-2(z^4)^2(-2z)^3z^5)^3$
- $(-3ab^2)^3(-a^4b^2(a^3)^5)^2(ab^3)^2$
- $(xy^2z)^3(x^3(-y^2)^5(-z))^3(x^2y^3(-z^2)^3)$

**Naloga 2.9.** Odpravite oklepaje in poenostavite, če je mogoče.

- $a^n \cdot a^{n+2} \cdot (-a)^3$
- $(-x^n)^4 \cdot x^2$
- $a^n \cdot (a^2 - a^3 + 2)$
- $(x^2 + 3x^n - 5) \cdot x^{n+1}$

**Naloga 2.10.** Poenostavite.

- $(2s(g^2)^2)^2 - 3(s^4g)g^7$
- $(-4x^2xy^3)^2 + (xy)^5(-2^3xy)$
- $a^2(a^3 - b^2) - a^5 + (-a)^2b^2$
- $(p^2(q^3)^2)^2 - 2p^4q^{12} + 7(-p^3p)(q^4)^3 - (-2)^3(pq^3)^4$

**Naloga 2.11.** Poenostavite.

- $5a^{n+1} + 4a^{n+1} - 6a^{n+1}$
- $3x^{n+2} + 5x^n \cdot x^2 + 2x \cdot x^{n+1}$
- $3^{5x} \cdot 9^x - 3^{7x} + 27^x \cdot 9^{2x}$
- $4^{2y} + 3 \cdot (2^y)^4 - 5 \cdot 8^y \cdot 2^y$
- $5^p \cdot 125^p \cdot 25^p + 2(5^p)^6 - 4 \cdot 25^{3p}$

## 2.3 Večkratniki

**Večkratnik** ali tudi  **$k$ -kratnik** števila  $x$  je vsota  $k$  enakih sumandov  $x$ :

$$k \cdot x = \underbrace{x + x + \dots + x}_{k \text{ sumandov}}$$

Vse večkratnike števila  $x$  dobimo tako, da število  $x$  zapored pomnožimo z vsemi celimi števili:

$$\{\dots, -5x, -4x, -3x, -2x, -x, 0, x, 2x, 3x, 4x, 5x, \dots\} = \{kx; k, x \in \mathbb{Z}\} = x\mathbb{Z}.$$

Število  **$k$**  je **koeficient** števila oziroma spremenljivke  $x$ .

## 2.4 Algebrski izrazi

**Algebrski izraz** ali **izraz** je smiseln zapis sestavljen iz:

- števil,
- spremenljivk/parametrov, ki predstavljajo števila in jih označujemo s črkami,
- oznak računskih operacij in funkcij, ki jih povezujejo,
- oklepajev, ki določajo vrstni red računanja.

Če v izraz namesto spremenljivk vstavimo konkretna števila in izračunamo rezultat, dobimo **vrednost izraza** (pri dani izbiri spremenljivk).

Dva matematična izraza sta **enakovredna**, če imata pri katerikoli izbiri spremenljivk vedno enako vrednost.

## 2.5 Računanje z algebrskimi izrazi

Pri poenostavljanju izrazov veljajo vsi računski zakoni, ki veljajo za računanje s števili.

**Komutativnost seštevanja**

$$\mathbf{x} + \mathbf{y} = \mathbf{y} + \mathbf{x}$$

**Komutativnost množenja**

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \mathbf{y} \cdot \mathbf{x}$$

**Asociativnost seštevanja**

$$(\mathbf{x} + \mathbf{y}) + \mathbf{z} = \mathbf{x} + (\mathbf{y} + \mathbf{z})$$

**Asociativnost množenja**

$$(\mathbf{x} \cdot \mathbf{y}) \cdot \mathbf{z} = \mathbf{x} \cdot (\mathbf{y} \cdot \mathbf{z})$$

**Distributivnost seštevanja in množenja**

$$(x + y) \cdot z = \mathbf{x} \cdot \mathbf{z} + \mathbf{y} \cdot \mathbf{z}$$

Če v distributivnostnem zakonu zamenjamo levo in desno stran, dobimo pravilo o **izpostavljanju skupnega faktorja**:  $xz + yz = (x + y)z$ .

### 2.5.1 Seštevanje in izpostavljanje izrazov

Med seboj lahko seštevamo samo člene, ki se razlikujejo kvečjemu v koeficientu. To naredimo tako, da seštejemo koeficienta.

$$mx^2 + ny + kx^2 + ly = mx^2 + kx^2 + ny + ly = (m + k)x^2 + (n + l)y$$

### 2.5.2 Množenje izrazov

Dva izraza zmnožimo tako, da vsak člen prvega izraza zmnožimo z vsakim členom drugega izraza. Potem pa seštejemo podobne člene.

$$(x + y)(z + w) = xz + xw + yz + yw$$

**Naloga 2.12.** *Poenostavite.*

- $3a + 2b - a + 7b$
- $2a^2b - ab^2 + 3a^2b$
- $5a^4 - (2a)^4 + (-3a^2)^2 - 3(a^2)^2$
- $3(a - 2(a + b)) - 2(b - a(-2)^2)$

**Naloga 2.13.** *Zapišite izraz.*

- *Kvadrat razlike števil  $x$  in  $y$ .*
- *Razlika kvadratov števil  $x$  in  $y$ .*
- *Razlika petkratnika  $m$  in kvadrata števila 3.*
- *Kub razlike sedemkratnika števila  $x$  in trikratnika števila  $y$ .*

**Naloga 2.14.** *Izpostavite skupni faktor.*

- $3x + 12y^2$
- $m^3 + 8mp$
- $22a^3 - 33ab$
- $kr^2 - rk^2$
- $4u^2v^3 - 6uv^2$
- $12a^2b - 8(ab)^2 - (2ab)^4$

**Naloga 2.15.** *Izpostavite skupni faktor.*

- $3x(x + 1) + 5(x + 1)$
- $(a - 1)(a + 1) + (a - 1)$
- $4(m - 1) - (1 - m)(a + b)$
- $3(c - 2) + 5c(2 - x)$
- $(-y + x)3a - (y - x)b$

**Naloga 2.16.** *Izpostavite skupni faktor.*

- $5^{11} - 5^{10} + 5^9$
- $2 \cdot 3^8 + 5 \cdot 3^6$
- $4 \cdot 5^{10} - 10 \cdot 5^8 - 8 \cdot 5^9$
- $7^5 - 7^6 + 7 \cdot 7^4$

**Naloga 2.17.** *Izpostavite skupni faktor in izračunajte.*

- $2^{2n} + 4^n + (2^n)^2$
- $5^{2n+1} - 25^n + 3 \cdot 5^{2n-1}$
- $5 \cdot 2^{3n} - 3 \cdot 8^{n-1}$
- $49^n - 2 \cdot 7^{2n-1}$

**Naloga 2.23.** *Poenostavite.*

- $(2x - y)(3 + y) + (y - 4)(y + 4) - 2xy + 3(y - 2x + 5)$
- $(x - y)(x + y) - (x^2 + xy + y^2)(x - y) - (1 - x)x^2 + (-y)y^2$
- $2ab + (a - 3b^2)(a + 3b^2) + 2^3(-b^2)^2 - (a - b)(b - a) - 2a^3$

**Naloga 2.18.** *Izpostavite skupni faktor.*

- $3^n - 2 \cdot 3^{n+1} + 3^{n+2}$
- $2^{k+2} - 2^k$
- $5 \cdot 3^m + 2 \cdot 3^{m+1}$
- $2^{n-3} + 3 \cdot 2^{n-2} - 2^{n-1}$
- $3 \cdot 5^{n+1} - 5^{n+2} + 4 \cdot 5^{n+3}$
- $7^n + 2 \cdot 7^{n-1} - 3 \cdot 7^{n+1}$

**Naloga 2.19.** *Izpostavite skupni faktor.*

- $4a^n + 6a^{n+1}$
- $b^n + b^{n+1} - 2b^{n-1}$
- $a^{n-3} + 5a^n$
- $3x^{n+1} - 15x^n + 18x^{n-1}$

**Naloga 2.20.** *Zmnožite.*

- $(x - 3)(x + 2)$
- $(2m + 3)(5m - 1)$
- $(1 - a)(1 + a)$
- $(x - 3y)(2x + y)$
- $(m - 2k)(3m - k)$

**Naloga 2.21.** *Zmnožite.*

- $(a + b - 1)(a - b)$
- $(2x + y)(3x - 4y + 5)$
- $(m + 2n - k)(m + 2n + k)$

**Naloga 2.22.** *Zmnožite.*

- $(x^2 - 3)(x^3 + 2)$
- $(3x^2 - y)(5y^4 - 7x^3)$
- $(u^3 - 1)(u^3 + 1)$
- $(a^5b^2 - 4b)(3a^7 + 2a^2b)$
- $(a - b)(a^2 + ab + b^2)$
- $(z + w)(z^2 - zw + w^2)$

## 2.6 Potenciranje izrazov

### Kvadrat vsote in razlike binoma

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

$$(x - y)^2 = x^2 - 2xy + y^2$$

### Kub vsote in razlike binoma

$$(x + y)^3 = x^3 + 3x^2y + 3xy^2 + y^3$$

$$(x - y)^3 = x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3$$

### Kvadrat trinoma

$$(x + y + z)^2 = x^2 + y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$$

**Naloga 2.24.** *Kvadrirajte.*

- $(x + 3)^2$
- $(y + 2x)^2$
- $(2a + 3b)^2$
- $(x - 3y)^2$
- $(1 - a^2)^2$
- $(2x^2y^3 - z^5)^2$

**Naloga 2.25.** *Kvadrirajte.*

- $(-a - b)^2$
- $(-2x^5 + y)^2$
- $(a^{n+1} + b^n)^2$
- $(a + b - 3)^2$
- $(z + 2x^3 - 1)^2$
- $(2x^5 - 3m^6 + 2m^n)^2$

**Naloga 2.26.** *Kubirajte.*

- $(x + 1)^3$
- $(a - 2)^3$
- $(2m + 3)^3$
- $(-a + 2b)^3$
- $(-z - 2g)^3$
- $(a^4 - 2b^2)^3$

**Naloga 2.27.** *Dopolnite do popolnega kvadrata in ga zapišite.*

- $x^2 + 8x + \_ = (x + \_)^2$
- $x^2 + 12x + \_ = (x + \_)^2$
- $a^2 - 10a + \_ = (a - \_)^2$
- $m^2 - 2m + \_ = (m - \_)^2$

**Naloga 2.28.** *Poenostavite.*

- $(2a + 5)^2 - (a - 3)(a + 5) - a(a + 7) - 2a^2 - a$
- $(x - 2y)(x + 2y) + 4(y^2 - 3) - (x - 4)^2 + 7(x + 4)$
- $(2m + 1)(2m - 1) - (3m^2 - 4m) - 2^4 - (m - 2)^3 + (2m - 3)^2 + m^2m$

## 2.7 Razstavljanje izrazov

Razstavljanje/razcepljanje/faktorizacija izraza je zapis izraza kot dveh ali več faktorjev.

Izpostavljanje skupnega faktorja

$$xy + xz = x(y + z)$$

$$xy - xz = x(y - z)$$

Pri razstavljanju smo vedno pozorni na to, da razstavimo vse, kar je mogoče.

Razlika kvadratov

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$$

Razlika kubov

$$x^3 - y^3 = (x - y)(x^2 + xy + y^2)$$

Razlika četrth potenc

$$x^4 - y^4 = (x - y)(x + y)(x^2 + y^2)$$

Razlika  $n$ -tih potenc

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1})$$

Vsota kvadratov

Vsote kvadratov  $x^2 + y^2$  ne moremo razstaviti v množici  $\mathbb{Z}$  (oziroma  $\mathbb{R}$ ).

Vsota kubov

$$x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2)$$

Vsota četrth potenc

Vsote četrth potenc  $x^4 + y^4$  ne moremo razstaviti v množici  $\mathbb{Z}$  (oziroma  $\mathbb{R}$ ).

Vsota  $n$ -tih potenc

$$x^n + y^n = (x + y)(x^{n-1} - x^{n-2}y + x^{n-3}y^2 - \dots - xy^{n-2} + y^{n-1})$$

Trinome, ki sledijo naslednjim oblikam lahko razstavimo.

Za nekatere trinome pa se lahko zgodi, da jih ne moremo razstaviti v množici  $\mathbb{Z}$  (oziroma  $\mathbb{R}$ ).

Tričlenik, ki je kvadrat

$$x^2 + 2xy + y^2 = (x + y)^2$$



**Viétovo pravilo**

$$x^2 + (a + b)x + ab = (x + a)(x + b)$$

**Ugibanje**

$$ax^2 + bx + c = (dx + e)(fx + g)$$

**Razstavljanje štiričlenika – združitev 2 člena + 2 člena**

$$xa + xb + ya + yb = x(a + b) + y(a + b) = (a + b)(x + y)$$

**Razstavljanje štiričlenika – združitev 3 členi + 1 člen**

$$a + 2ax + x^2 - b^2 = (a + x)^2 - b^2 = (a + x - b)(a + x + b)$$

**Naloga 2.29.** Razstavite razliko kvadratov.

- $x^2 - 25$
- $64 - y^2$
- $16m^2 - 81$
- $25a^2 - 49b^2$
- $121u^2 - 36v^2$

**Naloga 2.30.** Razstavite razliko kvadratov.

- $2z^2 - 8$
- $3b^2 - 12$
- $48 - 27h^2$
- $200t^2 - 8z^2$
- $a^2b - 49b$
- $80x^2 - 45y^2$

**Naloga 2.31.** Razstavite razliko kvadratov.

- $162s^3 - 32sc^2$
- $f^4 - 9g^2$
- $16u^4 - 81v^4$
- $a^4 - 16$
- $-18a^2 + 2b^4$

**Naloga 2.32.** Razstavite razliko kvadratov.

- $(f + 3)^2 - 25$
- $(2 - r)(2 + r)$
- $81x^4 - (y - 2)^2$
- $(x - y)^2 - (2x + 3y)^2$
- $5(4 - k)(4 + k)$

**Naloga 2.33.** Razstavite in izračunajte.

- $102^2 - 2^2$
- $23^2 - 22^2$
- $999^2 - 1$

**Naloga 2.34.** Razstavite vsoto ali razliko kubov.

- $a^2 - 8b^3$
- $1 + x^3$
- $27m^2 + 8$
- $27 + 64b^3$
- $125x^3 - 64y^3$
- $64a^6 - b^3$

**Naloga 2.35.** Razstavite vsoto ali razliko kubov.

- $a^3b^3 - 1$
- $8a^3 - b^6c^9$
- $m^5 + 27g^3m^2$
- $(a + 2)^3 - b^3$
- $10^3 - (a + b)^3$

**Naloga 2.36.** Razstavite.

- $m^2 + 14m + 45$
- $a^2 + 9a + 18$
- $x^2 - 9x + 20$
- $y^2 - 11y + 24$
- $z^2 - 13z + 22$
- $x^2 + 5x - 24$

**Naloga 2.37.** Razstavite.

- $m^2 + m - 110$
- $u^2 + 9u - 22$
- $x^2 - 5x - 24$
- $z^2 - 3z - 28$
- $p^2 - 4p - 45$
- $x^2 - 18x + 81$

**Naloga 2.38.** *Razstavite.*

- $3x^2 + 87x + 300$
- $2y^2 + 18y + 28$
- $2x^2 - 30x + 108$
- $7a^2 - 84a + 245$
- $6p^5 - 72p^4 + 216p^3$
- $2x^2 + 4x - 70$

**Naloga 2.39.** *Razstavite.*

- $72y - 81 + 9y^2$
- $3k^3 + 9k^2 - 12k$
- $16t - 4t^2 + 84$
- $p^3 + 13p^2 + 22p$
- $50b + 125 + 5b^2$
- $-7x^2 + 7x + 42$

**Naloga 2.40.** *Razstavite.*

- $x^2 + 16xy + 63y^2$
- $a^2 - 2aab - 35b^2$
- $p^2 + 3pk - 10k^2$
- $2z^2 - 2zu - 24u^2$
- $60c^3d^4 + 3c^5 - 27c^4d^2$

**Naloga 2.41.** *Zapišite izraze kot popolne kvadrante.*

- $x^2 + 18x + 81$
- $a^4 + 14a^2 + 29$
- $m^2 - 10m + 25$
- $100 - 20b + b^2$
- $u^2 - 12uv + 36v^2$
- $4y^2 - 12yz + 9z^2$

**Naloga 2.42.** *Razstavite.*

- $x^4 - 13x^2 + 36$
- $b^4 - 26b^2 + 25$
- $a^4 - 8a^2 - 9$
- $n^4 - 17n^2 + 16$
- $2y^6 + 10y^4 + 8y^2$

**Naloga 2.43.** *Razstavite.*

- $2a^2 + 7a - 4$
- $2x^2 + 5x + 3$
- $4m^2 + 10m - 24$
- $4p^2 + 29p - 24$
- $2f^2 + 9f - 5$
- $7b^2 + 23b + 6$

**Naloga 2.44.** *Razstavite.*

- $5^{2x} - 30 \cdot 5^x + 125$
- $3^{2x} + 6 \cdot 3^x - 27$
- $16^x - 5 \cdot 4^x + 6$
- $4^x - 18 \cdot 2^x + 32$

**Naloga 2.45.** *Razstavite.*

- $a^3 + 3a^2 - 4a - 12$
- $c^3 - 4c^2 - c + 4$
- $x^3 + 5x^2 - 4x - 20$
- $a^2 + ab - 2a - 2b$
- $a^2 + 3ab + 2a + 6b$
- $2xy + x - 4y - 2$

**Naloga 2.46.** *Razstavite.*

- $a^2 + 2a + 1 - b^2$
- $m^2 - 6m + 9 - k^2$
- $x^2 + 4xy + 4y^2 - 16$
- $u^2 - z^2 - 8z - 16$
- $x^2 - y^2 + 14y - 49$
- $25 - y^2 + 2xy - x^2$

**Naloga 2.47.** *Razstavite.*

- $a^5 - b^5$
- $a^4 - 16$
- $x^4y^4 - 625$
- $a^5 + 32$
- $x^5 - 32$
- $81 - x^4y^8$

**Naloga 2.48.** *Razstavite.*

- $a^4 - 5a^3 - 24a^2$
- $3x^3 + 6x^2 - 27x - 54$
- $108m^4 - 3m^2$
- $x^2 - 29xy + 100y^2$
- $u^4 - 125uv^3$
- $81 - 9b^2 + 12bc - 4c^2$

## Poglavje 3

# Deljivost

### 3.1 Relacija deljivosti

Naravno število  $m$  je **delitelj** naravnega števila  $n$  (**deljenec**), če obstaja naravno število  $k$  (**kvocient**), da velja:

$$n = k \cdot m.$$

Naravno število  $m$  deli naravno število  $n$ , ko je število  $n$  večkratnik števila  $m$ .

$$m \mid n \Leftrightarrow n = k \cdot m; \quad m, n, k \in \mathbb{N}$$

Število  $m$  je delitelj samega sebe in vseh svojih večkratnikov.

1 je delitelj vsakega naravnega števila.

Če  $d$  deli naravni števili  $m$  in  $n$ ,  $n > m$ , potem  $d$  deli tudi vsoto in razliko števil  $m$  in  $n$ .

Pri deljenju poljubnega naravnega števila  $n$  z naravnim številom  $m$  imamo dve možnosti:  $n$  je deljivo z  $m$  ali  $n$  ni deljivo z  $m$ .

Relacija deljivosti je:

1. **refleksivna**:

$$a \mid a;$$

2. **antisimetrična**:

$$a \mid b \wedge b \mid a \Rightarrow a = b;$$

3. **tranzitivna**:

$$a \mid b \wedge b \mid c \Rightarrow a \mid c.$$

Relacija s temi lastnostmi je relacija **delne urejenosti**, zato relacija deljivosti delno ureja množico  $\mathbb{N}$ .

**Naloga 3.1.** Zapišite vse delitelje števil.

- 6
- 16
- 37
- 48
- 120

**Naloga 3.2.** Pokažite, da trditev velja.

- Izraz  $x - 3$  deli izraz  $x^2 - 2x - 3$ .
- Izraz  $x + 2$  deli izraz  $x^3 + x^2 - 4x - 4$ .
- Izraz  $x - 2$  deli izraz  $x^3 - 8$ .

**Naloga 3.3.** Pokažite, da trditev velja.

- $19 \mid (3^{21} - 3^{20} + 3^{18})$
- $7 \mid (3 \cdot 4^{11} + 4^{12} + 7 \cdot 4^{10})$
- $14 \mid (5 \cdot 3^6 + 2 \cdot 3^8 - 3 \cdot 3^7)$
- $25 \mid (7 \cdot 2^{23} - 3 \cdot 2^{24} + 3 \cdot 2^{25} - 2^{22})$
- $11 \mid (2 \cdot 10^6 + 3 \cdot 10^7 + 10^8)$
- $35 \mid (6^{32} - 36^{15})$

**Naloga 3.4.** Pokažite, da trditev velja.

- $3 \mid (2^{2n+1} - 5 \cdot 2^{2n} + 9 \cdot 2^{2n-1})$
- $29 \mid (5^{n+3} - 2 \cdot 5^{n+1} + 7 \cdot 5^{n+2})$
- $10 \mid (3 \cdot 7^{4n-1} - 4 \cdot 7^{4n-2} + 7^{4n+1})$
- $10 \mid (9^{3n-1} + 9 \cdot 9^{3n+1} + 9^{3n} - 9^{3n+2})$
- $5 \mid (7 \cdot 2^{4n-2} + 3 \cdot 4^{2n} - 16^n)$

**Naloga 3.5.** Pokažite, da je za poljubno naravno število  $u$  vrednost izraza

$$(u + 7)(7 - u) - 3(3 - u)(u + 5)$$

večkratnik števila 4.

## 3.2 Kriteriji deljivosti

### Deljivost z 2

Število je deljivo z 2 natanko takrat, ko so enice števila deljive z 2.

### Deljivost s 3

Število je deljivo s 3 natanko takrat, ko je vsota števk števila deljiva s 3.

### Deljivost s 4 oziroma 25

Število je deljivo s 4 oziroma 25 natanko takrat, ko je dvomestni konec števila deljiv s 4 oziroma 25.

### Deljivost s 5

Število je deljivo s 5 natanko takrat, ko so enice števila enake 0 ali 5.

### Deljivost s 6

Število je deljivo s 6 natanko takrat, ko je deljivo z 2 in s 3 hkrati.

### Deljivost z 8 oziroma s 125

Število je deljivo z 8 oziroma s 125 natanko takrat, ko je trimestni konec števila deljiv z 8 oziroma s 125.

### Deljivost z 9

Število je deljivo z 9 natanko takrat, ko je vsota števk števila deljiva z 9.

### Deljivost z 10 oziroma $10^n$

Število je deljivo z 10 natanko takrat, ko so enice števila enake 0.

Število je deljivo z  $10^n$  natanko takrat, ko ima število na zadnjih  $n$  mestih števko 0.

### Deljivost z 11

Število je deljivo z 11 natanko takrat, ko je alternirajoča vsota števk tega števila deljiva z 11.

### Deljivost s 7

Algoritem za preverjanje deljivosti s 7:

1. vzamemo enice danega števila in jih pomnožimo s 5,
2. prvotnemu številu brez enic prištejemo dobljeni produkt,
3. vzamemo enice dobljene vsote in jih pomnožimo s 5,
4. produkt prištejemo prej novo dobljenemu številu ...

Postopek ponavljamo, dokler ne dobimo dvomestnega števila – če je to deljivo s 7, je prvotno število deljivo s 7.

**Naloga 3.6.** *S katerimi od števil 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 so deljiva naslednja števila?*

- 84742
- 393948
- 12390

- 19401

**Naloga 3.7.** Določite vse možnosti za števko  $a$ , da je število  $\overline{65833a}$ :

- deljivo s 3,
- deljivo s 4,
- deljivo s 5,
- deljivo s 6.

**Naloga 3.8.** Določite vse možnosti za števko  $b$ , da je število  $\overline{65b90b}$ :

- deljivo z 2,
- deljivo s 3,
- deljivo s 6,
- deljivo z 9,
- deljivo z 10.

**Naloga 3.9.** Določite vse možnosti za števki  $c$  in  $d$ , da je število  $\overline{115c1d}$  deljivo s 6.

**Naloga 3.10.** Določite vse možnosti za števki  $e$  in  $f$ , da je število  $\overline{115e1f}$  deljivo z 8.

**Naloga 3.11.** Pokažite, da za vsako naravno število  $n$  12 deli  $n^4 - n^2$ .

**Naloga 3.12.** Preverite, ali je število 8641969 deljivo s 7.

### 3.3 Osnovni izrek o deljenju

#### Osnovni izrek o deljenju

Za poljubni naravni števili **m** (**deljenec**) in **n** (**delitelj**),  $m \geq n$ , obstajata natanko določeni nenegativni števili **k** (**količnik/kvocijent**) in **r** (**ostanek**), da velja:

$$m = k \cdot n + r; \quad 0 \leq r < n; \quad m, n \in \mathbb{N}; k, r \in \mathbb{N}_0.$$

Če je ostanek pri deljenju enak 0, je število  $m$  **večkratnik** števila  $n$ . Tedaj je število  $m$  deljivo s številom  $n$ . Pravimo, da  $n$  deli število  $m$ :  $n \mid m$ .

**Naloga 3.13.** Določite, katera števila so lahko ostanki pri deljenju naravnega števila  $n$  s:

- številom 3;
- številom 7;
- številom 365.

**Naloga 3.14.** Zapišite prvih nekaj naravnih števil, ki dajo:

- pri deljenju s 4 ostanek 3;
- pri deljenju s 7 ostanek 4;
- pri deljenju z 9 ostanek 4.

**Naloga 3.15.** Zapišite naravno število, ki da:

- pri deljenju s 7 količnik 5 in ostanek 3;
- pri deljenju z 10 količnik 9 in ostanek 1;
- pri deljenju s 23 količnik 2 in ostanek 22.

**Naloga 3.16.** Zapišite množico vseh naravnih števil  $n$ , ki dajo:

- pri deljenju z 2 ostanek 1;
- pri deljenju z 2 ostanek 0;
- pri deljenju s 5 ostanek 2.

**Naloga 3.17.** Katere število smo delili s 7, če smo dobili kvocijent 3 in ostanek 5?

**Naloga 3.18.** S katerim številom smo delili število 73, če smo dobili kvocijent 12 in ostanek 1?

**Naloga 3.19.** Marjeta ima čebulice tulipana, ki jih želi posaditi v več vrst. V vsaki od 3 vrst je izkopala po 8 jamic, potem pa ugotovila, da ji bosta 2 čebulici ostali. Koliko čebulic ima Marjeta?

**Naloga 3.20.** Če neko število delimo z 8, dobimo ostanek 7. Kolikšen je ostanek, če to isto število delimo s 4?

**Naloga 3.21.** Če neko število delimo s 24 dobimo ostanek 21. Kolikšen je ostanek, če to isto število delimo s 3?

### 3.4 Praštevila in sestavljena števila

Glede na število deliteljev, lahko naravna števila razdelimo na tri skupine:

- **število 1** – število, ki ima samo enega delitelja (samega sebe);
- **praštevila** – števila, ki imajo natanko dva delitelja (1 in samega sebe);
- **sestavljena števila** – števila, ki imajo več kot dva delitelja.

$$\mathbb{N} = \{1\} \cup \mathbb{P} \cup \{\text{sestavljena števila}\}$$

Praštevilo je neskončno mnogo.

Število  $n$  je praštevilo, če ni deljivo z nobenim praštevilom, manjšim ali enakim  $\sqrt{n}$ .

**Eratostenovo sito:**

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80  |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90  |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

**Naloga 3.22.** Preverite, ali so števila 103, 163, 137, 197, 147, 559 praštevila.

### 3.5 Osnovni izrek aritmetike

Vsako naravno število lahko enolično/na en sam način (do vrstnega reda faktorjev natančno) zapišemo kot produkt potenc s praštevilskimi osnovami:

$$n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_l^{k_l}; p_i \in \mathbb{P} \wedge n, k_i \in \mathbb{N}.$$

Zapis naravnega števila kot produkt potenc s praštevilskimi osnovami imenujemo tudi **praštevilski razcep**.

**Naloga 3.23.** Zapišite število 8755 kot produkt samih praštevil in njihovih potenc.

**Naloga 3.24.** Razcepite število 3520 na prafaktorje.

**Naloga 3.25.** Zapišite praštevilski razcep števila 38250.

**Naloga 3.26.** Zapišite praštevilski razcep števila 3150.

**Naloga 3.27.** Razcepite število 66 na prafaktorje in zapišite vse njegove delitelje.

**Naloga 3.28.** Razcepite število 204 na prafaktorje in zapišite vse njegove delitelje.

**Naloga 3.29.** Zapišite vse izraze, ki delijo dani izraz.

- $x^2 + x - 1$
- $x^3 - x^2 - 4x + 4$
- $x^3 - 27$



### 3.6 Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik

**Največji skupni delitelj** števil  $m$  in  $n$  je največje število od tistih, ki delijo števili  $m$  in  $n$ . Oznaka:  $D(m, n)$ .

**Najmanjši skupni večkratnik** števil  $m$  in  $n$  je najmanjše število od tistih, ki so deljiva s številoma  $m$  in  $n$ . Oznaka:  $v(m, n)$ .

Števili  $m$  in  $n$ , katerih največji skupni delitelj je 1, sta **tuji števili**.

#### Računanje $D$ in $v$ s prafaktorizacijo števil

- Števili  $m$  in  $n$  prafaktoriziramo.
- Za  $D(m, n)$  vzamemo potence, ki so skupne obema številom v prafaktorizaciji.
- Za  $v(m, n)$  vzamemo vse potence, ki se pojavijo v prafaktorizaciji števil, z največjim eksponentom.

Za poljubni naravni števili  $m$  in  $n$  velja zveza  $D(m, n) \cdot v(m, n) = m \cdot n$ .

#### Evklidov algoritem

V tem algoritmu zapored uporabljamo osnovni izrek o deljenju.

Najprej ga uporabimo na danih dveh številih.

V naslednjem koraku deljenec postane prejšnji delitelj, delitelj pa prejšnji ostanek.

V vsakem koraku imamo manjša števila, zato se algoritem konča v končno mnogo korakih.

Največji skupni delitelj danih števil  $m$  in  $n$  je zadnji od 0 različen ostanek pri deljenju v Evklidovem algoritmu.

**Naloga 3.30.** *Izračunajte največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik danih parov števil.*

- 6 in 8
- 36 in 48
- 550 in 286
- 6120 in 4158

**Naloga 3.31.** *Preverite, ali sta števili 522 in 4025 tuji števili.*

**Naloga 3.32.** *Izračunajte največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik treh števil.*

- 1320, 6732 in 297
- 372, 190 in 11264

**Naloga 3.33.** *Z Evklidovim algoritmom izračunajte največji skupni delitelj parov števil.*

- 754 in 3146
- 4446 in 6325

**Naloga 3.34.** *Izračunajte število  $b$ , če velja:  $D(78166, b) = 418$  in  $v(78166, b) = 1485154$ .*

**Naloga 3.35.** *Določite največji skupni delitelj izrazov.*

- $x^3 - 5x^2 - 24x$  in  $x^2 - 64$
- $x^2 + 3x + 10$ ,  $x^3 - 4x$  in  $x^3 - 8$
- $x^2 - 25$  in  $x^3 - 27$

**Naloga 3.36.** *Določite najmanjši skupni večkratnik izrazov.*

- $x^2 - 64$  in  $x + 8$
- $x, 8 - x$  in  $x^2 - 64$
- $x^2 + 3x - 10, 2x$  in  $x^2 + 5x$

**Naloga 3.37.** *Velika Janezova terasa je dolga 1035 cm in široka 330 cm. Janez bi jo rad sam tlakoval s kvadratnimi vinilnimi ploščami. Ker ni najbolj vešč tega dela, bo kupil tako velike plošče, da mu jih ne bo treba rezati. Koliko so največ lahko velik kvadratne plošče? Koliko plošč bo potreboval za tlakovanje?*

**Naloga 3.38.** *Neca gre v knjižnico vsake 14 dni, Nace pa vsakih 10 dni. V knjižnici se srečata v ponedeljek 1. marca. Čez koliko dni se bosta naslednjič srečala? Na kateri dan in datum?*

## Poglavje 4

# Racionalna števila

### 4.1 Ulomki in racionalna števila

**Ulolek**  $\frac{x}{y}$  je zapis, ki predstavlja zapis deljenja

$$x : y = \frac{x}{y}; \quad y \neq 0 \wedge x, y \in \mathbb{Z}.$$

Število/izraz  $x$  imenujemo **števec**,  $y$  pa **imenovalec**, med njima je **ulomkova črta**.

Ulolek  $\frac{x}{0}$  ni definiran (nima pomena), saj z 0 ne moremo deliti.

**Algebrski ulomek** je ulomek, v katerem v števcu in/ali imenovalcu nastopajo algebrski izrazi.

Vsako celo število  $x \in \mathbb{Z}$  lahko zapišemo z ulomkom:  $x = \frac{x}{1}$ .

**Ničelni ulomek** je ulomek oblike  $\frac{0}{y} = 0; y \neq 0$ .

V ulomku, kjer v števcu ali imenovalcu nastopa negativno število, upoštevamo enakost

$$-\frac{x}{y} = \frac{-x}{y} = \frac{x}{-y}.$$


Vsakemu neničelnemu ulomku  $\frac{x}{y}$  lahko priredimo njegovo **obratno vrednost**:

$$\left(\frac{x}{y}\right)^{-1} = \frac{y}{x}; \quad x, y \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}.$$

### Racionalna števila

Množica racionalnih števil  $\mathbb{Q}$  je sestavljena iz vseh ulomkov (kar pomeni, da vsebuje tudi vsa naravna in cela števila).

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{x}{y}; x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z} \setminus \{0\} \right\}$$



Glede na predznak razdelimo racionalna števila v tri množice:

- množico negativnih racionalnih števil  $\mathbb{Q}^-$ ,
- množico z elementom nič:  $\{0\}$  in
- množico pozitivnih racionalnih števil:  $\mathbb{Q}^+$ .

$$\mathbb{Q} = \mathbb{Q}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{Q}^+$$

Ulomka  $\frac{x}{y}$  in  $\frac{w}{z}$  sta enaka/enakovredna natanko takrat, ko je  $xz = wy$ ;  $y, z \neq 0$ .

$$\frac{x}{y} = \frac{w}{z} \Leftrightarrow xz = wy; \quad y, z \neq 0$$

Enaka/enakovredna ulomka sta različna zapisa za isto racionalno število.

**Naloga 4.1.** Za katere vrednosti  $x$  ulomek ni definiran?

- $\frac{x-2}{x+1}$
- $\frac{2}{x-5}$
- $\frac{x+2}{13}$
- $\frac{3}{2x-5}$

**Naloga 4.2.** Za katere vrednosti  $x$  ima ulomek vrednost enako 0?

- $\frac{x-2}{x+1}$
- $\frac{2}{x-5}$
- $\frac{x+2}{13}$
- $\frac{3}{2x-5}$

**Naloga 4.3.** Ali imata ulomka isto vrednost?

- $\frac{2}{3}$  in  $\frac{10}{15}$
- $\frac{-1}{2}$  in  $\frac{1}{-2}$
- $\frac{4}{5}$  in  $\frac{-8}{-10}$
- $\frac{5}{8}$  in  $\frac{8}{5}$

**Naloga 4.4.** Za kateri  $x$  imata ulomka isto vrednost?

- $\frac{x+1}{2}$  in  $\frac{3}{4}$
- $\frac{4}{2x-1}$  in  $\frac{1}{3}$
- $\frac{x+1}{2}$  in  $\frac{x-1}{-3}$
- $\frac{x+1}{x-2}$  in  $\frac{2}{5}$

**Naloga 4.5.** Ali ulomka predstavljata isto vrednost?

- $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$  in  $-\frac{1}{2}$
- $\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}$  in  $\frac{3}{2}$
- $1\frac{3}{7}$  in  $\left(\frac{7}{10}\right)^{-1}$

**Naloga 4.6.** Ali ulomka predstavljata isto vrednost?

- $2 \cdot \frac{3}{4}$  in  $\frac{3}{2}$
- $2\frac{3}{4}$  in  $\frac{3}{2}$
- $\left(1\frac{2}{5}\right)^{-1}$  in  $1\frac{5}{2}$
- $\left(1\frac{2}{5}\right)^{-1}$  in  $\frac{5}{7}$

**Naloga 4.7.** Zapišite s celim delom oziroma z ulomkom.

- $\frac{14}{5}$
- $-\frac{5}{2}$
- $\frac{4}{3}$
- $\frac{110}{17}$
- $3\frac{5}{8}$
- $2\frac{9}{2}$

## 4.2 Razširjanje in krajšanje ulomkov

### Razširjanje ulomka

Ulomek ohrani svojo vrednost, če števec in imenovalec pomnožimo z istim neničelnim številom oziroma izrazom. Temu postopku pravimo **razširjanje ulomka**.

$$\frac{x}{y} = \frac{x \cdot z}{y \cdot z}; \quad x \in \mathbb{Z} \wedge y, z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Ko ulomke seštevamo ali odštevamo, jih razširimo na **najmanjši skupni imenovalec**, ki je najmanjši skupni večkratnik vseh imenovalcev.

### Krajšanje ulomka

Vrednost ulomka se ne spremeni, če števec in imenovalec delimo z istim neničelnim številom oziroma izrazom. Temu postopku rečemo **krajšanje ulomka**.

$$\frac{x \cdot z}{y \cdot z} = \frac{x}{y}; \quad x \in \mathbb{Z} \wedge y, z \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Ulomek  $\frac{x}{y}$  je **okrajšan**, če je  $(x, y) = 1$ , torej če sta števec in imenovalec tuji števili.

**Naloga 4.8.** Razširite ulomke na najmanjši skupni imenovalec.

- $\frac{1}{3}, \frac{3}{5}$  in  $\frac{5}{6}$
- $\frac{2}{7}, 1$  in  $\frac{1}{2}$
- $\frac{5}{6}, \frac{1}{2}$  in  $-\frac{2}{3}$
- $\frac{1}{5}, -\frac{1}{2}$  in  $\frac{-1}{3}$
- $\frac{2}{-1}, \frac{3}{2}$  in  $\frac{1}{-3}$
- $\frac{3}{-4}, \frac{-1}{2}$  in  $-\frac{2}{5}$

**Naloga 4.9.** Razširite ulomke na najmanjši skupni imenovalec.

- $\frac{1}{x-1}, \frac{1}{x+1}$  in  $1$
- $\frac{2}{x}, \frac{1}{x-3}$  in  $\frac{1}{(x-3)^2}$
- $\frac{3}{x^2-4x}, \frac{1}{x}$  in  $\frac{2}{x-4}$
- $\frac{4}{x-4}, \frac{2}{x-2}$  in  $\frac{1}{x^2-6x+8}$
- $\frac{2}{x-1}$  in  $\frac{3}{1-x}$
- $\frac{1}{2-x}, \frac{2}{x+2}$  in  $\frac{3}{x^2-4}$

**Naloga 4.10.** Okrajšajte ulomek.

- $\frac{100}{225}$
- $\frac{34}{51}$
- $\frac{121}{3}$
- $\frac{45}{75}$

**Naloga 4.11.** Okrajšajte ulomek.

- $\frac{x^2-4}{x^2+2x}$
- $\frac{x^3+8}{2x+4}$
- $\frac{x^3-1}{x^2-4x+3}$
- $\frac{x^3-2x^2-x+2}{x^2-3x+2}$
- $\frac{x^2-9}{3-x}$
- $\frac{x-4}{16-x^2}$

### 4.3 Seštevanje in odštevanje ulomkov

#### Seštevanje ulomkov

Ulomke **seštevamo** tako, da jih razširimo na skupni imenovalce, nato seštejemo števce, imenovalce pa prepišemo.

$$\frac{x}{y} + \frac{z}{w} = \frac{xw}{yw} + \frac{yz}{yw} = \frac{xw + yz}{yw}; \quad x, z \in \mathbb{Z} \wedge y, w \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

#### Odštevanje ulomkov

Ulomke **odštevamo** tako, da prištejemo nasprotni ulomek.

$$\frac{x}{y} - \frac{z}{w} = \frac{x}{y} + \left(-\frac{z}{w}\right) = \frac{xw}{yw} + \frac{-yz}{yw} = \frac{xw - yz}{yw}; \quad x, z \in \mathbb{Z} \wedge y, w \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

**Naloga 4.12.** *Izračunajte.*

- $\frac{5}{7} + \frac{1}{14}$
- $\frac{2}{9} - \frac{1}{3}$
- $\frac{3}{8} + 1\frac{1}{2}$
- $1 - \frac{5}{6}$

**Naloga 4.13.** *Izračunajte.*

- $\left(\frac{2}{3} - 2\frac{1}{4}\right) + \frac{1}{12}$
- $\frac{2}{7} - \frac{3}{4} + \left(\frac{1}{2} - 2\right)$
- $\left(\frac{2}{3} - \left(\frac{1}{3} - 3\right) + \frac{1}{4}\right) - \frac{1}{2}$
- $1 - \left(2 - \left(3 - 4 - \left(5 - \frac{1}{2}\right)\right) + \frac{1}{3}\right)$

**Naloga 4.14.** *Poenostavite.*

- $\frac{x}{x-1} - \frac{x}{x+1}$
- $\frac{3}{x^2} + \frac{4}{x^3} - \frac{1}{x}$
- $\frac{3}{x^2-4x} - \left(\frac{1}{x-4} + \frac{2}{x^2-5x+4}\right)$
- $\frac{2}{xy} + \frac{3}{x} - \frac{2}{y}$

**Naloga 4.15.** *Poenostavite.*

- $\frac{(x-3)^2 + (x+3)^2}{x^2+9} - \frac{3x^2}{2x^2-x^2}$
- $\frac{(a-3)^3 - (a-1)^3 + 26}{6a} + \left(-\frac{1}{2}\right)^{-1}$
- $\frac{x^3-2x^2-x+2}{-x(1-x)-2} - \left(\frac{x-1}{x} - 1\right)^{-1}$
- $\left(\frac{x}{2} - \left(\frac{x}{3} - \left(\frac{x}{4} - \frac{x}{5}\right)\right)\right) - \left(\frac{60}{x}\right)^{-1}$

### 4.4 Množenje ulomkov

Ulomka **množimo** tako, da števce množimo s števci, imenovalce pa množimo z imenovalci.

$$\frac{x}{y} \cdot \frac{z}{w} = \frac{xz}{yw}; \quad x, z \in \mathbb{Z} \wedge y, w \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Produkt danega in njemu obratnega ulomka je enak 1.

$$\frac{x}{y} \cdot \left(\frac{x}{y}\right)^{-1} = \frac{x}{y} \cdot \frac{y}{x} = 1$$

**Naloga 4.16.** *Izračunajte.*

- $\frac{1}{3} \cdot \frac{3}{7}$
- $\frac{-2}{13} \cdot \left(-\frac{39}{4}\right)$
- $\frac{2}{5} \cdot \frac{4}{9}$
- $2\frac{1}{3} \cdot 3\frac{3}{4}$
- $\frac{-3}{5} \cdot 4\frac{1}{7}$
- $3 \cdot \frac{2}{3}$

**Naloga 4.17.** *Poenostavite.*

- $\frac{x^2-9}{x^2+3x+9} \cdot \frac{x^3-27}{x^2-6x+9}$
- $\frac{x^2+5x}{-x+2} \cdot \frac{2x^2-8}{x^2+7x+10}$
- $\frac{x^3-4x^2-4x+16}{2x+4} \cdot \frac{6x}{3x-6}$
- $2 \cdot \frac{x}{x-1} \cdot \frac{x^2-1}{x^2+x}$

**Naloga 4.18.** *Poenostavite.*

- $\frac{x^2-4}{x^2-1} \cdot \frac{x^3-1}{x^3+x^2+x} \cdot \frac{x^2+x}{2-x}$

- $\left(\frac{6-x}{x^2+6x} - \frac{x}{36-x^2}\right) \cdot \left(\frac{2x-6}{x^2+6x}\right)^{-1} + \frac{x}{6-x}$
- $\left(\left(x-y + \left(\frac{x+y}{2xy}\right)^{-1}\right) \cdot \left(\frac{1}{x+y}\right)^{-1} - 2xy\right) \cdot (x-y)^{-1}$
- $\left(xy + y^2 - \frac{xy+y^2}{3xy-3x^2}\right) \cdot \left(\frac{x+y}{3x}\right)^{-1} - \left(-\frac{y-x}{y}\right)^{-1}$

## 4.5 Deljenje ulomkov

Ulomek **delimo** z neničelnim ulomkom tako, da prvi ulomek množimo z obratno vrednostjo drugega ulomka.

$$\frac{x}{y} : \frac{z}{w} = \frac{x}{y} \cdot \left(\frac{z}{w}\right)^{-1} = \frac{x}{y} \cdot \frac{w}{z} = \frac{xw}{yz}; \quad x \in \mathbb{Z} \wedge y, z, w \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

Deljenje ulomkov lahko zapišemo kot **dvojni ulomek**.

$$\frac{x}{y} : \frac{z}{w} = \frac{\frac{x}{y}}{\frac{z}{w}}; \quad x \in \mathbb{Z} \wedge y, z, w \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

**Naloga 4.19.** *Izračunajte.*

- $2 : \frac{4}{5}$
- $1\frac{2}{3} : 2\frac{5}{6}$
- $\frac{7}{12} : 14$
- $\frac{3}{8} : \frac{9}{32}$

**Naloga 4.20.** *Izračunajte.*

- $\frac{\frac{3}{4}}{\frac{4}{6}}$
- $\frac{\frac{8}{1}}{\frac{2}{3}}$
- $\frac{\frac{5}{6}}{\frac{2}{-5}}$
- $\frac{\frac{3}{5}}{\frac{-1}{-5}}$
- $\frac{-2}{\frac{-1}{2}}$
- $\frac{-2}{2^{-1}}$

**Naloga 4.21.** *Poenostavite.*

- $\frac{x^2+x-6}{x+2} : (x-2)$
- $\frac{x-1}{2x^2-4x} : \frac{x^2}{x-2}$
- $x : \frac{x^2+x}{x^3+1}$

**Naloga 4.22.** *Poenostavite.*

- $\frac{x-1}{x^2-4} : \frac{1-x^2}{x-2}$
- $\frac{x-2}{(x+2)^{-1}} : \left(\frac{1}{x^2-1}\right)^{-1}$
- $\frac{3-x}{2-x} : \frac{x-3}{x-2}$


## 4.6 Urejenost racionalnih števil

Za ulomka  $\frac{x}{y}$  in  $\frac{z}{w}$  ( $y, w \notin \{0\}$ ) velja natanko ena izmed treh možnosti:


1. prvi ulomek je večji od drugega  $\frac{x}{y} \geq \frac{z}{w}$  natanko tedaj, ko je  $xw \geq yz$ ;
2. drugi ulomek je večji od prvega  $\frac{x}{y} \leq \frac{z}{w}$  natanko tedaj, ko je  $xw \leq yz$ ;
3. ulomka sta enaka  $\frac{x}{y} = \frac{z}{w}$  natanko tedaj, ko je  $xw = yz$  oziroma  $\frac{x}{y} \leq \frac{z}{w} \wedge \frac{x}{y} \geq \frac{z}{w}$ .

Enaka ulomka predstavljata isto racionalno število.

Slika večjega racionalnega števila  $\frac{x}{y}$  je na številski premici desno od slike manjšega racionalnega števila  $\frac{z}{w}$ .



Slike pozitivnih racionalnih števil ležijo desno, slike negativnih racionalnih števil pa levo od koordinatnega izhodišča.



V množici ulomkov velja, da je vsak negativen ulomek manjši od vsakega pozitivnega ulomka.

Množica racionalnih števil je **linearno urejena** z relacijo *biti manjši ali enak* ( $\leq$ ) oziroma *biti večji ali enak* ( $\geq$ ).

Za to relacijo linearne urejenosti veljajo naslednje lastnosti:

- **refleksivnost:**  $\forall \frac{x}{y} \in \mathbb{Q} : \frac{x}{y} \leq \frac{x}{y}$ ;
- **antisimetričnost:**  $\forall \frac{x}{y}, \frac{z}{w} \in \mathbb{Q} : \frac{x}{y} \leq \frac{z}{w} \wedge \frac{z}{w} \leq \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{x}{y} = \frac{z}{w}$ ;
- **tranzitivnost:**  $\forall \frac{x}{y}, \frac{z}{w}, \frac{r}{q} \in \mathbb{Q} : \frac{x}{y} \leq \frac{z}{w} \wedge \frac{z}{w} \leq \frac{r}{q} \Rightarrow \frac{x}{y} \leq \frac{r}{q}$  in
- **stroga sovisnost:**  $\forall \frac{x}{y}, \frac{z}{w} \in \mathbb{Q} : \frac{x}{y} \leq \frac{z}{w} \vee \frac{z}{w} \leq \frac{x}{y}$ .

Množica racionalnih števil pa je tudi **delno urejena**, in sicer z relacijo *biti manjši* ( $<$ ) oziroma *biti večji* ( $>$ ).

Tedaj veljajo le lastnosti: **refleksivnost**, **antisimetričnost** in **tranzitivnost**.

Pri množenju neenakosti s pozitivnim številom se znak neenakosti ohrani.

$$\frac{x}{y} < \frac{z}{w} \quad \wedge \quad \frac{r}{q} > 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{y} \cdot \frac{r}{q} < \frac{z}{w} \cdot \frac{r}{q}$$

Pri množenju neenakosti s negativnim številom se znak neenakosti obrne.

$$\frac{x}{y} < \frac{z}{w} \quad \wedge \quad \frac{r}{q} < 0 \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{y} \cdot \frac{r}{q} > \frac{z}{w} \cdot \frac{r}{q}$$

### Monotonost vsote

Če na obeh straneh neenakosti prištejemo isto število, se neenakost ohrani.

$$\frac{x}{y} < \frac{z}{w} \quad \Rightarrow \quad \frac{x}{y} + \frac{r}{q} < \frac{z}{w} + \frac{r}{q}$$



**Naloga 4.23.** *Kateri od ulomkov je večji?*

- $\frac{3}{7}, \frac{3}{8}$
- $\frac{3}{7}, \frac{3}{3}$
- $\frac{2}{5}, \frac{3}{10}$
- $\frac{1}{100}, \frac{1}{200}$

**Naloga 4.24.** *Katero število je za  $\frac{3}{5}$  večje od  $\frac{2}{3}$ ?*

**Naloga 4.25.** *Katero število je za  $\frac{1}{3}$  manjše od  $\frac{7}{9}$ ?*

**Naloga 4.26.** *Ulomke uredite po velikosti od večjega k manjšemu.*

- $\frac{2}{5}, \frac{3}{10}, \frac{8}{9}$  in  $\frac{7}{8}$
- $-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{3}{4}$  in  $-\frac{2}{5}$

**Naloga 4.27.** *Ali obstajajo ulomki z imenovalcem 25, ki so med  $\frac{4}{9}$  in  $\frac{5}{9}$ ? Če obstajajo, jih zapišite.*

**Naloga 4.28.** *Ali obstajajo ulomki z imenovalcem 100, ki so med  $\frac{13}{53}$  in  $\frac{14}{53}$ ? Če obstajajo, jih zapišite.*

## 4.7 Potence s celimi eksponenti

Naravna števila so enaka pozitivnim celim številom, torej so potence s pozitivnimi celimi eksponenti enake potencam z naravnimi eksponenti.

Potenca z eksponentom enakim 0 je definirana kot:

$$x^0 = \begin{cases} 1 & x \neq 0; \\ 1 \text{ ali } ND & x = 0. \end{cases}$$

Potenca z negativnim celim eksponentom pa je definirana kot:

$$x^{-n} = \frac{1}{x^n}; \quad x \notin \{0\}, n \in \mathbb{N}.$$

### Pravila za računanje s potencami s celimi eksponenti

V spodaj zapisanih pravilih upoštevamo realni osnovi  $x, y \in \mathbb{R}$  in cele eksponente  $m, n \in \mathbb{Z}$ .

- $x^n \cdot x^m = x^{n+m}$
- $x^n \cdot y^n = (xy)^n$
- $(x^n)^m = x^{nm}$
- $x^n : x^m = \frac{x^n}{x^m} = x^{n-m}$
- $x^n : y^n = \frac{x^n}{y^n} = \left(\frac{x}{y}\right)^n; \quad y \neq 0$

**Naloga 4.29.** *Poenostavite.*

- $x^{10} : x^5$
- $b^4 : b^{-11}$
- $y^{-3} : y^2$

**Naloga 4.30.** *Poenostavite.*

- $\frac{x^3 y^{-2}}{x^{-2} y^3}$
- $\frac{2^{10} a^4 b^{-4}}{2^{-2} a^{-2} b}$
- $\frac{3^{10} x^{-12} y^{-20}}{6^{10} x^2 y^{-3}}$

**Naloga 4.31.** *Poenostavite.*

- $\left(\frac{-2^5 a^{-4} b^3}{2^{-2} a b^{-2}}\right)^2 : \left(-\frac{a^2 b^4}{2^3 a^{-2}}\right)^3$
- $\left(\frac{-3^4 x^{-2} y^3}{x^3 z^2}\right)^{-4} \cdot \left(\frac{3^5 x^2 z^{-2}}{y^{-3}}\right)^3$
- $-\frac{5^5 a^4 b^{-3}}{a^{-3} b^2} : \left(-\frac{5^2 a^{-2} b}{a^2}\right)^2$

**Naloga 4.32.** *Poenostavite.*

- $\frac{x^{-2} + x^{-1}}{x^{-3} + x^{-2}}$
- $\frac{x^{-1} + x^{-2} + x^{-3}}{x^{-4} - x^{-1}}$
- $\frac{1 + x^{-2}}{x^{-4} - 1}$
- $\frac{x^{-2} + x^{-3}}{x^{-3} - x^{-2}}$

**Naloga 4.33.** *Poenostavite.*

- $\frac{3^{n+2} - 2 \cdot 3^{n-1}}{3^{n-2} + 3^n}$
- $\frac{5^{2n} + 5^{2n-1} - 2 \cdot 5^{2n+1}}{25^n}$
- $\frac{7^{3n-3} + 3 \cdot 7^{3n-2} - 7^{3n-4}}{7^{3n-2} - 7^{3n-1}}$
- $\frac{2^{n-1} + 3 \cdot 2^n}{4^n + 5 \cdot 2^{2n-1}}$

**Naloga 4.34.** *Napišite brez negativnih eksponentov.*

- $x^{-1} + 2x^{-2}$
- $1 - x^{-1} - x^{-2}$
- $\frac{1}{x^{-1}} + x^{-1}$
- $\left(\frac{\frac{2}{x^{-2}}}{(x^{-2})^{-1}}\right)^{-1}$

**Naloga 4.35.** *Poenostavite.*

- $(x - x^{-1}) \cdot (x^2 - 1)^{-1}$
- $\frac{x^{-2} + x^{-1}}{x^{-2} - x^{-1}} - (1 - x)^{-1}$
- $\left(\frac{x^{-3} - x^{-1}}{1 - x^{-2}}\right)^{-1} + \left(\frac{1}{x}\right)^{-1}$
- $(x^{-2} - 2x^{-1} + 1)^{-1} - (x - 1)^{-2}$

## 4.8 Decimalni zapis

Vsako racionalno število lahko zapišemo na dva načina:

- z **ulomkom** in
- z **decimalnim zapisom**.

**Decimalni zapis** sestavljajo tri komponente:

- **celi del**,
- **decimalna pika** oziroma **decimalna vejica** in
- **ulomljeni del**.

Decimalni zapis racionalnega števila (zapisanega z ulomkom) dobimo tako, da števec ulomka delimo z njegovim imenovalcem.

### Končen decimalni zapis

**Končen decimalni zapis** dobimo pri **desetiških/decimalnih ulomkih**.

To so ulomki, katerih imenovalce se lahko razširi na potenco števila 10, takšni imenovalci so oblike  $2^n \cdot 5^m$ .

### Neskončen periodičen decimalni zapis

**Neskončen periodičen decimalni zapis** dobimo pri **nedesetiških/nedecimalnih ulomkih**.

To so ulomki, katerih imenovalca ne moremo razširiti na potenco števila 10.

Najmanjšo skupino števk, ki se pri neskončnem periodičnem decimalnem zapisu ponavlja, imenujemo **perioda**. Označujemo jo s črtico nad to skupino števk.

Glede na število števk, ki v njej nastopajo, določimo njen **red**.

**Naloga 4.36.** Zapišite z decimalnim zapisom.

- |                   |                  |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|
| • $\frac{3}{8}$   | • $\frac{5}{6}$  | • $\frac{1}{7}$   |
| • $\frac{2}{125}$ | • $\frac{4}{9}$  | • $\frac{11}{13}$ |
| • $\frac{6}{25}$  | • $\frac{4}{15}$ |                   |

**Naloga 4.37.** Periodično decimalno število zapišite z okrajšanim ulomkom.

- $0.\overline{24}$
- $0.\overline{9}$
- $1.\overline{2}$
- $1.0\overline{3}$
- $1.00\overline{12}$

**Naloga 4.38.** Izračunajte.

- $2.3 + 4.8$
- $11.3 + 2.35$
- $0.94 + 0.24$
- $5.6 - 2.9$

- $0.2 - 1.25$
- $12.5 - 20.61$

**Naloga 4.39.** Izračunajte.

- $0.1 \cdot 2.44$
- $1.2 \cdot 0.4$
- $11 \cdot 0.002$
- $0.5 \cdot 0.04$
- $0.3 : 5$
- $12.5 : 0.05$
- $2 : 0.02$
- $0.15 : 0.3$

**Naloga 4.40.** Izračunajte.

- $(0.24 + 0.06) : 5 - 1.2$
- $12 : (1.2 - 0.2 \cdot 3) + 1.2$
- $(2 - 0.3 : (0.025 + 0.035)) \cdot 0.11$
- $(1 - 0.2 : (0.03 + 0.02)) \cdot 1.5$
- $0.3 \cdot (1.2 - 0.6 \cdot (0.04 + 0.06))$

## 4.9 Sklepni račun

Pri sklepnem računu obravnavamo situacije, v katerih nastopata dve količini, ki sta premo sorazmerni ali obratno sorazmerni.

### Premo sorazmerje

Količini  $x$  in  $y$  sta **premo sorazmerni**, če obstaja takšno neničelno število  $k \in \mathbb{R}^*$ , da je  $x = k \cdot y$ .

### Obratno sorazmerje

Količini  $x$  in  $y$  sta **obratno sorazmerni**, če obstaja takšno neničelno število  $k \in \mathbb{R}^*$ , da je  $x = \frac{k}{y}$ .

**Naloga 4.41.** *Delavec v štirih urah zasluži 10 €. Koliko zasluži v dvanajstih urah?*

**Naloga 4.42.** *Tiskalnik v sedmih minutah natisne 42 strani. Koliko časa potrebuje za 108 strani?*

**Naloga 4.43.** *Tri čebele v treh dneh oprashi devetsto cvetov. Koliko cvetov v šestih dneh oprashi šest čebel?*

**Naloga 4.44.** *Kolesar od Ljubljane do Geometrijskega središča Slovenije potuje dve uri s hitrostjo 20 km/h. Kako hitro bi moral peljati, da bi pot prevozil v eni uri in petnajstih minutah?*

**Naloga 4.45.** *En računalnik za pripravo posebnih efektov filma potrebuje 14 ur. Koliko časa bi potrebovali trije taki računalniki, za pripravo posebnih efektov za šest filmov?*

**Naloga 4.46.** *Sedem pleskarjev pleska hišo 15 dni. Po petih dneh dva delavca premestijo na drugo delovišče. Koliko časa bodo preostali delavci pleskali hišo?*

## 4.10 Odstotni račun

Količine pri odstotnem računu so povezane s sklepnim računim, in sicer so v premem sorazmerju.

**Odstotek** (ali procent) % celote definiramo kot stotino celote, **odtisoček** (ali promil) ‰ kot tisočino celote.

$$1 \% = \frac{1}{100} \quad 1 \text{ ‰} = \frac{1}{1000}$$

**Relativni delež** je kvocient med deležem in osnovo:  $r = \frac{d}{o}$ .

**Naloga 4.47.** Zapišite z okrajšanim ulomkom oziroma odstotkom.

- 12 %
- 20 %  $a$
- 250 %
- 0.5 %  $b$
- 12 ‰
- $\frac{3}{4}a$
- $\frac{20}{7}x$
- $\frac{31}{10}y$
- 0.8  $z$
- $\frac{25}{8}m$

**Naloga 4.48.** Izračunajte.

- Koliko je 20 % od 10 kg?
- Koliko je 25 % od 20 €?
- Koliko je 10 % od 1 l?
- Koliko je 250 % od 12 g?
- Koliko je 1 ‰ od 2350 kg?
- Koliko je 17 ‰ od 100 m?

**Naloga 4.49.** Pri ekološki pridelavi kmet pridelal 3 tone pšenice na hektar. Zaradi toče je bil letošnji pridelek le 2450 kg pšenice. Za koliko odstotkov se je zmanjšala količina pridelka zaradi toče?

**Naloga 4.50.** V 5 kg raztopine je 120 g soli. Koliko odstotna je ta raztopina?

**Naloga 4.51.** V tovarni čevljev so povečali proizvodnjo s 1250 parov tedensko na 1700 parov. Koliko odstotno je to povečanje?

**Naloga 4.52.** Kokoši nesnice znesejo 270 jajc letno. Koliko odstotna je njihova nesnost?

**Naloga 4.53.** V trgovini stane izdelek 120 €. Koliko stane po:

- 5 % podražitvi,
- 20 % pocenitvi?

**Naloga 4.54.** Jošt je natipkal besedilo na list A4 formata v pisava Arial, velikosti 12, in ugotovil, da je bilo na strani 3150 znakov s presledki. Če bi pisavo zmanjšal na velikost 10, bi na stran prišlo 28 % več znakov. Koliko?

**Naloga 4.55.** Dizelsko gorivo je stalo v Sloveniji 1.421 €, v Italijo 1.748 €, v Avstriji pa 1.751 €. Za koliko odstotkov je bilo gorivo v Italiji dražje od goriva v naši državi in za koliko odstotkov je bilo naše gorivo cenejše od goriva v Avstriji?

**Naloga 4.56.** *Prenočitvene zmogljivosti na Bledu so 8880 ležišč. Pred prvomajskimi prazniki so se turistični delavci pohvalili, da je zasedenost kapacitet 90 %. Koliko turistov še lahko sprejmejo na nočitev?*

**Naloga 4.57.** *Maksov avto porabi 5.6 l goriva na prevoženih 100 km. Z varčno vožnjo lahko zniža porabo za 15 %. Koliko kilometrov bo tako prevozil s polnim rezervoarjem, ki drži 55 l.*

**Naloga 4.58.** *Kavču, ki je stal 652 €, so ceno znižali za 10 %, na sejmu pa so ponudili na to ceno še 12 % sejemskega popusta. Koliko bomo odšteli za kavč na sejmu? Za koliko odstotkov je cena na sejmu nižja od prvotne cene kavča?*

**Naloga 4.59.** *Servis so najprej podražili za 10 %, potem pa se je ena skodelica okrušila in so ga pocenili za 30 %. Koliko je servis stal na začetku, če ga danes lahko kupimo za 115.5 €?*

**Naloga 4.60.** *Izdelek je imel napako, zato so ga pocenili za 20 %. Ko so napako skoraj v celoti odpravili, so ga podražili za 20 %. Kolikšna je bila začetna cena izdelka, če po popravilu stane 192 €?*

**Naloga 4.61.** *Koliko vode moramo priliti 3 kg 45 % raztopine, da bomo koncentracijo znižali na 20 %?*

**Naloga 4.62.** *Kolikšno koncentracijo raztopine dobimo, če zmešamo 2 kg 60 % raztopine in 3 kg 40 % raztopine?*

**Naloga 4.63.** *Koliko kg 12 % raztopine moramo priliti k 30 kg 24 % raztopine, da bomo dobili raztopino z 20 % koncentracijo?*

## Poglavje 5

# Realna števila

### 5.1 Realna števila

Med poljubnima dvema racionalnima številoma  $\frac{x}{y}, \frac{z}{w} \in \mathbb{Q}$  je vsaj še eno racionalno število – aritmetična sredina teh dveh števil  $\frac{1}{2} \left( \frac{x}{y} + \frac{z}{w} \right)$ .

Med poljubnima racionalnima številoma je neskončno mnogo racionalnih števil in pravimo, da je množica  $\mathbb{Q}$  **povsod gosta**.

Množici  $\mathbb{Q}$  in  $\mathbb{Z}$  imata enako moč – sta števno neskončni ( $m(\mathbb{Q}) = m(\mathbb{Z}) = \aleph_0$ ).

**Iracionalna števila**  $\mathbb{I}$  so vsi kvadratni koreni števil, ki niso popolni kvadrati, tretji koreni, ki niso popolni kubi, ..., število  $\pi$ , Eulerjevo število  $e$  ...

Množici racionalnih in iracionalnih števil sta disjunktni:  $\mathbb{Q} \cap \mathbb{I} = \emptyset$ .


**Realna števila** so množica števil, ki jo dobimo kot unijo racionalnih in iracionalnih števil:  $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$ .

Množica realnih števil je močnejša od množice racionalnih števil. Pravimo, da je (neštevno) neskončna.

Množico realnih števil lahko, glede na predznak števil, razdelimo na tri množice:

- množico negativnih realnih števil  $\mathbb{R}^-$ ,
- množico z elementom nič:  $\{0\}$  in
- množico pozitivnih realnih števil:  $\mathbb{R}^+$ .

$$\mathbb{R} = \mathbb{R}^- \cup \{0\} \cup \mathbb{R}^+$$



Vsaki točki na številski premici ustreza natanko eno realno število in obratno, vsakemu realnemu številu ustreza natanko ena točka na številski premici.

Številsko premico, ki upodablja realna števila, imenujemo tudi **realna os**.

Z relacijo *biti manjši ali enak* je množica  $\mathbb{R}$  **linearno urejena**, to pomeni, da veljajo:

- **refleksivnost**:  $\forall x \in \mathbb{R} : x \leq x$ ;
- **antisimetričnost**:  $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y \wedge y \leq x \Rightarrow x = y$ ;
- **tranzitivnost**:  $\forall x, y, z \in \mathbb{R} : x \leq y \wedge y \leq z \Rightarrow x \leq z$ ;
- **stroga sovisnost**:  $\forall x, y \in \mathbb{R} : x \leq y \vee y \leq x$ .

Za realcijo urejenosti na množici  $\mathbb{R}$  veljajo še naslednje lastnosti:

- **monotonost vsote:**  $x < y \Rightarrow x + z < y + z$  oziroma  $x \leq y \Rightarrow x + z \leq y + z$ ;
- $x < y \wedge z > 0 \Rightarrow xz < yz$  in  $x \leq y \wedge z > 0 \Rightarrow xz \leq yz$ ;
- $x < y \wedge z < 0 \Rightarrow xz > yz$  in  $x \leq y \wedge z < 0 \Rightarrow xz \geq yz$ .



## 5.2 Kvadratni koren

**Kvadratni koren**  $\sqrt{a}$  realnega števila  $a \geq 0$  je tisto nenegativno realno število  $x$ , katerega kvadrat je enak  $a$ .

$$\sqrt{a} = x \Leftrightarrow a = x^2; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Število  $a$  imenujemo **korenjenec**, simbol  $\sqrt{\phantom{x}}$  pa **korenski znak**.

### Pravila za računanje s kvadratnimi koreni

- $(\sqrt{a})^2 = a; \quad a \geq 0$
- $\sqrt{a^2} = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$
- $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}; \quad a, b \geq 0$
- $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}; \quad a \geq 0, b > 0$

**Delno korenjenje** poteka tako, da korenjenec zapišemo kot produkt dveh ali več faktorjev, od katerih je vsaj en popoln kvadrat (ga lahko korenimo).

Nato koren zapišemo kot produkt korenov in korenimo kar lahko.

$$\sqrt{a^2 b} = \sqrt{a^2} \sqrt{b} = a \sqrt{b}$$

**Racionalizacija imenovalca** pomeni, da ulomek zapišemo z enakovrednim ulomkom, ki v imenovalcu nima korena. To naredimo z razširjanjem ulomka.

Izraze s kvadratnimi koreni poenostavimo tako, da uporabimo že znane obrazce, delno korenimo in racionaliziramo imenovalce.

**Naloga 5.1.** *Izračunajte.*

- $\sqrt{49 \cdot 64}$
- $\sqrt{4 \cdot 324}$
- $\sqrt{361 \cdot 16}$
- $\sqrt{-16 \cdot 25}$
- $\sqrt{3 \cdot 12}$
- $\sqrt{\frac{225}{289}}$
- $\sqrt{\frac{169}{256}}$
- $\sqrt{\frac{49}{121}}$
- $\sqrt{\frac{18}{32}}$

**Naloga 5.2.** *Izračunajte.*

- $\sqrt{\sqrt{16}}$
- $\sqrt{\sqrt{81}}$
- $\sqrt{\sqrt{256}}$
- $\sqrt{\sqrt{1}}$
- $\sqrt{\sqrt{\sqrt{256}}}$

**Naloga 5.3.** *Izračunajte.*

- $\sqrt{x^4 y^8}$
- $\sqrt{e^{10} f^{26}}$
- $\sqrt{a^{20} b^4}$
- $\sqrt{(-x)^{20} y^4}$
- $\sqrt{3a^6 + a^6}$

**Naloga 5.4.** *Izračunajte.*

- $\sqrt{16 + 36 + 12}$
- $\sqrt{121} + \sqrt{81}$
- $\sqrt{10 + 21 + 69}$
- $\sqrt{10 + 11 - 21}$
- $\sqrt{9 + 4 - 4}$
- $\sqrt{3 \cdot 4 + 2 \cdot 2}$
- $\sqrt{5 \cdot 7 + 1}$
- $\sqrt{8 \cdot 7 - 5 \cdot 4}$
- $\sqrt{10 \cdot 8 - 4 \cdot 4}$
- $\sqrt{11 \cdot 5 + 2 \cdot 7 + 3 \cdot 4}$

**Naloga 5.5.** *Izračunajte.*

- $\sqrt{20}$
- $\sqrt{98}$
- $\sqrt{300}$
- $\sqrt{125}$
- $\sqrt{x^3}$
- $\sqrt{x^4 y^5 z^6}$
- $\sqrt{128 a^{13} b^9}$
- $\sqrt{100 x^2 y^5 + 62 x^2 y^5}; \quad x, y \geq 0$
- $\sqrt{8 a^6 b^5 - 12 a^4 b^6}; \quad a, b \geq 0$

**Naloga 5.6.** *Izračunajte.*

- $\sqrt{44} + \sqrt{99}$
- $\sqrt{192} + \sqrt{147}$
- $\sqrt{180} - \sqrt{245} + 2\sqrt{500}$
- $\sqrt{243 a^3 b} + 2a\sqrt{48ab} - \sqrt{363 a^2} \cdot \sqrt{ab}; \quad a, b \geq 0$
- $\sqrt{3a^6 + a^6}$

**Naloga 5.7.** *Racionalizirajte imenovalce.*

- $\frac{2}{\sqrt{3}}$
- $\frac{2 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$
- $\frac{5\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$
- $\frac{1 - \sqrt{2}}{1 + \sqrt{5}}$
- $\frac{2 + \sqrt{5}}{2 - \sqrt{3}}$
- $\frac{2 - \sqrt{3}}{3 + \sqrt{2}}$

**Naloga 5.8.** *Izračunajte.*

- $\frac{2}{\sqrt{3}} + \frac{3}{\sqrt{2}}$
- $\frac{1 - \sqrt{2}}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{5}}$
- $(1 + \sqrt{5})^2$
- $(3 - \sqrt{2})^2$
- $(2 - \sqrt{3})^3$

**Naloga 5.9.** *Izračunajte.*

- $(2 - \sqrt{5})^3 - (1 + 2\sqrt{5})^2$
- $(2 - \sqrt{3})^2 + (2 + \sqrt{3})^3$
- $(1 + \sqrt{5}) \sqrt{6 - 2\sqrt{5}}$
- $(3 - \sqrt{5}) \sqrt{14 + 6\sqrt{5}}$
- $(\sqrt{3} + \sqrt{5}) \sqrt{8 - 2\sqrt{15}}$

## 5.3 Kubični koren

**Kubični koren**  $\sqrt[3]{a}$  realnega števila  $a$  je tisto realno število  $x$ , katerega kub je enak  $a$ .

$$\sqrt[3]{a} = x \Leftrightarrow a = x^3; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Število  $a$  imenujemo **korenjenec**, simbol  $\sqrt{\phantom{x}}$  **korenski znak**, število 3 pa **korenski eksponent**.

**Pravila za računanje s kubičnimi koreni**

- $(\sqrt[3]{a})^3 = a$
- $\sqrt[3]{a^3} = a$
- $\sqrt[3]{a \cdot b} = \sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{b}$
- $\sqrt[3]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[3]{a}}{\sqrt[3]{b}}; \quad b \neq 0$

**Naloga 5.10.** *Izračunajte.*

- $\sqrt[3]{-1}$
- $\sqrt[3]{216}$
- $\sqrt[3]{8}$
- $\sqrt[3]{\frac{64}{125}}$
- $\sqrt[3]{-\frac{27}{343}}$
- $\sqrt[3]{1\frac{488}{512}}$

**Naloga 5.11.** *Izračunajte.*

- $\sqrt{\sqrt{256}} - \frac{3 - \sqrt{2}}{\sqrt{2} - 1} + \sqrt[3]{-8} + (2 - \sqrt{2})^2$
- $\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3}} - \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1} + \sqrt{0.16} + \sqrt{0.64} - \sqrt[3]{-27} + \sqrt{48} - \sqrt{27}$
- $(1 - \sqrt{5})^2 - (1 + \sqrt{5})^2 + \frac{\sqrt{5} - 2}{\sqrt{5} + 2} - \sqrt{125} + \sqrt{245}$

## 5.4 Interval

**Interval** je množica vseh realnih števil, ki ležijo med dvema danima številoma  $a$  in  $b$ , kjer je  $a < b$ .

Števili  $a$  in  $b$  imenujemo **krajišči intervala**.

### Vključenost krajišč

- Simbola "[ " in "]" označujeta krajišče, ki spada k intervalu.
- Simbola "(" in ")" označujeta krajišče, ki ne spada k intervalu.

Pri zapisu intervalov moramo biti pozorni na zapis vrstnega reda števil, ki določata krajišči.

$$[a, b] \neq [b, a]$$

### 5.4.1 Vrste intervalov

#### Zaprti interval

Vsebuje vsa realna števila med  $a$  in  $b$ , vključno s krajiščema  $a$  in  $b$ .

$$[a, b] = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x \leq b\}$$



#### Odperti interval

Vsebuje vsa realna števila med  $a$  in  $b$ , vendar ne vsebuje krajišč  $a$  in  $b$ .

$$(a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$$



#### Polodprti/polzaprti interval

- Vsebuje vsa realna števila med  $a$  in  $b$ , vključno s krajiščem  $a$ , vendar ne vsebuje krajišča  $b$ .

$$[a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a \leq x < b\}$$



- Vsebuje vsa realna števila med  $a$  in  $b$ , vključno s krajiščem  $b$ , vendar ne vsebuje krajišča  $a$ .

$$(a, b] = \{x \in \mathbb{R}; a < x \leq b\}$$



**Neomejeni/neskončni intervali**

- $[a, \infty) = \{x \in \mathbb{R}; x \geq a\}$



- $(a, \infty) = \{x \in \mathbb{R}; x > a\}$



- $(-\infty, b] = \{x \in \mathbb{R}; x \leq b\}$



- $(-\infty, b) = \{x \in \mathbb{R}; x < b\}$



- $(-\infty, \infty) = \{x; x \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R}$



**Naloga 5.12.** Zapišite kot interval.

- $\{x \in \mathbb{R}; -2 < x < 2\}$
- $\{x \in \mathbb{R}; 4 \leq x \leq 2\}$
- $\{x \in \mathbb{R}; -14 < x \leq -9\}$

**Naloga 5.13.** Zapišite presek intervalov.

- $[0, 2) \cap (-1, 1]$
- $[-3, 5] \cap (-3, 5)$
- $[2, 5) \cap [5, 7]$
- $[-1, 3) \cap (-4, -1]$
- $[4, 6] \cap [-1, 4]$
- $(-1, 3) \cap [1, 2)$

**Naloga 5.14.** Zapišite unijo intervalov.

- $[0, 2) \cup (-1, 1]$
- $[-3, 5] \cup (-3, 5)$
- $[2, 5) \cup [5, 7]$
- $[-1, 3) \cup (-4, 1]$

**Naloga 5.15.** Zapišite razliko intervalov.

- $[2, 3] \setminus [3, 4)$
- $(1, 3) \setminus (3, 4)$
- $[2, 5) \setminus (-1, 2]$
- $(2, 8) \setminus [5, 6)$

**Naloga 5.16.** Izračunajte.

- $([1, 3) \setminus (1, 4]) \cup (1, 2)$
- $[-2, 4] \setminus ((-1, 2] \cap [0, 3))$
- $((-2, 3] \setminus [-3, 2)) \cap [3, 5)$

## 5.5 Reševanje enačb

**Enačba** je enakost dveh izrazov, pri čemer vsaj v enem nastopa **neznanka**, ki je ponavadi označena s črko  $x$ .

**Rešitev enačbe** je vsaka vrednost neznanke, za katero sta vrednosti leve in desne strani enačbe enaki.

Enačbo rešujemo tako, da jo preoblikujemo v ekvivalentno enačbo, iz katere preberemo rešitve. Ekvivalentno enačbo dobimo, če:

- na obeh straneh enačbe prištejemo isto število ali izraz;
- obe strani enačbe množimo z istim neničelnim številom ali izrazom.

**Linearna enačba** je enačba oblike  $ax + b = 0$ ;  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Rešujemo jo tako, da jo preoblikujemo v ekvivalentno enačbo, ki ima na eni strani samo neznanko.

**Razcepna enačba** je enačba, v kateri nastopajo potence neznanke (na primer  $x^2$ ,  $x^3$ ) in jo je mogoče zapisati kot produkt (linearnih) faktorjev.

Preoblikujemo jo v ekvivalentno enačbo, ki ima vse člene na eni strani neenačaja, na drugi pa 0. Izraz (neničelna stran) razstavimo, kolikor je mogoče, in preberemo rešitve.

**Racionalna enačba** je enačba, v kateri nastopajo neznake (tudi) v imenovalcu, pri tem smo pozorni na obstoj ulomkov. Nato enačbo preoblikujemo v ekvivalentno enačbo.

**Naloga 5.17.** *Rešite enačbe.*

- $3(2a - 1) - 5(a - 2) = 9$
- $2(y - 2) + 3(1 - y) = 7$
- $3(3 - 2(t - 1)) = 3(5 - t)$
- $-(2 - x) + 3(x + 1) = x - 5$

**Naloga 5.18.** *Rešite enačbe.*

- $\frac{1}{5} - \frac{x-1}{2} = \frac{7}{10}$
- $\frac{3}{a-1} + \frac{6}{a+2} = \frac{1}{2}$
- $2\frac{2}{3} - \frac{3t+1}{6} = 0$
- $\left(\frac{2}{b+1}\right)^{-1} + \frac{b-1}{4} = b+3$

**Naloga 5.19.** *Rešite razcepne enačbe.*

- $x^2 - 3x = -2$
- $(x+2)^3 - (x-1)^3 = 8x^2 + x + 2$
- $x^4 = 16x^2$
- $(x^2 - 4x + 5)^2 - (x^2 + 4x + 1)^2 - 78 = 2x^2(x + 30) - 18(x + 1)^3$
- $x^3 - 4x^2 + 4 = x$
- $x^5 = 3x^4 - 2x^3$

**Naloga 5.20.** *Rešite enačbe.*

- $\frac{x-1}{x+2} = \frac{x+1}{x-3}$
- $\frac{1}{a-1} - \frac{3}{a} = \frac{2}{a-1}$
- $\frac{x-3}{x-2} + \frac{x+4}{x+1} = \frac{2x^2}{x^2-x-2}$
- $\frac{1}{3a-1} + \frac{1}{3a+1} = \frac{a-1}{9a^2-1}$

**Naloga 5.21.** *Neznano število smo delili s 4 in dobljenemu količniku prišteli 1. Dobili smo enako, kot če bi istemu številu prišteli 10. Izračunajte neznano število.*

**Naloga 5.22.** *Kvadrat neznanega števila je za 4 manjši od njegovega štirikratnika. Izračunajte neznano število.*

**Naloga 5.23.** *Avtomobil vozi s povprečno hitrostjo  $50 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ , kolesar s povprečno hitrostjo  $20 \frac{\text{km}}{\text{h}}$ . Avtomobil gre iz Lendave v Ormož (približno 50 km), kolesar vozi v obratno smer. Koliko časa pred avtomobilom mora na pot kolesar, da se bosta srečala na polovici poti?*

**Naloga 5.24.** *Vsota števk dvomestnega števila je 3. Če zamenjamo njegovi števki, dobimo za 9 manjše število. Katere število je to?*

**Naloga 5.25.** *Andreja je bila ob rojstvu hčere Eve stara 38 let. Čez koliko let bo Andreja stara trikrat toliko kot Eva?*

**Naloga 5.26.** *Prvi delavec sam pozida steno v 10 urah, drugi v 12 urah, tretji v 8 urah. Delavci skupaj začnejo zidati steno. Po dveh urah tretji delavec odide, pridruži pa se četrti delavec. Skupaj s prvim in drugim delavcem nato končajo steno v eni uri. V kolikšnem času četrti delavec pozida steno?*

## 5.6 Reševanje neenačb

**Neenačba** je neenakost dveh izrazov, pri čemer vsaj v enem nastopa neznanka. Med levo in desno stranjo je postavljen eden od neenačajev:  $<$ ,  $>$ ,  $\leq$  ali  $\geq$ .

Neenačbo rešujemo tako, da jo preoblikujemo v ekvivalentno neenačbo. To dobimo, če:

- prištejemo isto število ali izraz na obeh straneh neenačbe;
- množimo obe strani neenačbe z istim pozitivnim številom ali izrazom;
- množimo obe strani neenačbe z istim negativnim številom ali izrazom in se pri tem neenačaj obrne.

**Linearna neenačba** je oblike  $ax + b < 0$ , ali pa nastopa drug neenačaj:  $>$ ,  $\leq$ ,  $\geq$ .

**Naloga 5.27.** Poiščite vsa realna števila, ki ustrezajo pogoju.

- $3a + 2 < 2a - 1$
- $7t + 8 \geq 8(t - 2)$
- $5x - 2 > 2(x + 1) - 3$
- $x - 1 \leq 2(x - 3) - x$

**Naloga 5.28.** Rešite neenačbe.

- $\frac{x}{2} + \frac{2}{3} < \frac{8}{3}$
- $\frac{4 + 5a}{34} - \frac{4}{51} \geq 2 + \frac{2 - a}{51}$
- $x + \frac{x - 2}{3} < \frac{x - 3}{4} + \frac{x - 1}{2}$
- $\frac{2x - 2}{15} + \frac{x}{3} < \frac{4x - 2}{5} + \frac{2}{10}$

**Naloga 5.29.** Rešite sisteme neenačb.

- $-2 < y - 2 < 1$
- $-4 \leq 5a - 9 \leq 1$
- $(x + 1 > 3) \wedge (2x \leq 3(x - 1))$
- $(3x - 5 < x + 3) \vee (2x \geq x + 6)$



## 5.7 Reševanje sistemov enačb

### 5.7.1 Sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama

Sistem dveh linearnih enačb z dvema neznankama ali sistem  $2 \times 2$  je v splošnem oblike:

$$a_1x + b_1y = c_1$$

$$a_2x + b_2y = c_2$$

$x$  in  $y$  sta **neznanki**,  $a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}$  so **koefficienti**.

**Rešitev sistema** je **urejen par** števil  $(x, y)$ , ki zadoščajo obema enačbama.

Sistem  $2 \times 2$  ima lahko eno rešitev, nima rešitve ali ima neskončno rešitev.

Sistem lahko rešujemo s primerjalnim načinom, zamenjalnim načinom ali z metodo nasprotnih koefficientov.

#### Primerjalni način

Iz obeh enačb izrazimo isto neznanko, nato njuni vrednosti enačimo.

#### Zamenjalni način

Iz ene enačbe izrazimo eno izmed neznank (preverimo, če je kateri od koefficientov pri neznankah enak 1 – takšno neznanko hitro izrazimo) in izraženo vrednost vstavimo v drugo enačbo.

#### Metoda nasprotnih koefficientov

Eno ali obe enačbi pomnožimo s takimi števili, da bosta pri eni izmed neznank koefficienta nasprotni števili, nato enačbi seštejemo. Ostane ena enačba z eno neznanko.

**Naloga 5.30.** Rešite sisteme enačb.

- $2x + y = 9$
- $x - 3y = 8$
- $x - y = 5$
- $y - x = 3$
- $2x - 3y = 5$
- $-4x + 6y = -10$
- $3x - y = 5$
- $6x - 10 = 2y$

**Naloga 5.31.** Z zamenjalnim načinom rešite sisteme enačb.

- $2x + 5y = -2$
- $x - 3y = -1$
- $\frac{x}{2} - y = 3$
- $y + x = -2$
- $3x - 2y = 1$
- $x + y = \frac{7}{6}$
- $0.5x + 0.2y = 2$
- $\frac{3}{2}x - \frac{2}{5}y = 1$

**Naloga 5.32.** Z metodo nasprotnih koeficientov rešite sisteme enačb.

- $2x + 3y = 3$
- $-4x + 3y = 0$
- $4x - 3y = -2$
- $-8x + y = -1$
- $3x - 2y = 2$
- $2x - 3y = -2$
- $x - y = -5$
- $0.6x + 0.4y = 7$

**Naloga 5.33.** V bloku je 26 stanovanj. Vsako stanovanje ima 2 ali 3 sobe. Koliko je posameznih vrst stanovanj, če je v bloku 61 sob?

**Naloga 5.34.** Kmet ima v ogradi 20 živali. Če so v ogradi le race in koze, koliko je posameznih živali, če smo našteali 50 nog?

**Naloga 5.35.** Razredničarka na sladoled pelje svojih 30 dijakov. Naročili so lahko 2 ali 3 kepice sladoleda. Koliko dijakov je naročilo dve in koliko tri kepice sladoleda, če razredničarka ni jedla sladoleda, plačala pa je 79 kepic sladoleda?

**Naloga 5.36.** Babica ima dvakrat toliko vnukinj kot vnukov. Vnukinjam je podarila po tri bombone, vnukom pa po štiri bombone. Koliko vnukinj in vnukov ima, če je podarila 70 bombonov?

### 5.7.2 Sistem treh linearnih enačb s tremi neznankami

Sistem treh linearnih enačb z tremi neznankami ali sistem  $3 \times 3$  je v splošnem oblike:

$$a_1x + b_1y + c_1z = d_1$$

$$a_2x + b_2y + c_2z = d_2$$

$$a_3x + b_3y + c_3z = d_3$$

$x, y$  in  $z$  so **neznanke**,  $a_i, b_i, c_i \in \mathbb{R}$  so **koeficienti**.

**Rešitev sistema** je **urejena trojka** števil  $(x, y, z)$ , ki zadoščajo vsem trem enačbam.

Sistem  $3 \times 3$  rečujemo z istimi postopki kot sisteme  $2 \times 2$ , le da postopek ponovimo večkrat.

**Naloga 5.37.** Z metodo nasprotnih koeficientov rešite sisteme enačb.

$$2x + y - 3z = 5$$

- $x + 2y + 2z = 1$
- $-x + y + z = -4$
- $x - 2y + 6z = 5$
- $-x + 3z = -1$
- $4y - 3z = -3$
- $x + y - z = 0$
- $x - y - 3z = 2$
- $2x + y - 3z = 1$
- $2x - 4y + z = 3$
- $4x - y + 2z = 4$
- $-8x + 2y - 4z = 7$

## 5.8 Obravnava enačb in neenačb

Kadar v enačbi poleg neznake  $x$  nastopajo tudi druge črke, na primer  $a, b, c, k, l, \dots$ , le-te označujejo števila, ki imajo poljubno realno vrednost. Imenujemo jih **parametri**.

Vrednost parametrov vpliva na rešitev enačbe, zato moramo enačbo reševati glede na vrednosti parametrov. Temu postopku rečemo **obrnava enačbe**.

**Naloga 5.38.** *Obravnavajte enačbe.*

- $2(ax - 3) + 3 = ax$
- $-4x - b(x - 2)^2 = 3 - bx^2 - 7b$
- $3(a - 2)(x - 2) = a^2(x - 1) - 4x + 7$
- $(b - 3)^2x - 3 = 4x - 3b$

**Naloga 5.39.** *Obravnavajte neenačbe.*

- $a(x - 2) \leq 4$
- $mx + 4 > m^2 - 2x$
- $a(a - 3x + 1) \geq a(x - 4) + a^2x$
- $(k - 1)^2x \leq kx + 2(k + 1) + 5x$

## 5.9 Absolutna vrednost

**Absolutna vrednost**  $|x|$  števila  $x$  geometrijsko predstavlja oddaljenost točke, ki predstavlja število  $x$ , od izhodišča na številski premici.

$$|x| = \begin{cases} x & x \geq 0; \\ -x & x < 0. \end{cases}$$

### Lastnosti absolutne vrednosti

- $|x| \geq 0$
- $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$
- $|-x| = |x|$
- $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$
- $|x + y| \leq |x| + |y|$  – **trikotniška neenakost**

Z absolutno vrednostjo izračunamo tudi razdaljo med  $x$  in  $y$  kot  $|x - y|$  ali  $|y - x|$ .

**Naloga 5.40.** Izračunajte.

- $|13|$
- $|-5|$
- $|-2| \cdot |4|$
- $|-3| - |5|$
- $|-1| \cdot |-6|$
- $-|3| + |-9|$

**Naloga 5.41.** Izračunajte.

- $\left|\frac{1}{5} - 5\right|$
- $\left|-\frac{3}{4} - \frac{2}{3}\right|$
- $|\sqrt{5} - 3|$
- $|-1 + \sqrt{2}|$
- $|1 - |\sqrt{6} - 3||$
- $|\sqrt{2} - 2| - |1 - \sqrt{2}|$

**Naloga 5.42.** Odpravite absolutno vrednost.

- $|a - 2|$
- $|x + 1|$
- $|4 - b|$
- $|2 + e|$
- $-|1 - y|$
- $-|3 + 6y|$

**Naloga 5.43.** Poenostavite izraze.

- $x - 2 + |x|$
- $3 \cdot |x - 2| + x - 1$
- $|a - 2| + |a|$
- $3 \cdot |b - 2| + |b - 1|$
- $||x - 2| + x|$
- $3 \cdot ||y - 2| + |y - 1||$

**Naloga 5.44.** Rešite enačbe.

- $|x - 2| = 3$
- $|3 - x| = 5$
- $1 + |x - 7| = -6$
- $|a + 3| = 7 - |a + 2|$
- $|b - 1| = 2 + |b + 3|$
- $|x - 1| + |x + 2| = 3$

**Naloga 5.45.** Rešite neenačbe.

- $|x - 2| \geq 3$
- $|3 - x| < 5$
- $1 + |x - 7| \leq -6$
- $|a + 3| < 7 - |a + 2|$
- $|b - 1| \geq 2 + |b + 3|$
- $||x - 3| + 2| < 1$
- $|x - |x - 3|| \geq 1$
- $|x - |2x - 1|| \geq 2$

## 5.10 Zaokroževanje, približki, napake

### Pravila zaokroževanja

- Zadnjo števk pustimo enako, če je prva izbrisana številka manjša od 5;
- zadnjo števk povečamo za 1, če je prva izbrisana številka 5 ali več.

Zaokroževanje na  $n$  **decimalnih mest** pomeni: opustiti vse decimalke od  $n$ -tega mesta dalje in zaokrožiti. Primer:  $\sqrt{2} \doteq 1.41$  (na 2 decimalni mesti).

Zaokroževanje na  $n$  **mest** pomeni, da ima število v svojem zapisu  $n$  števk, pri pogoju, da ne štejemo ničel na začetku in na koncu. Primer:  $\sqrt{2} \doteq 1.41$  (na 3 mesta).

Pri zapisu uporabimo  $\doteq$ , kar označuje, da smo rezultat zapisali približno in ne natančno.

### Absolutna in relativna napaka

Naj bo  $x$  točna vrednost in  $X$  njen **približek**.

**Absolutna napaka** približka je  $|X - x|$ ; **relativna napaka** je  $\frac{|X - x|}{x}$ .

Absolutno napako zapišemo tudi  $X = x \pm \epsilon$ , kar pomeni, da se absolutna napaka približka  $X$  razlikuje od točne vrednosti  $x$  kvečjemu za  $\epsilon$ .

**Naloga 5.46.** Na kartonski škatli je oznaka velikosti  $50 \pm 3$  cm. Koliko je največja in koliko najmanjša velikost škatle, ki ustreza tej oznaki? Ali je lahko relativna napaka velikosti 8 %?

**Naloga 5.47.** Pri 200 m vrvi smemo narediti 7 % napako. Ali je lahko takšna vrv dolga 230 m? Kako dolgi bosta najkrajša in najdaljša vrv, ki še ustrezata?

**Naloga 5.48.** V EU morajo biti banane za prodajo dolge najmanj 14 cm. V trgovino dobijo novo pošiljko banan, ki jih izmerijo, da so dolžine 13.7 cm. Njihov meter ima 5 % odstopanje. Ali lahko prodajajo takšne banane?



## Poglavje 6


# Pravokotni koordinatni sistem

### 6.1 Pravokotni koordinatni sistem

**Pravokotni koordinatni sistem v ravnini** oziroma **kartezični ravninski koordinatni sistem** določa par pravokotnih številskih premic (koordinatni osi), ki se sekata v **koordinatnem izhodišču** ( $O$ ).

Koordinatni osi imenujemo:

- os  $x$  ali **abscisna os** in
- os  $y$  ali **ordinatna os**.



#### Lega točke v ravnini


Poljubni točki  $T$  v ravnini s pravokotnim koordinatnim sistemom lahko enolično določimo **koordinate točke**:  $T(x_0, y_0)$ .

To so števila, ki nam povedo, kje ležijo projekcije točke  $T$  na koordinatnih oseh.

Koordinate točke imenujemo:

- prva koordinata  $x_0$  je **abscisa** točke  $T$  in
- druga koordinata  $y_0$  je **ordinata** točke  $T$ .

Vsakemu urejenemu paru števil  $(x_0, y_0)$  ustreza natančno ena točka  $T(x_0, y_0)$  v ravnini, opremljeni s koordinatnim sistemom.



## Množice v pravokotnem koordinatnem sistemu

Vsaka premica v ravnini razdeli ravnino na dve **polravnini**.

Koordinatni osi ravnino  $\mathbb{R} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^2$  razdelita na štiri **kvadrante**.

- *I.* kvadrant:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x > 0 \wedge y > 0\} = (0, \infty) \times (0, \infty)$$

- *II.* kvadrant:


$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x < 0 \wedge y > 0\} = (-\infty, 0) \times (0, \infty)$$

- *III.* kvadrant:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x < 0 \wedge y < 0\} = (-\infty, 0) \times (-\infty, 0)$$

- *IV.* kvadrant:

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x > 0 \wedge y < 0\} = (0, \infty) \times (-\infty, 0)$$



Na abscisni osi ležijo točke, ki imajo ordinato enako nič – so oblike  $T(x, 0)$ ;  $x \in \mathbb{R}$ .


$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = 0\} = \mathbb{R} \times \{0\}$$

Na ordinatni osi ležijo točke, ki imajo absciso enako nič – so oblike  $T(0, y)$ ;  $y \in \mathbb{R}$ .

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x = 0\} = \{0\} \times \mathbb{R}$$


Množico točk  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = x\}$  imenujemo **simetrala lihih kvadrantov**.

Množico točk  $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2; y = -x\}$  imenujemo **simetrala sodih kvadrantov**.





**Naloga 6.1.** V koordinatnem sistemu je narisanih 22 točk.








- Zapišite koordinate vseh točk, ki ležijo v II. kvadrantu.
- Zapišite koordinate vseh točk, ki ležijo v III. kvadrantu.
- V koordinatni sistem narišite še točke  $X(2, -1)$ ,  $Y(-3, -4)$ ,  $W(5, -3)$ .
- Poimenujte točke.  
 $_{(2, -4)}$ ,  $_{(-6, 2)}$ ,  $_{(1, 5)}$ ,  $_{(-2, -5)}$ ,  
 $_{(-4, -2)}$ ,  $_{(0, 3)}$

**Naloga 6.2.** Narišite množico točk.

- |                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| • $\{T(x, y); x \geq -1\}$                         | • $\{T(x, y);  x  < 3\}$                       |
| • $\{T(x, y); y \leq 3\}$                          | • $\{T(x, y); x \geq 1 \wedge  y  < 1\}$       |
| • $\{T(x, y); x \leq 4 \wedge y < -1\}$            | • $\{T(x, y);  x - 3  < 1 \wedge y \geq 1\}$   |
| • $\{T(x, y); x \geq -2 \wedge y < 1\}$            | • $\{T(x, y);  x  < 2 \wedge  y + 3  \leq 1\}$ |
| • $\{T(x, y); -2 < x \leq 4 \wedge -3 < y < 1\}$   | • $\{T(x, y); x = y\}$                         |
| • $\{T(x, y); 0 \leq x < 4 \wedge -3 \leq y < 3\}$ | • $\{T(x, y); x \geq y\}$                      |
| • $\{T(x, y); x < 4 \wedge y < -1\}$               | • $\{T(x, y); xy \geq 0\}$                     |

**Naloga 6.3.** Zapišite množico točk, ki je upodobljena v koordinatnem sistemu.





**Naloga 6.4.** V koordinatnem sistemu narišite točke  $A(-2, 3)$ ,  $B(0, 4)$ ,  $C(0.5, -1)$  in  $D(-3, -1)$ .

- Točke  $A$ ,  $B$ ,  $C$  in  $D$  prezrcalite čez abscisno os in zapišite koordinate točk  $A_1$ ,  $B_1$ ,  $C_1$  in  $D_1$ .
- Točke  $A$ ,  $B$ ,  $C$  in  $D$  prezrcalite čez ordinatno os in zapišite koordinate točk  $A_2$ ,  $B_2$ ,  $C_2$  in  $D_2$ .
- Točke  $A$ ,  $B$ ,  $C$  in  $D$  prezrcalite čez koordinatno izhodišče in zapišite koordinate točk  $A_3$ ,  $B_3$ ,  $C_3$  in  $D_3$ .

**Naloga 6.5.** V koordinatni sistem narišite točke  $(x, y)$  kartezičnega produkta.

- $[-2, 3] \times [-5, -1]$
- $(-1, 2) \times [2, 3]$
- $\{2\} \times (3, 5]$
- $[-2, 3] \times \{3, 4\}$
- $\{1, 2, 3\} \times \{-1, 1\}$
- $(0, \infty) \times (1, 2)$
- $[-1, 3] \times (-\infty, 3]$
- $(-1, 3] \times \{2\}$

## 6.2 Razdalja med točkama in razpolovišče daljice


### Razdalja med točkama

Razdalja  $d(A, B)$  med dvema točkama  $A(x_a, y_a)$  in  $B(x_b, y_b)$  v ravnini je

$$d(A, B) = \sqrt{(x_b - x_a)^2 + (y_b - y_a)^2}.$$

### Lastnosti razdalje


- $d(A, B) \geq 0$
- $d(A, B) = 0 \Leftrightarrow A = B$
- $d(A, B) = d(B, A)$
- $d(A, C) \leq d(A, B) + d(B, C)$



### Razpolovišče daljice

Razpolovišče  $S$  daljice  $AB$  s krajiščema  $A(x_a, y_a)$  in  $B(x_b, y_b)$  v ravnini je

$$S\left(\frac{x_a + x_b}{2}, \frac{y_a + y_b}{2}\right).$$



**Naloga 6.6.** Izračunajte razdaljo med točkama.

- $A(2, -1)$  in  $B(4, 2)$
- $C(-3, -4)$  in  $D(3, -3)$
- $E(\sqrt{3}, -7)$  in  $F(0, -3)$
- $G(-\frac{3}{4}, \frac{1}{2})$  in  $H(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2})$

**Naloga 6.7.** Izračunajte koordinati razpolovišča  $S$  daljice  $XY$ .

- $X(3, -2)$  in  $Y(5, 4)$
- $X(-3, 4)$  in  $Y(-2, -6)$
- $X(\frac{2}{3}, -\frac{1}{2})$  in  $Y(-\frac{8}{3}, 1)$
- $X(2\sqrt{3}, -8)$  in  $Y(8\sqrt{3}, 2)$
- $X(5 + \sqrt{7}, -4)$  in  $Y(3 - \sqrt{7}, 0)$

**Naloga 6.8.** Ali je trikotnik  $\triangle ABC$ , kjer je  $A(-2, -3)$ ,  $B(8, 1)$  in  $C(1, 4)$ , enakostraničen? Izračunajte njegov obseg.

**Naloga 6.9.** Izračunajte obseg kvadrata  $\square ABCD$ , kjer je  $A(4, -4)$  in  $C(10, -2)$ .

**Naloga 6.10.** Izračunajte višino na osnovnico  $c$  v enakokrakem trikotnik  $\triangle ABC$ , kjer je  $A(-2, -7)$ ,  $B(4, -3)$  in  $C(3, -8)$ .

**Naloga 6.11.** *Dani sta točki  $M(-6, 2)$  in  $N(x, 11)$ . Izračunajte absciso  $x$  točke tako, da bo dolžina daljice  $MN$  enaka  $9\sqrt{2}$ .*

**Naloga 6.12.** *Izračunajte koordinati točke  $X$  in  $Y$  na abscisni in ordinatni osi, ki sta enako oddaljeni od točk  $G(-3, -6)$  in  $H(9, 6)$ .*


**Naloga 6.13.** *Določite točko  $U$ , ki leži na simetrali lihih kvadrantov in je enako oddaljena od točk  $P(-3, -5)$  in  $R(3, -7)$ .*

### 6.3 Ploščina trikotnika

Ploščina trikotnika  $\triangle ABC$  z oglišči  $A(x_a, y_a)$ ,  $B(x_b, y_b)$  in  $C(x_c, y_c)$  je

$$S = \frac{1}{2} \cdot \text{orient} \cdot \begin{vmatrix} x_b - x_a & y_b - y_a \\ x_c - x_a & y_c - y_a \end{vmatrix} \\ = \frac{\text{orient}}{2} [(x_b - x_a)(y_c - y_a) - (y_b - y_a)(x_c - x_a)],$$

kjer je  $\text{orient} = \begin{cases} 1; & \triangle ABC \text{ pozitivno orientiran} \\ -1; & \triangle ABC \text{ negativno orientiran} \end{cases}$ .



**Naloga 6.14.** Narišite trikotnik  $\triangle ABC$  in izračunajte njegovo ploščino.

- $A(-4, -2)$ ,  $B(5, 1)$  in  $C(-2, 5)$
- $A(2, 1)$ ,  $B(-5, 1)$  in  $C(2, 6)$

**Naloga 6.15.** Ali so točke kolinearne?

- $P(-4, -5)$ ,  $Q(4, -1)$  in  $R(10, 2)$
- $X(1, -7)$ ,  $Y(-2, 2)$  in  $Z(3, 2)$

**Naloga 6.16.** Določite  $x$  tako, da bo trikotnik  $\triangle ABC$ , z oglišči v  $A(-2, -3)$ ,  $B(5, 3)$  in  $C(x, -1)$ , negativno orientiran in bo imel ploščino 17.

**Naloga 6.17.** Določite  $p$  tako, da bo imel trikotnik  $\triangle ABC$ , z oglišči v  $A(2, 3)$ ,  $B(p, -3)$  in  $C(-1, 6)$ , ploščino 18.

**Naloga 6.18.** Dani sta točki  $A(2, -4)$  in  $B(8, 3)$ . Določite koordinati točke  $C$ , ki leži na simetrali lihih kvadrantov, da bo trikotnik  $\triangle ABC$  pozitivno orientiran in bo imel ploščino 17.



## Poglavje 7

# Funkcija

### 7.1 Preslikava in funkcija

#### Preslikava

Naj bosta  $\mathcal{X}$  in  $\mathcal{Y}$  neprazni množici.

**Preslikava**  $f$  sestoji iz:

- množice  $\mathcal{X}$ , ki ji pravimo **domena**,
- množice  $\mathcal{Y}$ , ki ji pravimo **kodomena** in
- **prirejanja**, ki vsakemu elementu  $x$  domene priredi natanko en element  $y$  kodomene.

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

$$f : x \mapsto y$$

Elemente  $x$  kodomene  $\mathcal{X}$  imenujemo **originali** preslikave.

Če elementu  $x$  priredimo element  $y$  iz kodomene, potem imenujemo  $y$  **slika** elementa  $x$ .

Preslikavo lahko podamo s predpisom, puščičnim diagramom, besednim opisom ...

#### Funkcija

Naj bosta  $\mathcal{X}$  in  $\mathcal{Y}$  neprazni številski množici.

**Funkcija**  $f$  je preslikava med številskima množicama  $\mathcal{X}$  in  $\mathcal{Y}$ :

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

Število  $y$  je **funkcijska vrednost** števila  $x$ , če se število  $x$  preslika v število  $y$ .

$$f(x) = y$$

$x$  je neodvisna spremenljivka,  $f(x)$  je od  $x$  odvisna spremenljivka.

V nekaterih primerih za opis funkcije uporabimo poseben izraz:

- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$  – realna funkcija realne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{N}$  – realna funkcija naravne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{N}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$  – naravna funkcija realne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{N}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{N}$  – naravna funkcija naravne spremenljivke.

## 7.2 Definijsko območje in zaloga vrednosti

### Definijsko območje

**Definijsko območje** preslikave ali funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je množica vseh originalov, ki jih v danem primeru opazujemo. Oznaka:  $D_f$ .

Za definijsko območje navadno vzamemo največjo možno množico, za katero je predpis funkcije veljaven/definiran.

### Zaloga vrednosti

**Zaloga vrednosti** preslikave ali funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je množica vseh slik oziroma funkcijskih vrednosti. Oznaka:  $Z_f$ .

Zaloga vrednosti  $Z_f$  je podmnožica kodomene  $\mathcal{Y}$ :  $Z_f \subseteq \mathcal{Y}$ .

**Naloga 7.1.** Funkcijo  $f : A \rightarrow B$  predstavite s tabelo. Izračunajte, kam posamezna funkcija preslika  $x = 1$ .

- $A = \{-2, -1, 0, 1, 2, 3\}$ ,  $B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $f(x) = |x| + 1$
- $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ,  $B = \mathbb{N}$ ,  $f(x) = 2x + 1$
- $A = B = \{\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 1, 2, 3\}$ ,  $f(x) = \frac{1}{x}$

**Naloga 7.2.** Tabelirajte funkcijo  $g(x) = 2x + |x|$  od  $-3$  do  $3$  s korakom 1.

**Naloga 7.3.** Zapišite definijska območja funkcij.

- |                                 |                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------|
| • $f(x) = \frac{-7}{x+1}$       | • $j(x) = x^3 - \frac{2}{3}$            |
| • $g(x) = \frac{1}{(x+2)(x+6)}$ | • $k(x) = \sqrt{x^2 + 7}$               |
| • $h(x) = \frac{3x^2 + 1}{5}$   | • $l(x) = \frac{3}{x}$                  |
| • $i(x) = \sqrt{x-2}$           | • $m(x) = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 5x - 6}$ |



## 7.3 Ničla in začetna vrednost funkcije

### Ničla funkcije

**Ničla** funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je tista vrednost  $x_0 \in \mathcal{X}$  neodvisne spremenljivke, pri kateri je vrednost funkcije  $f$  enaka 0:  $f(x_0) = 0$ .

Ničle funkcije  $f$  poiščemo tako, da rešimo enačbo  $f(x) = 0$ .

Ničle so le tiste izmed vrednosti, ki ležijo v definicijskem območju  $D_f$  funkcije  $f$ .

### Začetna vrednost

**Začetna vrednost** funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je funkcijska vrednost pri  $x = 0$ , to je  $f(0)$ .

Začetna vrednost obstaja le, če je 0 v definicijskem območju funkcije  $f$ :  $0 \in D_f$ .

**Naloga 7.4.** *Izračunajte ničle funkcij.*

- $f(x) = \frac{4}{5} - 6x$
- $g(x) = x^2 - 7x + 12$
- $h(x) = \frac{3x+6}{5}$
- $i(x) = x^2 - 9$
- $j(x) = x^2 + 1$
- $k(x) = x^2 - 3x^2 - 4x + 12$
- $l(x) = \sqrt{x+7}$
- $m(x) = \frac{3}{x}$

**Naloga 7.5.** *Izračunajte začetne vrednosti funkcij.*

- $f(x) = \frac{4}{5} - 6x$
- $g(x) = x^2 - 7x + 12$
- $h(x) = \frac{3x+6}{5}$
- $i(x) = x^2 - 9$
- $j(x) = x^2 - 3x^2 - 4x + 12$
- $k(x) = \sqrt{x+7}$
- $l(x) = \frac{3}{x}$
- $m(x) = \frac{x^3 - 2x^2 - 4}{x^4 + 2x^3 + 3}$

## 7.4 Graf funkcije

**Graf**  $\Gamma_f$  funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je množica urejenih parov  $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ , kjer element  $x$  preteče celotno definicijsko območje  $D_f$  funkcije, element  $y$  pa je slika pripadajočega  $x$ , torej  $y = f(x)$ .

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}; x \in D_f \wedge y = f(x)\}$$

Urejene pare iz množice  $\Gamma_f$  lahko upodobimo v koordinatnem sistemu.

Vsakemu elementu  $(x, f(x))$  iz zgornje množice pripada natanko ena točka v koordinatnem sistemu, katere abscisa je enaka  $x$ , ordinata pa je njegova slika  $f(x)$ .

V ničli graf funkcije seka abscisno os, v začetni vrednosti pa ordinatno os.

## 7.5 Naraščanje in padanje

### Naraščajoča funkcija

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **naraščajoča**, če za poljubna  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , kjer je  $x_1 < x_2$ , velja  $f(x_1) \leq f(x_2)$ .

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **strogo naraščajoča**, če za poljubna  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , kjer je  $x_1 < x_2$ , velja  $f(x_1) < f(x_2)$ .

### Padajoča funkcija

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **padajoča**, če za poljubna  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , kjer je  $x_1 < x_2$ , velja  $f(x_1) \geq f(x_2)$ .

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **strogo padajoča**, če za poljubna  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , kjer je  $x_1 < x_2$ , velja  $f(x_1) > f(x_2)$ .

## 7.6 Injektivnost in surjektivnost

### Surjektivnost

Funkcija  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je **surjektivna**, če je zaloga vrednosti  $Z_f$  funkcije enaka njeni kodomeni  $\mathcal{Y}$  – vsak element kodomene  $\mathcal{Y}$  je slika vsaj enega elementa iz domene  $\mathcal{X}$ .

$$\forall y \in \mathcal{Y}. \exists x \in \mathcal{X} \ni f(x) = y$$

### Injektivnost

Funkcija  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je **injektivna**, če se dva poljubna različna originala iz domene  $\mathcal{X}$  preslikata v različni sliki v kodomeni  $\mathcal{Y}$  – vsak element kodomene  $\mathcal{Y}$  je slika kvečjemu enega elementa iz domene  $\mathcal{X}$ .

$$\forall x, y \in \mathcal{X} : f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

Funkcija  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je **bijektivna**, če je injektivna in surjektivna hkrati – vsak element iz kodomene  $\mathcal{Y}$  je slika natanko enega elementa domene  $\mathcal{X}$ .

**Naloga 7.6.** Zapišite in narišite grafe funkcij ter zapišite začetne vrednosti in ničle funkcije. Določite, kje je funkcija naraščajoča oziroma padajoča, ter preverite surjektivnost in injektivnost.

- $f(x) = x \quad D_f = \mathbb{R}$
- $g(x) = -2x + 1 \quad D_g = \mathbb{R}$
- $h(x) = x^2 - 1 \quad D_h = \mathbb{R}$
- $i(x) = \frac{1}{x^2} \quad D_i = \{-2, -1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1, 2\}$
- $j(x) = \frac{x+2}{x-3} \quad D_j = \{-2, -1, 0, 1, 2\}$

## 7.7 Predpis linearne funkcije

**Linearna funkcija** je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom

$$f(x) = kx + n; \quad k, n \in \mathbb{R},$$

kjer je  $k$  **diferenčni kvocient/smerni koeficient**,  $n$  pa **začetna vrednost**  $f(0) = n$ .

Glede na predznak smernega koeficienta  $k$  je linearna funkcija:

- naraščajoča, če je  $k > 0$ ;
- konstanta, če je  $k = 0$  ali
- padajoča, če je  $k < 0$ .

**Naloga 7.7.** Ugotovite, ali je dana funkcija linearna. Linearnim funkcijam določite smerni koeficient in začetno vrednost.

- $f(x) = \frac{1}{7x} - \frac{3}{4}$
- $g(x) = \frac{2}{3} - \pi x$
- $h(x) = \frac{8+6x}{24}$
- $i(x) = 0.3x + 1$
- $j(x) = \frac{x^2 - 3}{5}$
- $k(x) = -\sqrt{2}x + \frac{2}{3}$
- $l(x) = 2$

**Naloga 7.8.** Zapišite predpis linearne funkcije  $f$ , ki ima začetno vrednost 5 in diferenčni količnik  $-3$ .

**Naloga 7.9.** Dana je linearna funkcija  $p(x) = 3x - 4$ . Izračunajte  $p(-2)$ ,  $p(0)$ ;  $p(5)$  in  $p(\sqrt{2})$ .

**Naloga 7.10.** Zapišite predpis linearne funkcije, za katero je  $u(-2) = 10$  in  $u(0) = 2$ .

**Naloga 7.11.** Ali je funkcija naraščajoča ali padajoča?

- $f(x) = 3x + 5$
- $g(x) = -2x + 7$
- $h(x) = 10 - \frac{1}{2}x$
- $i(x) = \frac{x-1}{2}$
- $j(x) = \frac{5-2x}{3}$
- $k(x) = \frac{-\sqrt{3}x+1}{3}$
- $l(x) = -\frac{2-4x}{17}$

**Naloga 7.12.** Izračunajte ničlo linearne funkcije.

- $f(x) = 6x + 12$
- $g(x) = 5x + 2$
- $h(x) = 3x - 12$
- $i(x) = -4x + 8$
- $j(x) = -3x + 2$
- $k(x) = -x - 7$
- $l(x) = \frac{3}{4}x - \frac{1}{4}$
- $m(x) = -\frac{2x+3}{6}$
- $n(x) = \frac{1-4x}{2}$
- $o(x) = \frac{\pi x+4}{3}$
- $p(x) = \sqrt{2}x + 1$
- $r(x) = 4$

**Naloga 7.13.** Dana je linearna funkcija  $f$ . Zapišite predpis funkcije  $g$  v obliki  $g(x) = kx + n$ .

- $f(x) = 2x - 6$ ,  $g(x) = 3f(x)$
- $f(x) = 5x - 3$ ;  $g(x) = f(x+1)$
- $f(x) = \frac{2x-5}{3}$ ;  $g(x) = f(1-x)$
- $f(x) = \frac{10-4x}{7}$ ;  $g(x) = f(3x)$

**Naloga 7.14.** Dana je družina linearnih funkcij  $f(x) = (2m-1)x + (3-m)$ ;  $m \in \mathbb{R}$ .

- Za katero vrednost parametra  $m$  ima funkcija diferenčni količnik enak  $-5$ ?

- Za katero vrednost parametra  $m$  je funkcija padajoča?
- Za katero vrednost parametra  $m$  je funkcija konstantna?
- Za katero vrednost parametra  $m$  je funkcija naraščajoča?
- Za katero vrednost parametra  $m$  je začetna vrednost enaka 2?
- Za katero vrednost parametra  $m$  ima funkcija ničlo  $x = -4$ ?

**Naloga 7.15.** Taksist meri razdaljo, ki jo je prevozil. Vsak kilometer stane 2.5 €, startnina pa 7 €. Zapišite funkcijo, po kateri taksist izračuna znesek za plačilo, ko prebere število prevoženih kilometrov  $x$ . Izračunajte, koliko bi plačali, če bi se peljali 12 km.

**Naloga 7.16.** V bazenu je 12 l vode. V bazen po cevi vsako minuto pritečejo še 4 l vode. Zapišite funkcijo, s katero bomo lahko izračunali, koliko je vode v bazenu po pretečenih  $x$  minutah. Izračunajte, koliko vode je v bazenu po 9 minutah.

## 7.8 Graf linearne funkcije


**Graf linearne funkcije**  $f(x) = kx + n$  je predstavljen kot množica točk

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y = kx + n\},$$

kar upodobimo kot **premico**.

Premice z enako začetno vrednostjo se sekajo v skupni točki  $(0, n)$  na ordinatni osi – **šop premic**.

Premice, ki imajo enak smerni koeficient so vzporedne – **snop premic**.



**Naloga 7.17.** Katere od točk  $A(1, 1)$ ,  $B(4, 0)$ ,  $C(7, -2)$ ,  $D(-4, \frac{5}{2})$ ,  $E(0, \frac{3}{2})$ ,  $F(2, 2)$  in  $G(3, 0)$  ležijo na grafu funkcije  $f(x) = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$ ?

**Naloga 7.18.** Dana je funkcija  $g(x) = 3x - 2$ . Za koliko se spremeni vrednost funkcije  $g$ , če se vrednost  $x$

- poveča za 1?
- poveča za 2?
- zmanjša za 5?
- zmanjša za -10?




**Naloga 7.19.** Narišite graf linearne funkcije. Zapišite začetno vrednost in izračunajte ničlo funkcije. Določite, kje je funkcija pozitivna oziroma negativna, ter ali je naraščajoča ali padajoča?







- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| • $f(x) = -x + \frac{1}{2}$ | • $k(x) = \frac{6x - 1}{3}$  |
| • $g(x) = 2x + 2$           | • $l(x) = -\frac{2 - 3x}{4}$ |
| • $h(x) = 3 - 2x$           | • $m(x) = 3 - \frac{3}{5}x$  |
| • $i(x) = -x$               |                              |
| • $j(x) = -3$               |                              |

**Naloga 7.20.** V isti koordinatni sistem narišite grafe funkcij  $f(x) = 2x - 2$ ,  $g(x) = 2x + 1$ ,  $h(x) = 2x + 2$  in  $i(x) = 2x$ . Kaj opazite?

**Naloga 7.21.** V isti koordinatni sistem narišite grafe funkcij  $f(x) = 2x - 2$ ,  $g(x) = 3x - 2$ ,  $h(x) = x - 2$  in  $i(x) = \frac{1}{2}x - 2$ . Kaj opazite?

**Naloga 7.22.** Zapišite predpis linearne funkcije, ki jo prikazuje graf.





**Naloga 7.23.** Narišite graf sestavljene funkcije in zapišite njeno zalogo vrednosti.

- $f(x) = \begin{cases} 2x; & x \leq 2 \\ 4; & x > 2 \end{cases}$
- $g(x) = \begin{cases} x + 3; & x \leq -2 \\ -x - 1; & x > -2 \end{cases}$
- $h(x) = \begin{cases} x; & x \leq 1 \\ -1; & x > 1 \end{cases}$
- $k(x) = \begin{cases} -x + 1; & x \leq 2 \\ -1; & 2 < x < 4 \\ x - 5; & x \geq 4 \end{cases}$
- $l(x) = \begin{cases} 0.5x; & x \leq 2 \\ 2x - 3; & 2 < x < 4 \\ 0.5x + 3; & x \geq 4 \end{cases}$

**Naloga 7.24.** Narišite graf funkcije.

- $f(x) = |3x - 3|$
- $g(x) = |2x + 1| + 1$
- $h(x) = 1 - |x + 1|$
- $i(x) = 3 - |2x - 1|$
- $j(x) = x + |x - 2|$
- $k(x) = |x + 1| - 2$
- $l(x) = -|0.5x + 3|$
- $m(x) = 3 - |x - 2|$





## Poglavje 8

# Premica

### 8.1 Enačba premice

#### Eksplisitna oblika enačbe premice

$$\mathbf{y} = \mathbf{k}\mathbf{x} + \mathbf{n}; \quad k, n \in \mathbb{R},$$

kjer je  $k$  je **smerni koeficient**, ki ga izračunamo kot

$$k = \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1},$$

$n$  pa je **začetna vrednost**.

Z eksplisitno obliko enačbe premice lahko zapišemo vse premice, razen tistih, ki so vzporedne ordinatni osi.

Dana je premica, ki poteka skozi točki  $(x_1, y_1)$  in  $(x_2, y_2)$ .

Smerni koeficient izračunamo po formuli

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}.$$

Iz  $y_1 = kx_1 + n$  izrazimo

$$n = y_1 - kx_1$$

in vstavimo v prvotno enačbo

$$y = kx + y_1 - kx_1$$

ter preuredimo do oblike

$$\mathbf{y} - \mathbf{y}_1 = \mathbf{k}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_1).$$

#### Odsekovna/segmentna oblika enačbe premice

Denimo, da premica seka koordinatni osi v točkah  $M(m, 0)$  in  $N(0, n)$ .

Uporabimo eksplisitno obliko enačbe premice, v katero vstavimo znani točki

$$y - 0 = \frac{n - 0}{0 - m}(x - m)$$

$$y = -\frac{n}{m}x + n,$$

in jo preoblikujemo do **odsekovne oblike enačbe premice**:

$$\frac{\mathbf{x}}{\mathbf{m}} + \frac{\mathbf{y}}{\mathbf{n}} = \mathbf{1}; \quad m, n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Vrednosti  $m$  in  $n$  določata **odseka/segmenta** na koordinatnih oseh.

Z odsekovno obliko enačbe premice lahko zapišemo vse premice, razen tistih, ki potekajo skozi koordinatno izhodišče  $(0, 0)$  ali pa so vzporedne eni od koordinatnih osi.

### Implicitna oblika enačbe premice

Vsako premico lahko zapišemo z **implicitno obliko enačbe premice**:

$$ax + by + c = 0; (a, b, c \in \mathbb{R}) \wedge (a \text{ in } b \text{ ne hkrati } 0).$$


**Naloga 8.1.** Narišite premico z dano eksplicitno obliko enačbe.

- $y = -2x + 1$
- $y = \frac{1}{2}x + 2$
- $y = 2x + \frac{3}{4}$

**Naloga 8.2.** Narišite premico z dano odsekovno obliko enačbe.

- $\frac{x}{3} + \frac{y}{5} = 1$
- $\frac{x}{2} + \frac{2y}{5} = 1$
- $\frac{x}{2} - \frac{y}{4} = 1$
- $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} = -1$

**Naloga 8.3.** Z grafa razberite ničlo in začetno vrednost ter zapišite odsekovno obliko enačbe premice.



**Naloga 8.4.** Dano enačbo premice zapišite v eksplicitni in odsekovni obliki ter premico narišite.

- $x + 4y - 8 = 0$
- $3x - 2y + 6 = 0$
- $2x + 5y + 5 = 0$
- $\frac{1}{2}x + 3y - 6 = 0$
- $x + 1 = 0$
- $y - 2 = 0$

**Naloga 8.5.** Izračunajte ploščino trikotnika, ki jo premica oklepa s koordinatnima osema.

- $y = -2x + 4$
- $\frac{x}{2} + \frac{x}{-3} = 1$
- $2x + 4y - 3 = 0$
- $x - y + 1 = 0$

**Naloga 8.6.** Zapišite enačbo premice, ki gre skozi dani točki.

- $A(2, 3)$  in  $B(4, 5)$
- $C(1, -2)$  in  $D(-3, -4)$

- $E(7, 2)$  in  $F(-7, -5)$

**Naloga 8.7.** Določite neznano koordinato tako, da bodo dane točke kolinearne.

- $A(3, y)$ ,  $B(-4, 1)$  in  $C(2, 2)$
- $D(-1, 7)$ ,  $E(x, 5)$  in  $F(3, -4)$

**Naloga 8.8.** Ugotovite, ali sta dani premici vzporedni.

- $y = \frac{3}{4}x - 1$  in  $y = -\frac{3}{4}x + 1$
- $x - 2y + 1 = 0$  in  $2x + y + 1 = 0$
- $\frac{x}{3} - \frac{y}{6} = 1$  in  $\frac{x}{2} + \frac{y}{4} = 1$
- $\frac{x}{4} + \frac{y}{2} = 1$  in  $4x + 2y + 1 = 0$

**Naloga 8.9.** Dani sta premici z enačbama  $y = 4x + 9$  in  $ax - 3y + 3 = 0$ . Določite parameter  $a$  tako, da bosta premici vzporedni.

**Naloga 8.10.** Dani sta premici z enačbama  $\frac{x}{2} - \frac{y}{7} = 1$  in  $-6x + by + 1 = 0$ . Določite parameter  $b$  tako, da bosta premici vzporedni.

**Naloga 8.11.** Dani sta premici z enačbama  $3x - 2y + 4 = 0$  in  $(c - 2)x + 4y + 3 = 0$ . Določite parameter  $c$  tako, da bosta premici vzporedni.

**Naloga 8.12.** Zapišite enačbo premice, ki je vzporedna dani premici in poteka skozi dano točko.

- $y = 2x - 1$ ,  $T(1, -3)$
- $2x - 4y + 3 = 0$ ,  $U(-4, 5)$
- $\frac{x}{4} + \frac{y}{8} = 1$ ,  $V(8, -8)$

**Naloga 8.13.** Iz snopa premic z enačbo  $y = -3x + n$  določite enačbo tiste premice, ki poteka skozi točko  $(1, 4)$ .

**Naloga 8.14.** Iz šopa premic z enačbo  $y = kx + 2$  določite enačbo tiste premice, ki gre skozi točko  $(3, -4)$ .

**Naloga 8.15.** Zapišite enačbo pravokotnice na dano premico, ki poteka skozi dano točko.

- $y = x + 2$ ,  $T(3, -4)$
- $y = 2x + 3$ ,  $U(4, 5)$
- $y = \frac{1}{3}x + 5$ ,  $V(-1, 4)$
- $y = -\frac{2}{3}x + \frac{4}{5}$ ,  $Z(-6, 3)$

## 8.2 Presečišče premic

Dve premici v ravnini se lahko **sekata** ali sta **vzporedni**.

Glede na to dobimo različne rešitve sistemov dveh linearnih enačb z dvema neznankama.

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0$$

$$a_2x + b_2y + c_2 = 0$$

- Če se premici sekata, dobimo kot rešitev sistema urejen par  $(x, y)$  oziroma točko  $T(x, y)$ , v kateri se sekata.
- Če sta premici vzporedni imamo dve možnosti:
  - sistem ima neskončno mnogo (premico) rešitev, če premici sovpadata (sta identični),
  - sistem nima rešitve, če sta premici različni.

**Naloga 8.16.** Izračunajte presečišče premic, rezultat preverite s sliko.

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| • $2x - 3x - 3 = 0$     | • $x + 3y - 9 = 0$                |
| • $x = 3$               | • $x - 3y - 3 = 0$                |
| • $y = 3x + 3$          | • $\frac{x}{3} - \frac{y}{6} = 1$ |
| • $y = \frac{x}{2} + 3$ | • $\frac{x}{2} + \frac{y}{5} = 1$ |

**Naloga 8.17.** Zapišite enačbo premice, ki gre skozi presečišče premic  $y = 2x + 1$  in  $y = -\frac{1}{2}x + 6$  ter seka ordinatno os pri  $y = 4$ .

**Naloga 8.18.** Zapišite enačbo premice, ki gre skozi presečišče premic  $y = 3x + 1$  in  $y = -x + 5$  ter ima smerni koeficient  $k = 2$ .

**Naloga 8.19.** Zapišite implicitno enačbo premice, ki gre skozi presečišče premic  $2x - y - 13 = 0$  in  $2x + 3y - 1 = 0$  ter seka abscisno os pri  $x = \frac{7}{2}$ .

**Naloga 8.20.** Zapišite enačbo premice, ki gre skozi presečišče premic  $3x + 4y - 11 = 0$  in  $2x - 7y + 41 = 0$  ter je vzporedna ordinatni osi.

**Naloga 8.21.** Zapišite eksplicitno enačbo premice, ki gre skozi presečišče premic  $5x - 7y + 3 = 0$  in  $2x + y - 14 = 0$  ter je vzporedna premici z enačbo  $3x - 2y + 1 = 0$ .

**Naloga 8.22.** Izračunajte smerni koeficient  $k$  tako, da se premici z enačbama  $y = 2x + 6$  in  $y = kx + \frac{5}{2}$  sekata na simetrali sodih kvadrantov.

**Naloga 8.23.** Stranice trikotnika ležijo na premicah z enačbami  $x + y = 0$ ,  $3x - 2y = 0$  in  $x - 4y + 10 = 0$ . Izračunajte oglišča trikotnika ter njegov obseg in ploščino. Premice in trikotnik narišite v pravokotnem koordinatnem sistemu.

**Naloga 8.24.** Dani sta dve oglišči  $A$  in  $B$  trikotnika  $\triangle ABC$ , orientacija in ploščina. Izračunajte koordinati tretjega oglišča  $C$ , če leži na dani premici.

- $A(-6, 1)$ ,  $B(2, -1)$ ;  
pozitivna orientacija,  $S = 25$ ;  
 $C$  leži na  $y = -2x + 4$
- $A(-4, 0)$ ,  $B(4, 2)$ ;  
pozitivna orientacija,  $S = 7$ ;  
 $C$  leži na  $y = 5 - 2x$

## Poglavje 9

# Statistika

### 9.1 Osnovni pojmi statistike

**Populacija** je množica, ki jo statistično proučujemo. Element populacije imenujemo **statistična enota**.

**Vzorec** je podmnožica populacije, katere elementi predstavljajo največjo možno mero značilnosti celotne množice. Vzorec izberemo, kadar je celotna populacija prevelika množica, da bi analizirali vse njene elemente.

- **Reprezentativen vzorec** je vzorec, ki je izbran tako, da predstavlja značilnosti celotne populacije.
- **Slučajni vzorec** je vzorec, ki je izbran naključno – vsi elementi populacije imajo enako možnost, da bodo izbrani.

**Numerus** je število elementov vzorca. Oznaka  $N$ .

**Statistična spremenljivka/podatek/znak** je vrednost ali lastnost, ki jo proučujemo.

Vrste statističnih spremenljivk:

- **opisne/kvalitativne** statistične spremenljivke
- **vrstne/ordinalne** statistične spremenljivke
- **številске/kvantitativne** statistične spremenljivke

Številске statistične spremenljivke:

- **diskretne** številске spremenljivke – zavzamejo lahko posamezne vrednosti
- **zvezne** številске spremenljivke – zavzamejo lahko vsako vrednost z nekega intervala

**Naloga 9.1.** Zapišite, kaj je v danem primeru populacija, vzorec, statistična enota, spremenljivka in ugotovite ali je spremenljivka opisna ali numerična in, če je numerična, ugotovite, ali je zvezna ali diskretna.

- Na spletni strani je anketa z vprašanjem “Ali imate doma pomivalni stroj?”. Nanjo je odgovorilo 254 ljudi.
- V televizijski oddaji gledalci glasujejo za dva kandidata.
- Razrednik svojih 28 dijakov vpraša, kolikšna je oddaljenost njihovega doma do šole.
- Maturant piše seminarsko nalogo z naslovom “Uporaba TikTok-a med srednješolci”. Pridobil je odgovore 369 srednješolcev, ki so odgovarjali na vprašanje “Ali uporabljate TikTok?”
- Znanstveniki pri raziskavi spremljajo, koliko jajc znesejo kokoši na slovenskih farmah na mesec.

**Naloga 9.2.** *Slovenija ima več kot 6000 naselij. Statistični urad Republike Slovenije je januarja 2024 naredil analizo naselij glede na število prebivalcev. Rezultati so prikazani v tabeli.*

| velikostni razred naselja | število naselij |
|---------------------------|-----------------|
| 0                         | 57              |
| 1 – 24                    | 719             |
| 25 – 49                   | 851             |
| 50 – 99                   | 1256            |
| 100 – 199                 | 1444            |
| 200 – 499                 | 1109            |
| 500 – 999                 | 359             |
| 1000 – 4999               | 199             |
| 5000 – 9999               | 23              |
| 10000 – 49999             | 16              |
| 50000+                    | 2               |

*Zapišite, kaj je v danem primeru populacija, statistična enota, spremenljivka in ugotovite ali je spremenljivka opisna ali numerična in, če je numerična, ugotovite ali je zvezna ali diskretna.*

## 9.2 Urejanje in grupiranje podatkov

Podatke, pridobljene v posamezni raziskavi, moramo najprej urediti.

Če podatkov ni veliko, jih uredimo po velikosti v **ranžirno vrsto**, sicer jih združujemo v skupine, **frekvenčne razrede**.

Podatek z največjo vrednostjo označimo z  $x_{max}$ , podatek z najnižjo vrednostjo pa  $x_{min}$ .

**Frekvenca**  $f$  statističnega znaka je posamezno število diskretnih statističnih enot iste vrednosti.

**Frekvenčni razred** je skupina podatkov iz vzorca. Frekvenčni razredi so navadno enako široki, in skupaj zajamejo celoten razpon podatkov. Za zvezen nabor podatkov za frekvenčne razrede izberemo intervale (navadno oblike  $[a, b)$ ).

**Širina frekvenčnega razreda**  $d_k$  je razlika med zgornjo ( $z_k$ ) in spodnjo ( $s_k$ ) mejo frekvenčnega razreda:

$$d_k = z_k - s_k.$$

Če so razredi enako široki, določimo njihovo širino kot kvocient med celotnim razponom podatkov  $x_{max} - x_{min}$  in številom razredov.

**Sredina frekvenčnega razreda**  $x_k$  je aritmetična sredina zgornje in spodnje meje razreda:

$$x_k = \frac{z_k + s_k}{2}.$$

Grupirane podatke predstavimo s **frekvenčno preglednico/porazdelitvijo**.

Za podatke v frekvenčnih preglednicah računamo:

- **(absolutno) frekvenco**  $f_k$  – število podatkov z vrednostmi v danem frekvenčnem razredu;
- **relativno frekvenco**  $f'_k$  – delež celote, ki ga predstavlja število podatkov v danem frekvenčnem razredu;
- **(absolutno) kumulativno frekvenco**  $F_k$  – število podatkov, katerih vrednosti zavzemajo manjšo vrednost od zgornje meje danega frekvenčnega razreda;
- **relativno kumulativno frekvenco**  $F'_k$  – delež celote, ki ga predstavlja število podatkov v danem in vseh manjših frekvenčnih razredih.

**Naloga 9.3.** Na šoli analizirajo količino prevzetih obrokov v jedilnici. Rezultati so zbrani v tabeli.

| Oddelek | Število prevzetih obrokov |
|---------|---------------------------|
| 1.a     | 12                        |
| 1.b     | 14                        |
| 1.c     | 20                        |
| 2.a     | 17                        |
| 2.b     | 16                        |
| 2.c     | 9                         |
| 3.a     | 13                        |
| 3.b     | 16                        |
| 3.c     | 14                        |
| 4.a     | 21                        |
| 4.b     | 8                         |
| 4.c     | 12                        |

Analizirajte podatke s frekvenčno preglednico. Podatke razdelite v razrede 5 – 9, 10 – 14, 15 – 19, 20 in več.

**Naloga 9.4.** *Dijaki 3. a oddelka so zapisovali svoje pribljubljene barve.*

*Zapisali so jih: modra, rdeča, rdeča, zelena, rumena, rdeča, modra, zelena, modra, modra, rumena, rdeča, zelena, modra, rumena, rumena, zelena, rdeča.*

*Analizirajte rezultate s frekvenčno preglednico.*

**Naloga 9.5.** *Lokostrelec si beleži rezultate treningov.*

*Vrednosti so bile: 10.3, 10.4, 9.9, 9.7, 10.2, 8.9, 9.4, 10.1, 9.0, 10.3, 9.5, 10.6.*

*Analizirajte rezultate s frekvenčno preglednico.*

**Naloga 9.6.** *V frekvenčni preglednici so zbrani podatki o številu sorojencev dijakov 2. b oddelka.*

*Dopolnite preglednico.*

| Število sorojencev | $f_k$ | $f'_k$ | $F_k$ | $F'_k$ |
|--------------------|-------|--------|-------|--------|
| 0                  | 5     |        |       |        |
| 1                  |       | 25 %   |       |        |
| 2                  |       |        |       |        |
| 3                  |       | 10 %   |       |        |
| skupaj             | 20    | 100 %  | /     | /      |



## 9.3 Mere osredinjenosti

### Aritmetična sredina

**Aritmetična sredina** ali **povprečje** je količnik vsote vseh vrednosti statistične spremenljivke in števila teh vrednosti.

$$\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_n}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n x_i.$$

Če se vrednosti statistične spremenljivke ponavljajo ( $k_i$  vrednosti  $x_i$ ), je formula sledeča:

$$\bar{x} = \frac{k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_mx_m}{k_1 + k_2 + \cdots + k_m} = \frac{\sum_{i=1}^m k_ix_i}{\sum_{i=1}^m k_i}, \quad \sum_{i=1}^m k_i = N$$

Pri grupiranih podatkih za vrednosti vzamemo sredine frekvenčnih razredov.

### Modus

**Modus** ali **gostiščnica**  $Mo$  je vrednost statistične spremenljivke, ki se v množici vseh vrednosti najpogosteje ponavlja.

Če se v neki množici dve vrednosti pojavita enako mnogokrat najpogosteje, rečemo, da je porazdelitev vrednosti **bimodalna**.

Za grupirane podatke določamo **modalni razred**, to je tisti razred, ki ima največjo frekvenčno gostoto.

### Mediana

**Mediana** ali **središčnica**  $Me$  je tista vrednost statistične spremenljivke, pri kateri je polovica vrednosti večjih ali enakih, druga polovica vrednosti pa manjših ali enakih od te vrednosti.

Če imamo liho število vrednosti statistične spremenljivke, za mediano vzamemo vrednost, ki stoji na mestu  $\frac{n+1}{2}$  po velikosti urejenih podatkov.


Če je število vrednosti sodo, za vrednost mediane vzamemo aritmetično sredino srednjih dveh podatkov.

### Kvartili

Mediana razdeli podatke na dve polovici. Ti dve polovici lahko spet razdelimo na dve polovici in dobimo štiri enako močne množice podatkov. Meje teh skupin imenujemo **kvartili**.

**Prvi kvartil**  $Q_1$  je mediana prve (spodnje) polovice podatkov, **drugi kvartil**  $Q_2$  je mediana  $Me$  vseh podatkov, **tretji kvartil**  $Q_3$  pa je mediana druge (zgornje) polovice podatkov.

Vrednosti kvartilov, minimalno vrednost in maksimalno vrednost množice podatkov grafično predstavimo z **diagramom kvartilov** oziroma **šktalo z brki**.



**Naloga 9.7.** Izračunajte aritmetično sredino količin.

- 1.5 s, 3.5 s, 1 s
- 4 km, 2000 m, 3 km
- 4 €, 2 €, 3 €, 1 €, 5 €

**Naloga 9.8.** Izračunajte aritmetično sredino danim podatkom.

- 2, 3, 1, 8, 19, 2, 7
- 13, 39, 12
- 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, 0.6

**Naloga 9.9.** Določite modus danim številiškim podatkom.

- 1, 4, 2, 4, 1, 6, 3, 4, 1, 4, 6, 4, 4, 8
- 3, 25, 10, 3, 5, 7, 5, 7, 9, 4, 49
- $\frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}, \frac{6}{8}, \frac{2}{9}$
- $\frac{1}{3}, \frac{4}{4}, \frac{2}{2}, \frac{8}{5}, \frac{9}{8}$
- $\frac{1}{2}, \frac{4}{4}, \frac{4}{4}, \frac{10}{10}, \frac{9}{9}$

**Naloga 9.10.** V porodnišnici so izmerili dolžine dojenčkov, ki so se rodili v enem dnevu.

50, 51, 51, 44, 47, 48, 53, 49, 52, 55, 46, 50, 50, 49, 47, 47

Določite mediano podatkov.

**Naloga 9.11.** Otroci v vrtcu so metali žogo na koš in si zapisovali dosežke. Podatki so prikazani v preglednici.

| Otrok     | Jaka | Jure | Miha | Polona | Valerija | Tina | Mojca | Cene | Darja |
|-----------|------|------|------|--------|----------|------|-------|------|-------|
| Št. košev | 5    | 7    | 10   | 8      | 5        | 6    | 9     | 9    | 4     |

Izračunajte, koliko košev je otrok zadel v povprečju. Podatke uredite po vrsti in določite  $Mo$ ,  $Me$  ter narišite škatlo z brki.

## 9.4 Mere razpršenosti

Informacijo o **porazdelitvi** oziroma **razpršenosti** podatkov lahko izračunamo s pomočjo: variacijskega razmika, interkvartilnega ranga, variance in standardnega odklona.

### Variacijski razmik

**Variacijski razmik**  $R$  je razlika med maksimalno in minimalno vrednostjo statistične spremenljivke:

$$R = x_{\max} - x_{\min}.$$

Variacijski razmik je zelo odvisen od ekstremnih vrednosti, posebno osamelcev, zato ga uporabljamo le v kombinaciji z drugimi merami razpršenosti.

### Interkvartilni rang

**Interkvartilni rang** oziroma **medčetrtnski razmik**  $IR$  je razlika med vrednostjo prvega in tretjega kvartila:

$$IR = Q_3 - Q_1.$$

**Osamelec** je podatek, katerega vrednost je za več kot 3-kratnik interkvartilnega ranga  $IR$  nad tretjim kvartilom  $Q_3$  ali pod prvim kvartilom  $Q_1$ .

Podatek je "pogojno osamelec", če je njegova vrednost za več kot 1.5-kratnik interkvartilnega ranga  $IR$  nad tretjim kvartilom  $Q_3$  ali pod prvim kvartilom  $Q_1$ .

Interkvartilni rang je mera razpršenosti, ki ni občutljiva na osamelce.

### Varianca

**Varianca**  $\sigma^2$  predstavlja aritmetično sredino kvadratov odmikov vrednosti statistične spremenljivke od aritmetične sredine:

$$\sigma^2 = \frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{N} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

### Standardni odklon

**Standardni odklon**  $\sigma$  izračunamo kot koren variance:

$$\sigma = \sqrt{\frac{(x_1 - \bar{x})^2 + (x_2 - \bar{x})^2 + \cdots + (x_n - \bar{x})^2}{N}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}.$$

Predstavlja povprečje odmikov vrednosti statistične spremenljivke od aritmetične sredine.

**Naloga 9.12.** V preglednici so predstavljene cene treh izdelkov v trgovini po posameznih mesecih leta 2019.

| Izdelek | Jan  | Feb  | Mar  | Apr  | Maj  | Jun  | Jul  | Avg  | Sep  | Okt  | Nov  |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Kruh    | 3.35 | 3.29 | 3.34 | 3.38 | 3.38 | 3.37 | 3.38 | 3.55 | 3.53 | 3.54 | 3.49 |
| Jagode  | 8.73 | 7.18 | 5.52 | 4.48 | 5.72 | 5.64 | 6.49 | 6.58 | 7.15 | 7.58 | 8.34 |
| Cvetača | 2.04 | 2.17 | 1.58 | 1.75 | 2.13 | 1.85 | 1.93 | 1.87 | 1.81 | 1.99 | 1.80 |

Izračunajte povprečno ceno in standardni odklon cene vsakega izdelka.

**Naloga 9.13.** V preglednici je prikazano število rojstev v Sloveniji po letih.

| Leto    | 2013  | 2014  | 2015  | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Število | 21111 | 21165 | 20641 | 20345 | 20241 | 19585 | 19328 | 18767 | 18989 |

Izračunajte povprečno število rojstev in standardni odklon.


**Naloga 9.14.** Pridobili smo podatke (urejene po velikosti): 1, 13, 14, 15, 15, 15, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 20 in 40.

- Opišite razpršenost podatkov  $R$ ,  $IR$ ,  $Q_1$ ,  $Q_3$ ,  $\sigma$ ,  $\bar{x}$ .
- Največjo in najmanjšo vrednost (v tem primeru sta to osamelca) odstranimo. Kako se spremeni razpršenost podatkov?

## 9.5 Grafično prikazovanje podatkov

### Strukturni krog

**Strukturni krog** ali **krožni diagram** uporabljamo, kadar so podatki razvrščeni v malo frekvenčnih razredov ali ne dosežejo veliko različnih diskretnih vrednosti.




Celoto predstavlja  $360^\circ$ , za ostale deleže središčne kote izračunamo s sklepnim računom.

### Stolpčni diagram


**Stolpčni diagram** uporabljamo, ko so podatki razvrščeni v veliko frekvenčnih razredov ali lahko dosežejo veliko diskretnih vrednosti.

Stolpčni diagrami so lahko **pokončni** ali **ležeči**. Če želimo prikazati več podatkov naenkrat, uporabimo **sestavljeni** ali **strukturni** stolpčni diagram.



## Histogram



**Histogram** uporabljamo za prikaz grupiranih podatkov.



Širine frekvenčnih razredov niso nujno enake. Meje razredov narišemo na vodoravni osi, frekvence posameznih razredov pa na navpični osi.

## Linijski diagram

**Linijski diagram/poligon** uporabljamo, ko želimo prikazati postopno spreminjanje vrednosti nekega podatka skozi daljše časovno obdobje. Frekvenčne porazdelitve ponazorimo s **frekvenčnim poligonom**, podatki so lahko zvezni ali grupirani.



**Naloga 9.15.** Na matematičnem testu je bilo mogoče doseči 50 točk. Dosežki so bili: 35, 22, 41, 47, 36, 30, 27, 19, 31, 43, 48, 44, 23, 26, 36, 10, 33, 14, 9.

Razdelite jih v pet enako velikih razredov ter predstavite s histogramom.

**Naloga 9.16.** Otroci v vrtcu so metali žogo na koš in si zapisovali dosežke. Podatki so prikazani v preglednici.

| Otrok     | Jaka | Jure | Miha | Polona | Valerija | Tina | Mojca | Cene | Darja |
|-----------|------|------|------|--------|----------|------|-------|------|-------|
| Št. košev | 5    | 7    | 10   | 8      | 5        | 6    | 9     | 9    | 4     |

Izračunajte, koliko košev je otrok zadel v povprečju. Podatke uredite po vrsti in določite  $M_o$ ,  $M_e$  ter narišite škatlo z brki.

**Naloga 9.17.** *Bojana beleži, koliko časa potrebuje za pot do šole. Podatke je zapisala v preglednico.*

| Dan       | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| Čas [min] | 9  | 11 | 10 | 8  | 11 | 10 | 9  | 12 | 9  | 11  |

*S stolpčnim diagramom predstavite, kako pogosto v šolo potuje 8 minut, 9 minut ...*

**Naloga 9.18.** *V domu ostarelih občanov je 500 oskrbovancev. Od 50 do 60 let jih je 15 %, med 60 in 70 leti je 160 oskrbovancev, med 70 in 80 leti pa 200 starostnikov. Drugi so stari med 80 in 90 let.*

- Iz grupiranih podatkov izračunajte povprečno starost oskrbovancev tega doma.*
- Grafično ponazorite starost oskrbovancev.*





## Poglavje 10

# Geometrija v ravnini

### 10.1 Osnovni geometrijski pojmi

Evklid je v prvi knjigi *Elementov* postavil 23 'opredelitev' temeljnih geometrijskih pojmov. Med njimi so:

- **Točka** je tisto, kar nima delov – nima razsežnosti.
- **Črta** je dolžina brez širine – ena razsežnost.
- **Ploskev** je tisto, kar ima samo dolžino in širino – dve razsežnosti.

Tem trditvam sledijo **aksiomi** (temeljne resnice) – privzamemo jih kot veljavne hipoteze, **izreki** – dokazujemo jih z aksiomi in prej dokazanimi izreki, in **definicije** – opisi novih pojmov in lastnosti.

#### Incidenčni aksiomi

**Definicija 10.1.** *Incidenca je relacija, ki povezuje točko in premico – premica in točka sta v relaciji, če točka leži na premici;  $A R p$ , če  $A \in p$ .*

**Aksiom 10.2.** *Za dve različni točki  $A$  in  $B$  obstaja natanko določena premica  $p$ , tako da točki  $A$  in  $B$  ležita na njej.*

**Aksiom 10.3.** *Za vsako premico  $p$  obstajata vsaj dve različni točki  $P$  in  $Q$ , ki ležita na njej.*

**Aksiom 10.4.** *Obstajajo tri različne točke, ki ne ležijo hkrati na isti premici.*


**Definicija 10.5.** *Točke  $A_1, A_2, A_3, \dots$ , ki ležijo na isti premici, so **kolinearne**, če ne ležijo na isti premici, pa so **nekolinearne**.*

**Izrek 10.6.** *Dve različni premici imata lahko največ eno skupno točko.*


**Definicija 10.7.** *Premici, ki imata natanko eno skupno točko, se **sekata**, imenujemo ju **sečnici**, njuno skupno točko pa **presečišče** premic.*

**Definicija 10.8.** *Premici, ki ležita na isti ravnini in nimata nobene skupne točke ali imata vse točke skupne – sovpadata, sta **vzporedni**, imenujemo ju **vzporednici**.*

**Aksiom 10.9.** Če so tri različne točke kolinearne, ena vedno leži med drugima dvema.



**Aksiom 10.10.** Če sta  $A$  in  $B$  različni točki premice  $p$ , potem na premici  $p$  ležita vsaj še točki  $C$  in  $D$ , in sicer  $C$  leži med  $A$  in  $B$ ,  $D$  pa tako, da je  $C$  med  $A$  in  $D$ .




**Izrek 10.11.** Med dvema različnima točkama premice je neskončno mnogo točk.

**Definicija 10.12.** Množica točk premice, ki ležijo med različnima točkama  $A$  in  $B$ , vključno z  $A$  in  $B$ , je **daljica**  $AB$ . Točki  $A$  in  $B$  sta njeni **krajišči**.



**Definicija 10.13.** Poljubna točka premice razdeli premico na dva **poltraka**. To točko imenujemo **izhodišče**, ponavadi jo označimo z  $O$ .




**Definicija 10.14.** Premica, na kateri leži daljica oziroma poltrak, je **nosilka** daljice oziroma poltraka.

**Definicija 10.15.** **Enostavni lik** je množica točk v ravnini, ki jo omejuje sklenjena krivulja, ki sama sebe ne seka.


**Definicija 10.16.** Množica točk v ravnini je **konveksna**, če za poljubni točki  $A$  in  $B$  iz te množice velja, da je daljica  $AB$  njena podmnožica.

$$\mathcal{M} \text{ konveksna} \Leftrightarrow \forall A, B \in \mathcal{M} \Rightarrow AB \subseteq \mathcal{M}$$




Množica točk, ki ni konveksna, je **nekonveksna** oziroma **konkavna**.

$$\mathcal{M} \text{ nekonveksna} \Leftrightarrow \exists A, B \in \mathcal{M} \Rightarrow AB \not\subseteq \mathcal{M}$$



**Definicija 10.17.** Dva poltraka s skupnim izhodiščem določata dva **kota**. Izhodišče poltrakov imenujemo **vrh** kota, poltraka pa imenujemo **kraka** kota.




Če poltraka ne ležita na isti premici, je eden od kotov konveksen, drugi pa je nekonveksen.

Kot lahko označimo na več načinov:

- $\angle(h, k)$ , kjer sta  $h$  in  $k$  poltraka, ki kot določata;
- $\angle PVR$ , kjer je  $P$  točka na enem poltraku,  $V$  vrh kota in  $R$  točka na drugem poltraku;
- $\alpha, \beta, \gamma, \dots$  – z grškimi črkami.


**Definicija 10.18.** Če poltraka s skupnim izhodiščem ležita na isti premici, vendar na različnih straneh izhodišča, določata dva enaka konveksna kota – **iztegnjena kota**.




**Definicija 10.19.** Če se poltraka na isti premici prekrivata, določata **polni kot** ali **ničelni kot**.




**Definicija 10.20.** Kota s skupnim vrhom, ki imata en skupen krak, presek njunih notranjosti pa je prazen, sta **sosečna kota**.



**Definicija 10.21.** Sosedna kota, katerih kraka, ki nista skupna, ležita na isti premici, sta **so-kota**.



**Definicija 10.22.** Tri nekolinearne točke  $A$ ,  $B$  in  $C$  določajo **trikotnik**  $\triangle ABC$ . Točke  $A$ ,  $B$  in  $C$  so **oglišča** trikotnika, daljice  $AB$ ,  $BC$  in  $AC$  so njegove **stranice**.



Koti  $\alpha$ ,  $\beta$  in  $\gamma$  so **notranji koti**, njihovi sokoti  $\alpha'$ ,  $\beta'$  in  $\gamma'$  pa so **zunanji koti** trikotnika.

Trikotnik je **pozitivno orientiran**, če si njegova oglišča sledijo v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca; če si sledijo v smeri vrtenja urnega kazalca, pa je **negativno orientiran**.

**Definicija 10.23.** Točke  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$  v ravnini, od katerih nobene zaporedne tri niso kolinearne, določajo  **$n$ -kotnik**. Točke  $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$  so **oglišča**  $n$ -kotnika; daljice, ki povezujejo sosedni oglišči,  $A_1A_2, A_2A_3, \dots, A_nA_1$  so **stranice**  $n$ -kotnika; daljice, ki povezujejo po dve nesosedni oglišči, pa so **diagonale**  $n$ -kotnika.

Poljuben  $n$ -kotnik ima

$$\frac{n(n-3)}{2}$$

diagonal – iz vsakega od  $n$  oglišč gre  $n-3$  diagonal, vsaka pa je šteta dvakrat.

Če za vsako nosilko stranice  $n$ -kotnika velja, da preostala oglišča ležijo na isti strani te nosilke, je  $n$ -kotnik **konveksen**.

**Naloga 10.24.** Izračunajte število diagonal: 17-kotnika, 31-kotnika in 28-kotnika.

**Naloga 10.25.** Ugotovite, ali obstaja  $n$ -kotnik, ki ima desetino toliko diagonal kot 28-kotnik. Če obstaja, izračunajte, koliko stranic ima.

**Naloga 10.26.** Kateri  $n$ -kotnik ima štirikrat toliko diagonal kot stranic?

**Naloga 10.27.** Izračunajte, kateri  $n$ -kotnik ima: 104 diagonale, 230 diagonal,  $2n-5$  diagonal.

**Naloga 10.28.** Pokažite, da ne obstaja  $n$ -kotnik, ki ima 13 diagonal.

**Naloga 10.29.** Za vsako od spodnjih izjav ugotovite, ali je pravilna ali nepravilna.

- Tri različne točke, so vedno nekolinearne.
- Petkotnik ima enako število diagonal in stranic.
- Štiri različne premice se sekajo v največ 4 različnih točkah.
- Skozi štiri kolinearne točke gredo tri različne premice.
- Vzporedni premici imata lahko neskončno mnogo skupnih točk.

**Naloga 10.30.** Pokažite, da je število diagonal 25-kotnika večkratnik števila njegovih stranic.

**Naloga 10.31.** Vsota števila stranic in diagonal  $n$ -kotnika je 105? Kateri  $n$ -kotnik je to?

**Naloga 10.32.** Izračunajte, kateri  $n$ -kotnik ima toliko diagonal kot stranic.

**Naloga 10.33.** Člani filatelističnega društva so se domenili, da si bodo za praznike spet pošiljali voščilnice po klasični pošti. Ko so se dobili po novem letu, so prinesli vse voščilnice in jih našteali 132. Izračunajte, koliko članov društva, si je medseboj poslalo voščilnice.

## 10.2 Skladnost in merjenje


**Definicija 10.34.** Dva lika  $L$  in  $L'$  sta **skladna**, če lahko lik  $L$  prenesemo na lik  $L'$  tako, da se popolnoma prekrijeta.

Znak za skladnost je  $\cong$ .

**Skladnost** je v množici ravninskih likov *ekvivalenčna relacija*, saj je:

- *refleksivna*:  $L \cong L$  – vsaka množica je skladna sama s seboj;
- *simetrična*:  $L \cong L' \Rightarrow L' \cong L$  – če je prva množica skladna z drugo, je tudi druga skladna s prvo;
- *tranzitivna*:  $L \cong L' \wedge L' \cong L'' \rightarrow L \cong L''$  – če je prva množica skladna z drugo in druga skladna s tretjo, je tudi prva množica skladna s tretjo množico.

**Definicija 10.35.** Kot, ki je skladen s svojim sokotom, je **pravi kot**.




Če si kraka sledita v nasprotni smeri vrtenja urnega kazalca, je **orientacija kota pozitivna**, če pa si sledita v smeri vrtenja urnega kazalca, pa je **orientacija kota negativna**.



Daljici  $AB$  in  $CD$ , ki nista skladni, lahko premaknemo na poljubni premici tako, da levi krajišči sovpadata in da eno od desnih krajišč, npr.  $D$  leži med  $A$  in  $B$ . V tem primeru je daljica  $AB$  **daljša** od daljice  $CD$  oziroma je daljica  $CD$  **krajša** od daljice  $AB$ .

**Aksiom 10.36** (Arhimedov aksiom). *Obstaja tako naravno število  $n$ , pri katerem je vsota  $n$  krajših daljic  $CD$  daljša od daljice  $AB$ , vsota  $n - 1$  krajših daljic  $CD$  pa je kvečjemu skladna z daljico  $AB$ .*

$$n \cdot |CD| > |AB| \quad (n - 1) \cdot |CD| \leq |AB|$$



Daljico  $CD$ , s katero smo izmerili daljico  $AB$ , imenujemo **enotska daljica**. Tako smo daljici  $AB$  priredili natančno določeno število – **dolžino** daljice  $AB$  oziroma **razdaljo** točk  $A$  in  $B$ .

$$|AB| = d(A, B)$$

**Aksiom 10.37.** Če je  $AB$  poljubna daljica,  $A'$  pa točka na poljubnem poltraku, obstaja na tem poltraku natančno določena točka  $B'$ , da je daljica  $A'B'$  skladna z daljico  $AB$ .

$$A'B' \cong AB$$

**Izrek 10.38.** Skladni daljici imata enako dolžino.

**Aksiom 10.39.** Naj daljici  $AB$  in  $BC$  ležita na isti premici in naj imata skupno le točko  $B$ . Daljici  $A'B'$  in  $B'C'$  naj ležita na tej ali neki drugi premici in naj imata skupno točko  $B'$ . Če velja  $AB \cong A'B'$  in  $BC \cong B'C'$ , potem velja tudi  $AC \cong A'C'$ .

**Izrek 10.40.** Dolžina vsote daljic je enaka vsoti dolžin posameznih daljic.

## Enote

Osnovna enota za merjenje dolžine je **meter**.

Iz nje izpeljane enote pa so *decimeter*, *centimeter*, *milimeter*, *kilometer* itd.

$$1 \text{ m} = 10 \text{ dm} = 100 \text{ cm} = 1000 \text{ mm}$$

$$1 \text{ km} = 1000 \text{ m}$$


Enota za merjenje kotov je **kotna stopinja** – velikost  $\frac{1}{360}$  polnega kota.

Izpeljani enoti sta *(kotna) minuta* in *(kotna) sekunda*.


$$1^\circ = 60' = 3600''$$

Velikost kota nič je  $0^\circ$ , pravega kota je  $90^\circ$ , iztegnjenega kota je  $180^\circ$ , polnega kota pa je  $360^\circ$ .

**Definicija 10.41.** Kota  $\varphi$  in  $\psi$ , katerih vsota meri  $180^\circ$ , sta **suplementarna kota**.



**Definicija 10.42.** Kota  $\varphi$  in  $\psi$ , katerih vsota meri  $90^\circ$ , sta **komplementarna kota**.



Sokota sta vedno suplementarna kota.

## Skladnost trikotnikov

**Definicija 10.43.** Dva trikotnika sta **skladna**, če imata paroma skladne vse stranice in tem stranicam nasprotne kote.

**Aksiom 10.44.** Dva trikotnika sta skladna, če se ujemata v dveh stranicah in v vmesnem kotu.


**Izrek 10.45.** Trikotnika  $\triangle ABC$  in  $\triangle A'B'C'$  sta skladna, če se ujemata:

1. v vseh treh stranicah;
2. v eni stranici in obeh priležnih kotih;
3. v dveh stranicah in kotu, ki leži nasproti daljši od obeh stranic.

**Naloga 10.46.** Izračunajte dolžino daljice, če ena polovica meri  $2x - 7$  enot, druga polovica pa  $x + 8$  enot.



**Naloga 10.47.** Izračunaj dolžino  $x$  daljice  $AB$ , če je točka  $S$  njeno razpolovišče, točka  $R$  pa razpolovišče daljice  $SB$  in je  $|SR| = \frac{x}{3} - 1$ .

**Naloga 10.48.** Izračunajte velikosti kotov  $\angle AVM$  in  $\angle FVE$ , če poltrak  $VM$  obakrat razpolavlja kot.





**Naloga 10.49.** Izračunajte velikosti kotov  $\alpha$  in  $\beta$ , če je  $\alpha = \beta$ . Podatke razberite s skice.

**Naloga 10.50.** Iz podatkov na skici izračunajte neznano velikost kota  $x$ .



**Naloga 10.51.** Izračunajte velikost kota  $\angle PVQ$ , če je  $\angle PVR = 94^\circ$ .

**Naloga 10.52.** Izračunajte velikost kota  $\angle SVR$ , če je  $\angle QVS = 50^\circ$ .



**Naloga 10.53.** Kot  $\varphi = 76^\circ 36' 53''$  zapišite v stopinjah na štiri mesta natančno, kot  $\psi = 34.78^\circ$  pa zapišite v stopinjah, minutah in sekundah.

**Naloga 10.54.** Kotu  $\varphi = 37^\circ 16' 43''$  izračunajte suplementarni in komplementarni kot.


**Naloga 10.55.** Razika dveh komplementarnih kotov je  $37^\circ 16'$ . Izračunajte velikosti kotov.

**Naloga 10.56.** Izračunajte velikost kota  $\varphi$ , ki je petkratnik svojega komplementarnega kota.

**Naloga 10.57.** Za vsako od spodnjih izjav ugotovite, ali je pravilna ali nepravilna.

- Sokota sta suplementarna.
- Kot z velikostjo  $45^\circ$  je komplementaren samemu sebi.
- Dve premici, ki se sekata, lahko določata kota z velikostjo  $43^\circ$  in  $137^\circ$ .
- Vsota velikosti dveh komplementarnih kotov je pravi kot.
- Suplementarna kota sta vedno tudi sokota.


**Naloga 10.58.** Poltrak  $VD$  razpolavlja  $\angle CVE$ ,  $\angle BVC$  je pravi kot. Določite velikosti kotov  $\angle AVD$  in  $\angle BVE$ .



### 10.3 Vzporednost in pravokotnost

#### Vzporednost

**Aksiom 10.59** (Aksiom o vzporednici). *Skozi izbrano točko, ki ne leži na premici, lahko tej premici načrtamo natanko eno vzporednico.*




**Vzporednost** je v množici premic na ravnini *ekvivalenčna relacija*, saj je:


- *refleksivna*:  $p \parallel p$  – vsaka premica je vzporedna sama sebi;
- *simetrična*:  $p \parallel q \Rightarrow q \parallel p$  – če je premica  $p$  vzporedna premici  $q$ , je tudi premica  $q$  vzporedna premici  $p$ ;
- *tranzitivna*:  $p \parallel q \wedge q \parallel r \rightarrow p \parallel r$  – če je premica  $p$  vzporedna premici  $q$ , premica  $q$  pa vzporedna premici  $r$ , je tudi premica  $p$  vzporedna premici  $r$ .

Če vzporednici sekamo s premico, dobimo dve presečišči, ob njiju pa pare **kotov z vzporednimi kraki**:


- pari kotov  $(\alpha, \gamma)$ ,  $(\beta, \delta)$ ,  $(\alpha', \gamma')$ ,  $(\beta', \delta')$  imajo oba kraka vzporedna v isto smer;
- pari kotov z istim vrhom  $(\alpha, \beta)$ ;  $(\gamma, \delta)$ ,  $(\alpha', \beta')$ ;  $(\gamma', \delta')$  imajo oba kraka vzporedna v nasprotno smer – **sovršni koti**;
- pari kotov  $(\alpha, \alpha')$ ,  $(\beta, \beta')$ ,  $(\gamma, \gamma')$ ,  $(\delta, \delta')$  imajo en krak vzporeden v isto smer, drugi krak pa vzporeden v nasprotno smer.



**Izrek 10.60.** *Para konveksnih kotov z vzporednimi kraki sta bodisi skladna bodisi suplementarna.*



Sovršna kota sta skladna – imata isti sokot.






## Pravokotnost


**Definicija 10.61.** *Pravokotnica* je premica, ki dano premico seka pod pravim kotom.

**Izrek 10.62.** *Skozi izbrano točko lahko na dano premico načrtamo natanko eno pravokotnico.*




**Kota s pravokotnimi kraki** sta konveksna kota, katerih nosilki krakov enega kota sta pravokotni na nosilki krakov drugega kota.

**Izrek 10.63.** *Para konveksnih kotov s pravokotnimi kraki sta bodisi skladna bodisi suplementarna.*



**Definicija 10.64.** *Pravokotna projekcija* točke  $T$  na premico  $p$  je točka  $T'$ , ki leži na presečišču premice  $p$  in pravokotnice  $q$  skozi točko  $T$  na premico  $p$ . Točka  $T'$  je točki  $T$  najbližja točka premice  $p$ .



Pravokotna projekcija daljice  $AB$  na premico je daljica  $A'B'$ , katere krajišči sta pravokotni projekciji točk  $A$  in  $B$ .

**Razdalja** točke  $T$  od premice  $p$  je:

$$d(T, p) = d(T, T') = |TT'|.$$

## Toge preslikave

**Definicija 10.65.** *Toga preslikava (izometrija) je preslikava v ravnini, ki ohranja razdalje.*


$$\begin{aligned}\tau : A &\mapsto A' \\ \tau : B &\mapsto B' \\ d(A, B) &= d(A', B')\end{aligned}$$

Med toge preslikave spadajo:

- **vzporedni premiki;**
- **zrcaljenje preko premice/premice;**
- **rotacija okoli točke.**


Če kombiniramo več togih preslikav, je dobljena preslikava spet toga preslikava.

**Vzporedni premik** ali **translacija** za dano usmerjeno daljico  $\overrightarrow{MN}$  preslika točko  $T$  v tako točko  $T'$ , da sta daljici  $TT'$  in  $MN$  enako dolgi, vzporedni in enako usmerjeni.




Vzporedni premik ohranja orientacijo likov, daljice preslika v enako dolge vzporedne daljice, ohranja velikost kotov, like preslika v skladne like, nima negibnih točk za  $\overrightarrow{MN} \neq \vec{0}$ .

**Zrcaljenje čez premico  $p$**  preslika točko  $T$  v tako točko  $T'$ , da premica  $p$  pod pravim kotom razpolavlja daljico  $TT'$ .




Zrcaljenje čez premico daljice preslika v enako dolge daljice, ohranja velikost kotov, ne ohranja orientacije likov, like preslika v skladne like, premic ne preslika v vzporedne premice.

**Zrcaljenje čez točko  $O$**  preslika točko  $T$  v tako točko  $T'$ , da je  $O$  razpolovišče daljice  $TT'$ . Ta preslikava je enaka vrtenju okrog točke za  $180^\circ$ .



Zrcaljenje čez točko daljice preslika v enako dolge daljice, ohranja velikosti kotov in orientacijo likov, like preslika v skladne like, premice preslika v vzporedne premice.

**Vrtenje** ali **zasuk** oziroma **rotacija** za kot  $\varphi$  okrog točke  $O$  preslika točko  $T$  v točko  $T'$ , da velja:  $|OT| = |OT'|$  in  $\angle TOT' = \varphi$ .



Vrtenje okoli točke preslika daljice v enako dolge daljice, ohranja velikosti kotov in orientacijo likov, like preslika v skladne like, premic pa ne preslika v vzporedne premice.

## Simetrija


Množica točk  $\mathcal{M}$  je **simetrična/somerna glede na premico  $p$** , če se pri zrcaljenju čez premico  $p$  preslika sama vase. Premico  $p$  imenujemo **simetrala/somernica/simetrijska os** množice  $\mathcal{M}$ .

Množica točk  $\mathcal{M}$  je **središčno simetrična/somerna glede na točko  $T$** , če se pri zrcaljenju čez točko  $T$  preslika sama vase. Točko  $T$  imenujemo **center simetrije** množice  $\mathcal{M}$ .

**Naloga 10.66.** Narišite kvadrat s stranico dolžine 1 in ga:


- vzporedno premaknite vzdolž ordinatne osi za 3 enota;
- zavrtite okrog oglišča  $B$  za kot  $45^\circ$  v negativni smeri;
- zrcalite preko nosilke stranice  $CD$ .

**Naloga 10.67.** Izračunajte velikosti kotov  $\alpha$ ,  $\beta$  in  $\gamma$ . Podatke razberite iz skic. Velja  $p \parallel q$  in  $r \parallel s$ .




**Naloga 10.68.** Izračunajte velikosti vseh notranjih in zunanjih kotov trikotnika  $\triangle ABC$ , če je vsota velikosti dveh zunanjih kotov  $\alpha' + \gamma' = 230^\circ$ , vsota velikosti dveh notranjih kotov pa  $\alpha + \beta = 70^\circ$ .

**Naloga 10.69.** S skice preberite ustrezne podatke ter izračunajte velikosti kotov  $\alpha$ ,  $\beta$ ,  $\gamma$  in  $\delta$ . Pri tem velja, da so premice  $p$ ,  $q$  in  $r$  vzporedne.



## 10.4 Trikotnik

**Definicija 10.70.** ***Trikotnik** je lik/množica točk v ravnini, omejena s tremi daljicami – **stranicami**  $(a, b, c)$ , ki povezujejo tri nekolinearne točke  $(A, B, C)$  v ravnini. Te točke imenujemo **oglišča** trikotnika.*



V trikotniku  $\triangle ABC$  so  $\alpha, \beta$  in  $\gamma$  **notranji koti**, njihovi sokoti  $\alpha', \beta'$  in  $\gamma'$  pa so **zunanji koti**.

**Izrek 10.71.** *Vsota notranjih kotov trikotnika je  $180^\circ$ :*

$$\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ.$$

**Izrek 10.72.** *Zunanji kot trikotnika je enak vsoti notranjih nepriležnih kotov:*

$$\alpha' = \beta + \gamma$$

$$\beta' = \alpha + \gamma$$

$$\gamma' = \alpha + \beta$$

**Izrek 10.73.** *Vsota zunanjih kotov trikotnika je  $360^\circ$ :*

$$\alpha' + \beta' + \gamma' = 360^\circ.$$

**Izrek 10.74.** *Nasproti daljše stranice trikotnika leži večji notranji kot, nasproti krajše stranice pa manjši notranji kot trikotnika.*

$$a > b \Leftrightarrow \alpha > \beta$$

**Izrek 10.75** (Trikotniška neenakost). *Vsaka stranica trikotnika je krajša od vsote dolžin drugih dveh stranic.*


$$a < b + c$$

$$b < a + c$$

$$c < a + b$$


**Izrek 10.76.** *Vsaka stranica trikotnika je daljša od absolutne vrednosti razlike dolžin drugih dveh stranic.*

**Definicija 10.77.** *Višina na stranico trikotnika je daljica, ki povezuje nosilko te stranice z nasprotnim ogliščem in je pravokotna na to nosilko. Njena dolžina je razdalja oglišča od nasprotne stranice.*




**Izrek 10.78.** *Nosilke vseh treh višin na stranice trikotnika se sekajo v eni točki, ki jo imenujemo višinska točka ali ortocenter.*

**Definicija 10.79.** *Težiščnica na stranico trikotnika je daljica, ki povezuje razpolovišče te stranice z nasprotnim ogliščem.*




**Izrek 10.80.** *Vse tri trikotnikove težiščnice se sekajo v eni točki – težišču ali baricentru trikotnika. Težišče deli težiščnico v razmerju 1 : 2.*

**Izrek 10.81.** *Simetrale vseh treh stranic trikotnika se sekajo v eni točki – središču trikotniku očrtane krožnice.*



Očrtana krožnica poteka skozi vsa oglišča trikotnika. Vse stranice trikotnika so tetive krožnice.


**Izrek 10.82.** *Simetrale notranjih kotov trikotnika se sekajo v eni točki. Ta točka je **središče trikotniku včrtane krožnice**.*



Včrtana krožnica ima vse tri stranice trikotnika za tangente.


Težišče, središče trikotniku očrtane krožnice, središče trikotniku včrtane krožnice in višinska točka so **znamenite točke trikotnika**.

**Izrek 10.83.** *Višinska točka, središče očrtane krožnice in težišče so vedno kolinearne. Premico, ki jih povezuje, imenujemo **Eulerjeva premica**.*




**Vrste trikotnikov glede na stranice**


- raznostranični trikotnik – vse tri stranice različno dolge, vsi trije koti so različni




- enakokraki trikotnik – dve stranici enako dolgi  $\Rightarrow$  kota ob osnovnici sta skladna




- enakostranični ali pravilni trikotnik – vse tri stranice enako dolge  $\Rightarrow$  vsi trije koti so skladni

**Vrste trikotnikov glede na kote**


- ostrokotni trikotnik – ima tri ostre notranje kote



- topokotni trikotnik – ima en topi notranji kot, ostala dva kota ostra



- pravokotni trikotnik – ima en pravi notranji kot, ostala dva kot ostra






**Naloga 10.84.** Dve stranici trikotnika merita 2 in 7 enot. Zapišite interval vrednosti za dolžino tretje stranice tega trikotnika.

**Naloga 10.85.** Ali obstaja trikotnik, katerega dolžine stranic so rešitve sistema enačb:


$$\begin{aligned}a + b + c &= 16 \\a - c &= 2 \\a + b &= 13.\end{aligned}$$

**Naloga 10.86.** Za katere vrednosti števila  $x$  obstaja trikotnik s stranicami dolžin  $x + 7$ ,  $2x + 2$  in  $3x - 1$ ?

**Naloga 10.87.** Izračunajte velikosti kotov  $\alpha$  in  $\beta$ .



**Naloga 10.88.** Premici  $p$  in  $q$  sta vzporedni. Izračunajte velikosti kotov  $\alpha$ ,  $\beta$  in  $\gamma$ .



**Naloga 10.89.** Izračunajte velikosti vseh notranjih in zunanjih kotov trikotnika  $\triangle ABC$ , če je vsota velikosti dveh zunanjih kotov  $\alpha' + \gamma' = 230^\circ$ , vsota velikosti dveh notranjih kotov pa  $\alpha + \beta = 70^\circ$ .

**Naloga 10.90.** Izračunajte velikosti vseh notranjih in zunanjih kotov trikotnika  $\triangle ABC$ , če je vsota velikosti dveh zunanjih kotov  $\alpha' + \beta' = 234^\circ$ , razlika velikosti dveh notranjih kotov pa  $\alpha - \beta = 28^\circ$ .


**Naloga 10.91.** Narišite trikotnik s podatki:

- $a = 4$  cm,  $b = 5$  cm in  $c = 7$  cm,
- $a = 4$  cm,  $b = 6$  cm in  $\beta = 60^\circ$ ,
- $a = 4$  cm,  $b = 4.5$  cm in  $t_a = 4$  cm,
- $b = 4$  cm,  $t_b = 5$  cm in  $\gamma = 105^\circ$ ,
- $v_a = 4$  cm,  $t_c = 2.5$  cm in  $\beta = 30^\circ$ ,
- $b = 5$  cm,  $v_a = 2$  cm in  $\beta = 30^\circ$ ,
- $a + b + c = 13$  cm,  $v_c = 3$  cm in  $\alpha = 60^\circ$ ,
- $a + b = 7$  cm,  $\alpha = 45^\circ$  in  $v_b = 4$  cm.

## 10.5 Krožnica, krog, lok


**Definicija 10.92.** *Krožnica* je množica ravninskih točk, ki so enako oddaljene od dane točke  $S$  – **središče** krožnice. Razdalja  $r$  med središčem in poljubno točko na krožnici je **polmer** ali **radij** krožnice.

$$\mathcal{K} = \{T; d(T, S) = r\}$$



**Definicija 10.93.** *Krog* s središčem  $S$  in polmerom  $r$  je množica ravninskih točk, katerih oddaljenost od središča je manjša ali enaka  $r$ .


$$\mathcal{K} = \{T; d(T, S) \leq r\}$$



**Definicija 10.94.** Premico  $s$ , ki seka krožnico, imenujemo **sekanta** krožnice. Zveznica  $CD$  njenih presečišč s krožnico je **tetiva**. Presečišči  $C$  in  $D$  razdelita krožnico na dva **krožna loka**  $\widehat{CD}$  in  $\widehat{DC}$ .


**Definicija 10.95.** Premico  $t$ , ki se dotika krožnice v točki  $E$ , imenujemo **dotikalnica** ali **tangenta** krožnice. Polmer  $SE$ , ki povezuje dotikalnišče s središčem  $S$ , je pravokoten na tangento.

**Definicija 10.96.** Točki  $A$  in  $B$  imenujemo **diametralni točki**, njuna zveznica je **premer** ali **diameter**.




## Obodni in središčni kot


**Definicija 10.97.** *Obodni kot nad lokom  $\widehat{AB}$  je kot, ki ima vrh na krožnici, kraka pa gresta skozi točki  $A$  in  $B$ , ki določata lok.*



**Definicija 10.98.** *Središčni kot nad lokom  $\widehat{AB}$  je kot, ki ima vrh v središču krožnice, kraka pa gresta skozi točki  $A$  in  $B$ , ki določata lok.*




**Izrek 10.99.** *Nad istim lokom meri obodni kot polovico središčnega kota.*



**Izrek 10.100.** *Vsi obodni koti nad istim lokom so enaki/skladni.*

**Izrek 10.101** (Talesov izrek o kotu v polkrogu). *Če je osnovnica trikotnika premer kroga in tretje oglišče trikotnika leži na krožnici, je trikotnik pravokoten.*





Kotu v polkrogu pravimo tudi obodni kot nad premerom kroga.

**Naloga 10.102.** Vsota velikosti središčnega in obodnega kota nad istim lokom je  $174^\circ$ . Koliko merita središčni in obodni kot?



**Naloga 10.103.** Središčni kot je za  $64^\circ$  večji od obodnega kota nad istim lokom. Izračunajte velikosti obeh kotov.

**Naloga 10.104.** Krožnica je razdeljena s tremi točkami  $A$ ,  $B$  in  $C$  na tri loke  $AB$ ,  $BC$  in  $CA$ , ki so po dolžini v razmerju  $2 : 7 : 9$ . Izračunajte velikosti središčnih kotov, ki pripadajo tem lokom, ter notranjih kotov trikotnika  $\triangle ABC$ . Pomagajte si s skico.

**Naloga 10.105.** Izračunajte vrednost neznanke  $x$ , če sta premici skozi točki  $A$  in  $T$  ter  $B$  in  $T$  tangenti na krožnico.



**Naloga 10.106.** Izračunajte vrednost neznanke  $x$ , če sta premici skozi točki  $A$  in  $T$  ter  $B$  in  $T$  tangenti na krožnico.



## 10.6 Štirikotnik in pravilni $n$ -kotnik

Štirikotnike delimo glede na število parov vzporednih stranic v tri skupine:

- **paralelograme**, ki imajo dva para vzporednih stranic;
- **trapeze**, ki imajo en par vzporednih stranic;
- **trapezoide**, ki nimajo nobenega para vzporednih stranic.


Vsak štirikotnik ima dve diagonali.

Diagonala  $e$  povezuje oglišči  $A$  in  $C$ , diagonala  $f$  pa oglišči  $B$  in  $D$ .

**Izrek 10.107.** Vsota notranjih kotov štirikotnika je  $360^\circ$ .

$$\alpha + \beta + \gamma + \delta = 360^\circ$$

### Paralelogram




**Izrek 10.108.** Naslednje trditve so enakovredne in karakterizirajo paralelogram:

1. Poljubni nasprotni stranici sta skladni ( $|AB| = |CD| = a$  in  $|AD| = |BC| = b$ ).
2. Diagonali se razpolavljata.
3. Poljubna sosednja kota sta suplementarna ( $\alpha + \beta = 180^\circ$ ).
4. Poljubna nasprotna kota sta skladna.

Višina paralelograma je razdalja med vzporednima stranicama.


Paralelograme delimo na *pravokotne* in *poševnokotne* oziroma na *enakostranične* in *raznostranične*.

**Definicija 10.109.** *Pravokotnik* je pravokotni raznostranični paralelogram.




Diagonali v pravokotniku sta skladni ( $e = f$ ) in se razpolavljata; vsi notranji koti so pravi ( $\alpha = 90^\circ$ ); višine so stranice same.

**Definicija 10.110.** *Kvadrat je pravokotni enakostranični paralelogram.*



Diagonali v kvadratu sta skladni ( $e = f$ ) in se razpolavljata in razpolavljata notranje kote, sekata se pod pravim kotom; vsi notranji koti so pravi ( $\alpha = 90^\circ$ ); višina je stranica sama.

**Definicija 10.111.** *Romb je poševnokotni enakostranični paralelogram.*




Diagonali v rombu se razpolavljata in razpolavljata notranje kote, sekata se pod pravim kotom.

## Trapez

**Definicija 10.112.** *Trapez je štirikotnik, ki ima en par vzporednih stranic.*

Vzporedni stranici imenujemo **osnovnici** trapeza, preostali dve stranici pa **kraka** trapeza.



Višina trapeza je razdalja med osnovnicama.


**Definicija 10.113.** *Srednica trapeza je daljica, ki povezuje razpolovišči krakov trapeza.*

**Izrek 10.114.** *Srednica je vzporedna je osnovnicama, njena dolžina je enaka aritmetični sredini dolžin obeh osnovnic:*

$$s = \frac{a + c}{2}.$$

**Trditev 10.115.** *Kota ob istem kraku sta suplementarna ( $\alpha + \delta = 180^\circ$  in  $\beta + \gamma = 180^\circ$ ).*


**Definicija 10.116.** *Enakokraki trapez je trapez, katerega kraka sta skladna.*



Enakokraki trapez ima skladni diagonalni ( $e = f$ ) in skladna para kotov ob isti osnovnici ( $\alpha = \beta$  in  $\gamma = \delta$ ).


### Trapezoid

**Definicija 10.117.** *Deltoid je štirikotnik, ki ima dva para sosednjih skladnih nevzporednih stranic.*



Diagonali deltoida se sekata pod pravim kotom. Daljša diagonala razpolavlja krajšo in oba notranja kota. Preostala kota sta skladna.

**Definicija 10.118.** *Tetivni štirikotnik je štirikotnik, katerega stranice so tetive neke krožnice.*




**Izrek 10.119.** *Nasprotna kota tetivnega štirikotnika sta suplementarna:*

$$\alpha + \gamma = \beta + \delta = 180^\circ.$$

**Trditev 10.120.** *Če sta v štirikotniku nasprotna kota suplementarna, mu lahko očrtamo krožnico.*

**Definicija 10.121.** *Tangentni štirikotnik* je štirikotnik, katerega stranice so odseki na tangentah neke krožnice.




**Izrek 10.122.** Vsota dolžin nasprotnih stranic tangentnega štirikotnika je enaka vsoti dolžin drugih dveh nasprotnih stranic:

$$a + c = b + d.$$

### Pravilni $n$ -kotnik

**Definicija 10.123.** *Pravilni  $n$ -kotnik* ima vse stranice enako dolge in vse kote enako velike.



**Izrek 10.124.** Vsota notranjih kotov trikotnika je  $(n - 2) \cdot 180^\circ$ .

Notranji kot pravilnega  $n$ -kotnika meri  $\frac{n-2}{n} 180^\circ$ .

**Naloga 10.125.** Konstruirajte paralelogram  $ABCD$  s podatki:

- $a = 4 \text{ cm}$ ,  $b = 3 \text{ cm}$ ,  $e = 6 \text{ cm}$ ;
- $\alpha = 60^\circ$ ,  $a = 5 \text{ cm}$ ,  $b = 3 \text{ cm}$ ;
- $e = f = 4 \text{ cm}$ ,  $a = 3 \text{ cm}$ .

**Naloga 10.126.** Konstruirajte trapez  $ABCD$  s podatki:

- $a = 5 \text{ cm}$ ,  $b = 4 \text{ cm}$ ,  $d = 3.5 \text{ cm}$ ,  $\beta = 60^\circ$ ;
- $a = 4 \text{ cm}$ ,  $v = 3 \text{ cm}$ ,  $e = 5 \text{ cm}$ ,  $f = 4 \text{ cm}$ ;
- $\alpha = 60^\circ$ ,  $a = 5 \text{ cm}$ ,  $e = f = 4.5 \text{ cm}$ ;
- $\alpha = 60^\circ$ ,  $b = 5 \text{ cm}$ ,  $c = 2 \text{ cm}$ ,  $v = 4 \text{ cm}$ .

**Naloga 10.127.** Konstruirajte deltoid  $ABCD$  s podatki:


- $b = 3.5 \text{ cm}$ ,  $e = 4 \text{ cm}$ ,  $f = 5 \text{ cm}$ ;
- $a = 4 \text{ cm}$ ,  $b = 3 \text{ cm}$ ,  $\delta = 90^\circ$ .



## 10.7 Podobnost

### Središčni razteg

**Definicija 10.128.** *Središčni razteg ali homotetija s središčem v neki točki  $O$  in faktorjem  $k \neq 0$  je podobnostna preslikava, ki daljico  $OA$  preslika v daljico  $OA'$ , pri čemer velja  $|OA'| = |k| \cdot |OA|$ .*



$$|OA'| : |OA| = k \quad |OB'| : |OB| = k \quad |OC'| : |OC| = k$$

$$|A'B'| : |AB| = k \quad |B'C'| : |BC| = k \quad |A'C'| : |AC| = k$$

Središčni razteg s središčem v točki  $O$  in faktorjem  $k \neq 0$ :

- ohranja velikosti kotov;
- vse razdalje pomnoži s  $|k|$ , pri čemer:
  - $|k| > 1$  pomeni razteg,
  - $k = 1$  pomeni identiteto,
  - $|k| < 1$  pomeni skrčitev,
  - $k = -1$  pomeni zrcaljenje čez točko  $O$ ;
- premico preslika v vzporedno premico;
- daljico  $AB$  preslika na vzporedno daljico  $A'B'$ ;
- ohranja premice, ki gredo skozi točko  $O$ .

### Podobnost


**Definicija 10.129.** *Podobnostna preslikava je preslikava, sestavljena iz togega premika in središčnega raztega.*

**Definicija 10.130.** *Dva lika sta podobna, če med njima obstaja podobnostna preslikava.*

Podobnost je v množici ravninskih likov ekvivalenčna relacija, saj je:

- *refleksivna*:  $L \sim L$  – vsaka množica je podobna sami sebi (koeficient podobnosti  $k = 1$ );
- *simetrična*:  $L \sim L' \Rightarrow L' \sim L$  – če je prva množica podobna drugi, je tudi druga podobna prvi (koeficienta podobnosti  $k$  in  $\frac{1}{k}$ );
- *tranzitivna*:  $L \sim L' \wedge L' \sim L'' \rightarrow L \sim L''$  – če je prva množica podobna drugi in druga podobna tretji, je tudi prva množica podobna tretji množici (koeficienti podobnosti  $k_1, k_2$  in  $k_1 k_2$ ).

**Izrek 10.131** (Talesov izrek o sorazmerjih). Če premici, ki se sekata v eni točki, sekamo z množico vzporednic, je razmerje odsekov na eni premici šopa enako razmerju enakoležnih odsekov na drugi premici istega šopa.




$$|VA| : |VA'| = |VB| : |VB'|$$

$$|VA| : |AB| = |VA'| : |A'B'|$$

$$|VA| : |AA'| = |VB| : |BB'|$$

### Podobnost trikotnikov

**Definicija 10.132.** Trikotnika  $\triangle ABC$  in  $\triangle A'B'C'$  sta podobna, če imata enaka razmerja vseh istoležnih stranic in enake vse notranje kote.




$$a : b : c = a' : b' : c' \quad \wedge \quad \alpha = \alpha', \beta = \beta', \gamma = \gamma' \quad \Rightarrow \quad \triangle ABC \sim \triangle A'B'C'$$

**Izrek 10.133** (o podobnosti trikotnikov). Dva trikotnika sta si podobna, če se ujemata:

1. v razmerjih po dveh enakoležnih stranic ( $a : a' = b : b' = c : c' = k$ );
2. v dveh notranjih kotih (npr.  $\alpha = \alpha', \beta = \beta'$ );
3. v razmerju dveh stranic in v vmesnem kotu (npr.  $b : c = b' : c', \alpha = \alpha'$ );
4. v razmerju dveh stranic in v kotu nasproti daljše.

**Izrek 10.134.** Podobna trikotnika imata sorazmerna obsega, koeficient podobnosti je  $k$ , isti kot za dolžine stranic. Sorazmerni sta tudi višini trikotnikov.

Ploščini podobnih trikotnikov sta sorazmerni s koeficientom podobnosti  $k^2$ .

**Izreki v pravokotnem trikotniku**

**Izrek 10.135** (višinski izrek). *Kvadrat višine v pravokotnem trikotniku je enak produktu pravo-  
kotnih projekcij katet na hipotenuzo.*

$$v^2 = a_1 b_1$$

**Izrek 10.136** (Evklidov izrek). *Kvadrat katete v pravokotnem trikotniku je enak produktu hi-  
potenuze in pravokotne projekcije te katete na hipotenuzo.*


$$a^2 = a_1 c \quad \text{in} \quad b^2 = b_1 c$$

**Izrek 10.137** (Pitagorov izrek). *Kvadrat hipotenuze v pravokotnem trikotniku je enak vsoti  
kvadratov obeh katet.*


$$c^2 = a^2 + b^2$$

**Naloga 10.138.** Pomanjšajte trikotnik  $\triangle ABC$  z dolžinami stranic  $a = 4$  cm,  $b = 8$  cm in  $c = 6$  cm v razmerju  $5 : 3$ .

**Naloga 10.139.** Izračunajte vrednost števila  $x$ , če sta stranici  $AB$  in  $ED$  vzporedni.



**Naloga 10.140.** Dolžina daljice  $AC$  je 12. Izračunajte dolžino daljice  $AD$ .



**Naloga 10.141.** Trikotnika  $\triangle ABC$  in  $\triangle DEF$  imata po dva skladna kota. Stranice trikotnika  $\triangle DEF$  merijo 14 cm, 18 cm in 12 cm. Koliko merita preostali dve stranici trikotnika  $\triangle ABC$ , če njegova najdaljša stranica meri 42 cm?

**Naloga 10.142.** V trapezu  $ABCD$  z osnovnico  $|AB| = 5$  in krakom  $|AD| = 4$  se nosilki krakov sekata v točki  $E$  ter je  $|DE| = 2$ . Izračunajte dolžino stranice  $CD$ .


**Naloga 10.143.** Ivan stoji ponoči 5 m od vznožja 9 m visokega svetilnika. Ivanova senca je dolga 1 m. Določite Ivanovo višino.

**Naloga 10.144.** V pravokotnem trikotniku  $\triangle ABC$  so dani nekateri podatki za dolžine določenih stranic ali višine. Izračunajte vrednosti neznanih dolžin stranic oziroma višine tako, da bodo določene vse izmed  $c$ ,  $a$ ,  $b$ ,  $a_1$ ,  $b_1$  in  $v$ .

- $a = 30$ ,  $b = 40$
- $a = \sqrt{10}$ ,  $v = \sqrt{6}$
- $b = \sqrt{35}$ ,  $b_1 = 5$
- $c = 12$ ,  $a = 6$
- $a_1 = 6$ ,  $b_1 = 8$

**Naloga 10.145.** Izračunajte dolžine stranic pravokotnega trikotnika  $\triangle ABC$ , kjer sta  $a$  in  $b$  kateti,  $c$  pa hipotenuza:  $a = 3x - 1$ ,  $b = 5x$ ,  $c = 6x - 1$ .


**Naloga 10.146.** Izračunajte velikosti kotov  $x$ ,  $y$  in  $z$ .



## Poglavje 11

# Kotne funkcije

### 11.1 Definicija kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku



**Sinus kota**  $\alpha$  je razmerje med dolžinama kotu  $\alpha$  nasprotne katete in hipotenuze:

$$\sin \alpha = \frac{\text{nasprotna kateta}}{\text{hipotenuza}} = \frac{a}{c}.$$

**Tangens kota**  $\alpha$  je razmerje med dolžinama kotu  $\alpha$  nasprotne katete in priležne katete:

$$\tan \alpha = \frac{\text{nasprotna kateta}}{\text{priležna kateta}} = \frac{a}{b}.$$

**Kosinus kota**  $\alpha$  je razmerje med dolžinama kotu  $\alpha$  priležne katete in hipotenuze:

$$\cos \alpha = \frac{\text{priležna kateta}}{\text{hipotenuza}} = \frac{b}{c}.$$

**Kotangens kota**  $\alpha$  je razmerje med dolžinama kotu  $\alpha$  priležne katete in nasprotne katete:

$$\cot \alpha = \frac{\text{priležna kateta}}{\text{nasprotna kateta}} = \frac{b}{a}.$$

**Naloga 11.1.** V pravokotnem trikotniku sta dolžini katet  $a = 12$  cm in  $b = 5$  cm. Natančno izračunajte vrednosti kotnih funkcij kota  $\beta$ .

**Naloga 11.2.** V pravokotnem trikotniku sta dolžini katet  $a = 6$  cm in  $b = 5$  cm. Natančno izračunajte vrednosti kotnih funkcij kota  $\beta$ .

**Naloga 11.3.** V pravokotnem trikotniku je dolžina hipotenuze  $c = 10$  in dolžina katete  $a = 6$ . Natančno izračunajte vrednosti kotnih funkcij za kot  $\alpha$ .

**Naloga 11.4.** Načrtajte pravokotni trikotnik  $\triangle ABC$ , v katerem velja:

- $\sin \alpha = \frac{2}{5}$
- $\cos \alpha = \frac{6}{3}$
- $\tan \alpha = \frac{7}{7}$

- $\cos \beta = \frac{4}{7}$
- $\tan \beta = \frac{0.3}{0.2}$

## 11.2 Računanje vrednosti kotnih funkcij

### Vrednosti kotnih funkcij nekaterih kotov

| $\varphi$ [rad] | $\varphi$ [°] | $\sin \varphi$       | $\cos \varphi$       | $\tan \varphi$       | $\cot \varphi$       |
|-----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0               | 0°            | 0                    | 1                    | 0                    | /                    |
| $\frac{\pi}{6}$ | 30°           | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $\sqrt{3}$           |
| $\frac{\pi}{4}$ | 45°           | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 1                    | 1                    |
| $\frac{\pi}{3}$ | 60°           | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | $\sqrt{3}$           | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
| $\frac{\pi}{2}$ | 90°           | 1                    | 0                    | /                    | 0                    |

### Kotne funkcije komplementarnih kotov

Sinus kota je enak kosinusu komplementarnega kota in obratno.

Tangens kota je enak kotangensu komplementarnega kota in obratno.

$$\sin(90^\circ - \varphi) = \cos \varphi$$

$$\tan(90^\circ - \varphi) = \cot \varphi$$

$$\cos(90^\circ - \varphi) = \sin \varphi$$

$$\cot(90^\circ - \varphi) = \tan \varphi$$

**Naloga 11.5.** Na štiri decimalna mesta natančno izračunajte vrednosti kotnih funkcij za kot  $x$ .

- $x = 55^\circ$
- $x = 39^\circ$
- $x = 12^\circ$

**Naloga 11.6.** Na minuto natančno izračunaj velikost kota, če je:

- $\sin x = 0.25$
- $\cos x = 0.6$
- $\tan x = 3$
- $\sin x = \frac{2}{5}$
- $\cos x = \frac{2}{5}$

**Naloga 11.7.** Natančno izračunajte vrednost izraza.

- $\sin 90^\circ + \cos 0^\circ + \tan 45^\circ$
- $\frac{\tan 30^\circ}{\sin 60^\circ} - \frac{\tan 60^\circ}{\cos 60^\circ}$
- $\tan 30^\circ \cdot \frac{\sin 45^\circ}{\cos 30^\circ}$
- $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ - \tan 45^\circ$
- $\frac{\sin 30^\circ}{\cos 30^\circ}$
- $\frac{1 - \sin 45^\circ}{\cos 45^\circ}$
- $\frac{\cos 45^\circ}{\sin 90^\circ}$
- $\frac{1 - \tan 30^\circ}{\cos 45^\circ + \sin 45^\circ - 3 \tan 30^\circ}$

**Naloga 11.8.** V pravokotniku meri stranica  $a = 10$  cm, diagonala pa 14 cm. Izračunajte natančno dolžino druge stranice in velikost kota med stranico  $a$  in diagonalo na dve decimalki stopinje natančno.

**Naloga 11.9.** V enakokrakem trikotniku meri višina na osnovnico 24 cm, osnovnica pa 14 cm. Izračunajte dolžino kraka in velikost kota med krakom in osnovnico na dve decimalki stopinje natančno.

**Naloga 11.10.** Enakokraki trapez ima osnovnici dolgi 45 cm in 23 cm, višina pa je 60 cm. Izračunajte dolžino kraka in velikost kota med krakom in osnovnico na minuto natančno.

**Naloga 11.11.** Vrh stolpa vidimo pod kotom  $19.17^\circ$ , če pa se mu približamo za 50 m, ga vidimo pod kotom  $34.23^\circ$ . Izračunajte višino stolpa, če je točka gledišča na višini 1.7 m.

**Naloga 11.12.** Koliko meri središčni kot nad lokom  $AB$  v krogu s polmerom 8 cm, če je  $|AB| = 6$  cm? Kot izrazite v stopinjah na štiri decimalke natančno.

**Naloga 11.13.** V enakokrakem trapezu z osnovnicama 12 cm in 6 cm kot ob osnovnici meri  $\alpha = 73^\circ$ . Izračunajte dolžino kraka.

**Naloga 11.14.** Pravokotnik ima stranici dolgi 5 cm in 6 cm. Na minuto natančno izračunajte kot, ki ga oklepata diagonali v pravokotniku.

**Naloga 11.15.** V rombu je dolžina diagonale  $e$  dvakrat tolikšna kot dolžina diagonale  $f$ . Na minuto natančno izračunajte velikost kota  $\alpha$ .

### 11.3 Zveze med kotnimi funkcijami

$$\tan \varphi = \frac{a}{b} = \frac{\frac{a}{c}}{\frac{b}{c}} = \frac{\sin \varphi}{\cos \varphi}$$

$$\cot \varphi = \frac{b}{a} = \frac{\frac{b}{c}}{\frac{a}{c}} = \frac{\cos \varphi}{\sin \varphi}$$

$$\tan \varphi \cdot \cot \varphi = \frac{a}{b} \cdot \frac{b}{a} = 1$$

$$\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$$

**Naloga 11.16.** *Natančno izračunajte vrednosti preostalih kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku, če je kot  $\alpha$  oster in velja:*

- $\cos \alpha = 0,1$
- $\sin \alpha = \frac{8}{17}$
- $\tan \alpha = 2$

**Naloga 11.17.** *Poenostavite izraze s pomočjo zvez med kotnimi funkcijami.*

- $1 - \sqrt{(1 - \sin^2 x) \cos^2 x}$
- $\frac{\sin x}{\tan x} \cdot \cos x - 1$
- $\frac{1}{\tan x} + \frac{1 - 2 \cos^2 x}{\sin x \cos x}$
- $\tan^2 x - \frac{1}{1 - \sin^2 x}$
- $\frac{\cos x (1 + \tan^2 x)}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x - 1}$
- $\frac{\sin x + \cos^2 x \cdot \sin^{-1} x}{(\sin x + \cos x)^2 - 1}$
- $\frac{\tan x}{1}$
- $\frac{\left( \frac{\tan^{-1} x \cdot \sin x}{\sqrt{1 - \cos^2 x}} \right)}{\left( (\tan x \cos x)^{-2} + \cos^{-2} x \right) \sin^2 x}$
- $\left( \frac{1}{\cot x} \sin^{-1} x \right)^{-2} + \sin x \tan x \cos x$

**Naloga 11.18.** *Natančno izračunajte brez uporabe računalnika.*

- $\frac{\cos 15^\circ}{\sin 75^\circ} - 2 \cdot \frac{\sin 15^\circ}{\cos 75^\circ}$
- $\sin^2 55^\circ + \cos^2 45^\circ - \frac{\tan 33^\circ}{\sin 33^\circ}$
- $\sin^2 86^\circ \cdot (\sin^2 5^\circ + \sin^2 85^\circ + \tan^2 4^\circ)$
- $\frac{1 - \sin^2 15^\circ}{\sin^2 75^\circ}$




## 11.4 Razširitev pojma kotne funkcije do polnega kota

### Kotne funkcije v enotskem krogu

**Enotska krožnica** je krožnica s polmerom ene enote in s središčem v koordinatnem izhodišču.

Kot  $\varphi$  z vrhom v koordinatnem izhodišču določata:

- **fiksni/nepremični krak** kota leži na pozitivnem delu abscisne osi in
- **premični krak** določa velikost kota in leži v enem izmed štirih kvadrantov ter seka enotsko krožnico v točki  $(\cos x, \sin x)$ .




**Sinus** kota  $\varphi$  je enak ordinati presečišča premičnega kraka z enotsko krožnico.

**Kosinus** kota  $\varphi$  je enak abscisi presečišča premičnega kraka z enotsko krožnico.

**Tangens** kota  $\varphi$  je enak ordinati presečišča nosilke premičnega kraka z navpično tangento enotskega kroga v točki  $(1, 0)$ .

**Kotangens** kota  $\varphi$  je enak abscisi presečišča nosilke premičnega kraka z vodoravno tangento enotskega kroga v točki  $(0, 1)$ .



### Stopinje in radijani

#### Radian


Loku na krožnici, ki je enako dolg kot polmer krožnice, pripada središčni kot, velik 1 radian.

$$1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \doteq 57,3^\circ$$

#### Pretvorba med stopinjami in radijani

Naj bo kot  $\varphi$  podan v radijanih,  $\phi$  pa njemu pripadajoči kot podan v stopinjah. Potem velja:

$$\varphi = \frac{\pi}{180^\circ} \phi \quad \text{in} \quad \phi = \frac{180^\circ}{\pi} \varphi.$$

**Kot  $\varphi$  med  $90^\circ$  in  $180^\circ$** 

Sinusa suplementarnih kotov sta enaka; kosinusa suplementarnih kotov sta nasprotno enaka.


$$\sin(180^\circ - \psi) = \sin \psi$$

$$\cos(180^\circ - \psi) = -\cos \psi$$

Tangensa in kotangensa suplementarnih kotov sta nasprotno enaka.

$$\tan(180^\circ - \psi) = -\tan \psi$$

$$\cot(180^\circ - \psi) = -\cot \psi$$

**Kot  $\varphi$  med  $180^\circ$  in  $270^\circ$** 

Sinusa in kosinusa kotov, ki se razlikujeta za  $\pi$ , sta nasprotno enaka.


$$\sin(180^\circ + \psi) = -\sin \psi$$

$$\cos(180^\circ + \psi) = -\cos \psi$$

Tangensa in kotangensa kotov, ki se razlikujeta za  $\pi$ , sta enaka.

$$\tan(180^\circ + \psi) = \tan \psi$$

$$\cot(180^\circ + \psi) = \cot \psi$$

**Kot  $\varphi$  med  $270^\circ$  in  $360^\circ$** 

$$\sin(360^\circ - \psi) = -\sin \psi$$

$$\cos(360^\circ - \psi) = \cos \psi$$

$$\tan(360^\circ - \psi) = -\tan \psi$$

$$\cot(360^\circ - \psi) = -\cot \psi$$

$$\sin(-\psi) = -\sin \psi$$

$$\cos(-\psi) = \cos \psi$$

$$\tan(-\psi) = -\tan \psi$$

$$\cot(-\psi) = -\cot \psi$$

## Vrednosti kotnih funkcij nekaterih kotov

| $\varphi$ [rad]  | $\varphi$ [°] | $\sin \varphi$       | $\cos \varphi$       | $\tan \varphi$       | $\cot \varphi$       |
|------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 0                | 0             | 0                    | 1                    | 0                    | /                    |
| $\frac{\pi}{6}$  | 30°           | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | $\sqrt{3}$           |
| $\frac{\pi}{4}$  | 45°           | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | 1                    | 1                    |
| $\frac{\pi}{3}$  | 60°           | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | $\sqrt{3}$           | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ |
| $\frac{\pi}{2}$  | 90°           | 1                    | 0                    | /                    | 0                    |
| $\pi$            | 180°          | 0                    | -1                   | 0                    | /                    |
| $\frac{3\pi}{2}$ | 270°          | -1                   | 0                    | /                    | 0                    |

**Naloga 11.19.** Izrazite s kotno funkcijo kota, manjšega od 45°.

- $\sin 200^\circ$       •  $\sin 299^\circ$       •  $\tan 163^\circ$       •  $\cot 203^\circ$       •  $\tan 140^\circ$
- $\cos 115^\circ$       •  $\cos 355^\circ$       •  $\cos 255^\circ$       •  $\cos 154^\circ$       •  $\cos 218^\circ$
- $\tan 170^\circ$       •  $\cot 335^\circ$       •  $\sin 190^\circ$       •  $\sin 245^\circ$       •  $\tan 179^\circ$

**Naloga 11.20.** Najprej izrazite vrednost dane kotne funkcije s kotno funkcijo ostrega kota in nato izračunajte njeno natančno vrednost.

- $\sin 300^\circ$       •  $\cos 225^\circ$       •  $\cos 120^\circ$
- $\cos 330^\circ$       •  $\sin 240^\circ$       •  $\sin 180^\circ$
- $\tan 315^\circ$       •  $\tan 150^\circ$

**Naloga 11.21.** Natančno izračunajte.

- $\frac{\cos 300^\circ - \sin 210^\circ - \sin 0^\circ}{\tan 300^\circ + \tan 135^\circ}$
- $(\sin 150^\circ - \cos 210^\circ)^2 + \tan^2 315^\circ$
- $\sin 120^\circ - \cos 150^\circ + \tan 225^\circ$
- $\frac{\cos 135^\circ + \sin 225^\circ}{\tan 300^\circ - \tan 120^\circ - \sin 270^\circ}$
- $\frac{\cos 240^\circ + \tan 135^\circ - \sin^2 315^\circ}{\tan 300^\circ}$

**Naloga 11.22.** Za kot  $x$  je podana vrednost ene kotne funkcije in območje velikost kota. Izračunajte natančne vrednosti drugih kotnih funkcij za kot  $x$ .

- $x \in [180^\circ, 270^\circ]$ ;  $\sin x = -0.6$
- $x \in [90^\circ, 180^\circ]$ ;  $\cos x = \frac{\sqrt{2}}{3}$
- IV. kvadrant;  $\tan x = -\sqrt{3}$
- II. kvadrant;  $\tan x = -2$
- III. kvadrant;  $\tan x = 3$
- II. kvadrant;  $\sin x = \frac{3}{4}$
- $x \in [270^\circ, 360^\circ]$ ;  $\cos x = \frac{1}{3}$
- $x \in [180^\circ, 270^\circ]$ ;  $\cos x = -\frac{4}{5}$
- IV. kvadrant;  $\sin x = -\frac{15}{17}$

**Naloga 11.23.** Podana je vrednost ene kotne funkcije za kot  $x$ . Izračunajte velikost kota  $x$  glede na pogoj o njegovi velikosti.

- $x \in [270^\circ, 360^\circ]; \cos x = 0.5$
- $x \in [0^\circ, 360^\circ]; \tan x = -1$
- $x \in [180^\circ, 360^\circ]; \sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $x \in [0^\circ, 360^\circ]; \cos x = \frac{\sqrt{2}}{2}$
- $x \in [180^\circ, 360^\circ]; \cos x = -1$
- $x \in [0^\circ, 180^\circ]; \tan x = 1$
- $x \in [180^\circ, 270^\circ]; \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $x \in [0^\circ, 360^\circ]; \cos x = \frac{\sqrt{3}}{2}$
- $x \in [0^\circ, 270^\circ]; \tan x = -\sqrt{3}$

**Naloga 11.24.** V enotski krožnici narišite vse kote, za katere velja dani podatek. Izračunajte velikosti kotov na štiri decimalna mesta natančno.

- $\sin x = 0.6$
- $\cos x = 0.3$
- $\tan x = 0.8$
- $\sin x = -\frac{2}{3}$
- $\cos x = -\frac{3}{5}$
- $\tan x = -\frac{3}{2}$
- $\tan x = 2$

**Naloga 11.25.** Natančno izračunajte.

$$\frac{\sin 315^\circ + \cos 135^\circ - \tan^2 120^\circ}{\sin^2 150^\circ - \cos^2 225^\circ}$$

**Naloga 11.26.** Poenostavite izraz.

$$1 + \left( \frac{\sin^2 x + \tan^{-1} x \cdot \sin x \cdot \cos x}{\frac{1}{\sin^2 x} - 1} \right)^{-1}$$

**Naloga 11.27.** Za  $\tan x = -5$  in  $270^\circ \leq x \leq 360^\circ$  izračunajte velikost kota  $x$ , na minuto natančno, in natančne vrednosti preostalih kotnih funkcij.

**Naloga 11.28.** Zapišite s kotno funkcijo kota, manjšega od  $45^\circ$ .

- $\sin 355^\circ$
- $\cos 291^\circ$
- $\tan 174^\circ$
- $\sin 247^\circ$

**Naloga 11.29.** Voznik podmornice na višini  $-200$  m vidi razbitino ladje, ki leži potopljena na višini  $-1200$  m, pod kotom  $8.4^\circ$ . Izračunajte razdaljo, ki jo mora prevoziti, da bo točno nad razbitino, če se vozi s hitrostjo  $40$  km/h. Koliko časa potrebuje za to pot?

## Poglavje 12

# Potence in koreni

### 12.1 Koreni poljubnih stopenj

Za sodo naravno število  $n$  je  **$n$ -ti koren**  $\sqrt[n]{a}$  realnega števila  $a \geq 0$  tisto nenegativno realno število  $x$ , za katerega velja  $a = x^n$ .

$$\sqrt[n]{a} = x \Leftrightarrow a = x^n; \quad a, x \in \mathbb{R}^+$$

Za liho naravno število  $n$  je  **$n$ -ti koren**  $\sqrt[n]{a}$  realnega števila  $a$  tisto realno število  $x$ , za katerega velja  $a = x^n$ .

$$\sqrt[n]{a} = x \Leftrightarrow a = x^n; \quad a, x \in \mathbb{R}$$

Število  $a$  imenujemo **korenjenec**, simbol  $\sqrt{\phantom{x}}$  **korenski znak**, število  $n$  pa **korenski eksponent**.

#### Pravila za računanje s koreni poljubnih stopenj

- $(\sqrt[n]{a})^n = a$
- $\sqrt[n]{a^n} = \begin{cases} |a|, & n = 2k, k \in \mathbb{N} \\ a, & n = 2k - 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$
- $\sqrt[n]{a^w} = (\sqrt[n]{a})^w$
- $\sqrt[n]{a^w} = \sqrt[nz]{a^{wz}}$
- $\sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[nm]{a}$
- $\sqrt[n]{a \cdot b} = \sqrt[n]{a} \cdot \sqrt[n]{b}$
- $\sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}; \quad b \neq 0$
- $\sqrt[n]{a^w} \cdot \sqrt[n]{a^z} = \sqrt[n]{a^{w+z}}$
- $\frac{\sqrt[n]{a^w}}{\sqrt[n]{a^z}} = \sqrt[n]{a^{w-z}}; \quad a \neq 0$

Pri tem za sode korenske stopnje  $n$  privzamemo  $a, b \in [0, \infty)$ ; za lihe stopnje  $n$  pa  $a, b \in \mathbb{R}$ .

**Naloga 12.1.** Poenostavite izraz in ga delno korenite.

- $\sqrt[3]{xy^2\sqrt{x^5y}}$
- $\sqrt{a\sqrt{a^2\sqrt{a^3}}}$
- $\sqrt[4]{a^3b^2\sqrt{ab^5}}$
- $\sqrt[4]{ab^2\sqrt[3]{ab}}$
- $\sqrt[3]{a\sqrt[4]{a^5\sqrt{a}}}$
- $\sqrt[5]{x^4y\sqrt[4]{x^5y^3}}$
- $\sqrt[6]{a^2b^3\sqrt{a^8\sqrt[3]{b}}}$
- $\sqrt[3]{x\sqrt{y^3\sqrt{x^3\sqrt[5]{y^6y^{-1}}}}}$

**Naloga 12.2.** Izračunajte.

- $\sqrt[5]{\frac{1}{32}}$
- $\sqrt[4]{\frac{16}{81}}$

- $\sqrt[3]{-8}$
- $\sqrt[4]{-625}$
- $\sqrt[3]{0.125}$
- $\sqrt[4]{0.0016}$

**Naloga 12.3.** *Poenostavite.*

- $\sqrt[18]{x^{15}}$
- $\sqrt[9]{a^6}$

- $\sqrt[30]{y^{18}}$
- $\sqrt[20]{b^{30}}$

**Naloga 12.4.** *Racionalizirajte ulomke.*

- $\frac{1}{3 - \sqrt{x}}$
- $\frac{1}{2 - 4\sqrt[3]{a}}$
- $\frac{2}{a - \sqrt[3]{b}}$
- $\frac{x - 1}{\sqrt[3]{x} - 1}$
- $\frac{8x}{2\sqrt[3]{x} + 1}$

- $\frac{1}{2 - \sqrt[4]{3}}$
- $\frac{1}{\sqrt[4]{2} - 1}$
- $\frac{\sqrt[4]{y}}{2 - \sqrt[4]{y}}$
- $\frac{3}{1 + \sqrt[5]{2}}$

**Naloga 12.5.** *Poenostavite in delno korenite izraz.*

- $\frac{\sqrt[4]{2}}{\sqrt{2}\sqrt[3]{8}}$
- $\frac{\sqrt[3]{9}}{\sqrt[5]{3}\sqrt{27}}$
- $\frac{\sqrt{\sqrt{\sqrt{1}}}}{\sqrt[17]{1}}$
- $\frac{\sqrt{\sqrt{a}}}{\sqrt[3]{a^2}}$
- $\frac{\sqrt{a\sqrt[3]{a^{-1}} \cdot \sqrt[3]{a^2}\sqrt[5]{a}}}{\sqrt[5]{a\sqrt{a^{-5}}}}$

- $\frac{\sqrt{x^3\sqrt[4]{x^3\sqrt{x}}}}{\sqrt[4]{x^{-3}\sqrt[4]{x}}}$
- $\frac{\sqrt[7]{b^{13}\sqrt{b^{-2}}}}{\sqrt{\sqrt{b^{-1}}}}$
- $\frac{\sqrt[3]{x^2\sqrt[4]{x^{-1}}} \cdot \sqrt[4]{x^3\sqrt{x}}}{\sqrt[4]{x\sqrt{x}\sqrt[3]{x^{-1}}}}$
- $\frac{\sqrt{8ab^{-1}}}{\sqrt{0.5}\sqrt[3]{8ab^2}}$

**Naloga 12.6.** *Izračunajte natančno vrednost korena.*

- $\sqrt{31 - 12\sqrt{3}}$
- $\sqrt{18 + 8\sqrt{2}}$

- $\sqrt{9 - 4\sqrt{5}}$
- $\sqrt{17 + 2\sqrt{2}}$

**Naloga 12.7.** *Poenostavite izraz in ga delno korenite.*

- $\frac{\sqrt[5]{xy^3\sqrt[4]{x^2y^3}}}{\sqrt[10]{\sqrt{x}}}$
- $\frac{\sqrt[4]{ab^3\sqrt[3]{a^2b^3}}}{\sqrt{\sqrt[6]{a}}}$

- $\left(\frac{1-z}{1-\sqrt[3]{z}} - \sqrt[3]{z}\right) \left(1 - \sqrt[6]{z^4}\right)$
- $\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{4096}}} + \sqrt{\sqrt{\sqrt{16}}} - \sqrt[5]{32}$
- $\frac{\sqrt[6]{ab^3\sqrt{a^3b}}}{\sqrt[4]{b^{-3}\sqrt[3]{a}}}$

## 12.2 Potence z racionalnimi eksponenti

Potenca z racionalnim eksponentom je definirana kot:

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

kjer je  $m \in \mathbb{Z}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  in  $a \in [0, \infty)$ .

### Pravila za računanje s potencami z racionalnimi eksponenti

- $x^p \cdot x^q = x^{p+q}$
- $x^p \cdot y^p = (xy)^p$
- $(x^p)^q = x^{pq}$
- $x^p : x^q = \frac{x^p}{x^q} = x^{p-q}; \quad x \neq 0$
- $x^p : y^p = \frac{x^p}{y^p} = \left(\frac{x}{y}\right)^p; \quad y \neq 0$

V pravilih upoštevamo primerni realni osnovi  $x, y \in \mathbb{R}$  in racionalne eksponente  $p, q \in \mathbb{Q}$ .

**Naloga 12.8.** *Izračunajte.*

- $8^{\frac{1}{3}} - 16^{\frac{2}{4}}$
- $27^{\frac{2}{3}} - 125^{\frac{1}{3}}$
- $(-8)^{-\frac{1}{3}}$
- $1000^{\frac{2}{3}} - 343^{\frac{2}{3}}$

**Naloga 12.9.** *Izračunajte.*

- $\sqrt{625^{\frac{3}{4}} - \left(\frac{1}{2}\right)^{-2}} + 4^{\frac{1}{3}} \cdot 16^{\frac{1}{3}}$
- $4 \cdot 0.16^{-\frac{1}{2}} - \sqrt[3]{5 \cdot 8^{\frac{1}{3}} + 2 \cdot 81^{\frac{3}{4}}}$
- $\left(2 \cdot 9^{\frac{3}{2}} + 5 \cdot 16^{\frac{1}{4}}\right)^{\frac{1}{3}}$
- $\left(\left(\frac{4}{9}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot 32^{\frac{1}{5}} + 169^{\frac{1}{2}}\right)^{\frac{1}{2}}$
- $0.25^{-\frac{1}{2}} \cdot 0.001^{-\frac{1}{3}} - \sqrt[3]{10^2 + 0.2^{-2}}$
- $\left(3\frac{3}{8}\right)^{\frac{2}{3}} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-\frac{1}{2}} \cdot (3 - \sqrt{5}) \sqrt{7 + 3\sqrt{5}}$

**Naloga 12.10.** *Izračunajte.*

- $2.25^{-0.5} \cdot \sqrt{4^{1.5} + 1}$
- $6.25^{-0.5} \cdot 2.25^{1.5} + \sqrt{16^{0.75} + 1}$
- $\left(3\frac{1}{16}\right)^{-0.5} \sqrt{0.125^{-\frac{2}{3}} + 3} + 0.002^{-\frac{2}{3}}$
- $\sqrt{10} (5^{-0.5} - 2)^{-1} - \sqrt{90}$
- $\sqrt{27^{\frac{2}{3}} + 0.25^{-2}} + (2 - \sqrt{5}) \sqrt{9 + 4\sqrt{5}} - \frac{1 + \sqrt{12}}{2 + \sqrt{3}}$

**Naloga 12.11.** *Izraz zapišite s potencami in ga poenostavite.*

- $\left(\frac{1-z}{1-\sqrt[3]{z}} - \sqrt[3]{z}\right) \left(1 - \sqrt[6]{z^4}\right)$
- $\frac{\sqrt[6]{ab^3\sqrt{a^3b}}}{\sqrt[4]{b^{-3}\sqrt[3]{a}}}$
- $\left(y^{\frac{2}{3}}x^{-0.25}\right)^6 : \left(\sqrt{x^{-4}y^2} \cdot \sqrt{y\sqrt[3]{xy^{-3}}}\right)^3$
- $\frac{\sqrt[3]{x^{-4}\sqrt{x^2y^{-3}}}}{\sqrt[4]{x^{-3}y^2}} \cdot (x^{0.3}y^{0.2})^5$
- $\frac{\sqrt[5]{x^{-2}\sqrt[3]{x^{-3}y^4}}}{y^{-\frac{1}{3}}x^{\frac{1}{2}}} \left(\sqrt[6]{\sqrt{y^{-3}}}\right)^4$
- $\frac{\sqrt[4]{x^{-2}y}}{\sqrt[6]{x^3\sqrt{y^{-7}}}} \sqrt[4]{x^2y^{-5}^2}$

## 12.3 Iracionalne enačbe

**Iracionalna enačba** je enačba, v kateri neznanka nastopa po korenem poljubne stopnje.

### Reševanje iracionalne enačbe

Iracionalno enačbo rešujemo tako, da jo s pomočjo potenciranja prevedemo v enačbo, ki nima neznanke pod korenem.

Tako dobimo enačbo, ki ni nujno ekvivalentna prvotni enačbi, saj lahko s potenciranjem pridobimo kakšno rešitev, ki ne ustreza prvotni enačbi.

Na koncu reševanja moramo vedno narediti **preizkus**, s katerim izločimo morebitne neustrezne rešitve.

**Naloga 12.12.** *Rešite enačbo.*

- $\sqrt{x-1} - 5 = 0$
- $\sqrt{x+5} = 2$
- $\sqrt{3-x} - 5 = 0$
- $1 + \sqrt{x-5} = 0$

**Naloga 12.13.** *Rešite enačbo.*

- $\sqrt{2x-1} + 2x = x$
- $2 + \sqrt[3]{x-1} = 0$
- $\sqrt{x^2+2} - \sqrt{3x} = 0$
- $x - \sqrt{5x-11} = 1$
- $2x + 3 = \sqrt{3x^2 + 5x - 1}$
- $\sqrt{-8x-4} = -2x$
- $\sqrt{x^2-1} - 2 = 0$
- $\sqrt{x+3} = -9$

**Naloga 12.14.** *Rešite enačbo.*

- $\sqrt{x} + \sqrt{x+1} = 3$
- $\sqrt{x-2} - 2 = \sqrt{x+2}$
- $\sqrt{x+1} = \sqrt{2} - \sqrt{x-1}$
- $\sqrt{x-6} + \sqrt{x+2} = 2$
- $\sqrt{x+5} - 3 = -\sqrt{x}$
- $\sqrt{3x+1} - 1 = \sqrt{x+4}$
- $\sqrt[3]{x+2} - \sqrt{10+x} = -2$
- $\sqrt{5+x} - 1 = \sqrt{3x+4}$

**Naloga 12.15.** *Rešite enačbo.*

- $\sqrt[3]{x^3 + 7x^2 + x + 26} - 3 = x - 1$
- $\sqrt{x-2} - \sqrt{2x-3} = 2$
- $\sqrt{x^2 + 3x + x} = 2$
- $\sqrt{x+7} - \sqrt{2x-1} = 3$
- $\sqrt[3]{5-x} + \sqrt{2x+14} - 2 = 0$
- $\sqrt{x-6} - \sqrt{x+2} - 2 = 0$
- $\sqrt{x+3} + \sqrt{x+2} = \sqrt{3}$
- $\sqrt[5]{x^2 + 3x + 34} = 2$



## Poglavje 13

# Funkcija

### 13.1 Funkcija in njene lastnosti

#### Preslikava

Naj bosta  $\mathcal{X}$  in  $\mathcal{Y}$  neprazni množici. **Preslikava**  $f$  sestoji iz:

- množice  $\mathcal{X}$ , ki ji pravimo **domena**,
- množice  $\mathcal{Y}$ , ki ji pravimo **kodomena** in
- **prirejanja**, ki vsakemu elementu  $x$  domene priredi natanko en element  $y$  kodomene.

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$$

$$f : x \mapsto y$$

Elemente  $x$  kodomene  $\mathcal{X}$  imenujemo **originali** preslikave.

Če elementu  $x$  priredimo element  $y$  iz kodomene, potem  $y$  imenujemo **slika** elementa  $x$ .

Preslikavo lahko podamo s predpisom, puščičnim diagramom, besednim opisom ...

#### Funkcija

Naj bosta  $\mathcal{X}$  in  $\mathcal{Y}$  neprazni številski množici. **Funkcija**  $f$  je preslikava med številkama množicama  $\mathcal{X}$  in  $\mathcal{Y}$ :

$$f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}.$$

Število  $y$  je **funkcijska vrednost** števila  $x$ , če se število  $x$  preslika v število  $y$ .

$$f(x) = y$$

$x$  je neodvisna spremenljivka,  $f(x)$  je od  $x$  odvisna spremenljivka.

V nekaterih primerih za opis funkcije uporabimo poseben izraz:

- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$  – realna funkcija realne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{R}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{N}$  – realna funkcija naravne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{N}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}$  – naravna funkcija realne spremenljivke;
- $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathbb{N}; \mathcal{X} \subseteq \mathbb{N}$  – naravna funkcija naravne spremenljivke.

### 13.1.1 Definijsko območje in zaloga vrednosti funkcije

**Definijsko območje**  $D_f$  preslikave ali funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je množica vseh originalov, ki jih v danem primeru opazujemo.

Za definijsko območje navadno vzamemo največjo možno množico, za katero je predpis funkcije veljaven/definiran.

**Zaloga vrednosti**  $Z_f$  preslikave ali funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je množica vseh slik oziroma funkcijskih vrednosti.

Zaloga vrednosti  $Z_f$  je podmnožica kodomene  $\mathcal{Y}$ :  $Z_f \subseteq \mathcal{Y}$ .

### 13.1.2 Ničla in začetna vrednost funkcije

**Ničla** funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je tista vrednost  $x_0 \in \mathcal{X}$  neodvisne spremenljivke, pri kateri je vrednost funkcije  $f$  enaka 0:  $f(x_0) = 0$ .

Ničle funkcije  $f$  poiščemo tako, da rešimo enačbo  $f(x) = 0$ .

Ničle so le tiste izmed vrednosti, ki ležijo v definijskem območju  $D_f$  funkcije  $f$ .

**Začetna vrednost** funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je funkcijska vrednost pri  $x = 0$ , to je  $f(0)$ .

Začetna vrednost obstaja le, če je 0 v definijskem območju funkcije  $f$ :  $0 \in D_f$ .

### 13.1.3 Graf funkcije

**Graf**  $\Gamma_f$  funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je množica urejenih parov  $(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}$ , kjer element  $x$  preteče celotno definijsko območje  $D_f$  funkcije, element  $y$  pa je slika pripadajočega  $x$ , torej  $y = f(x)$ .

$$\Gamma_f = \{(x, y) \in \mathcal{X} \times \mathcal{Y}; x \in D_f \wedge y = f(x)\}$$

Urejene pare iz množice  $\Gamma_f$  lahko upodobimo v koordinatnem sistemu.

Vsakemu elementu  $(x, f(x))$  iz zgornje množice pripada natanko ena točka v koordinatnem sistemu, katere abscisa je enaka  $x$ , ordinata pa je njegova slika  $f(x)$ .

V ničli, če obstaja, graf funkcije seka ali se dotika abscisne osi, v začetni vrednosti, če obstaja, pa seka ordinatno os.

### 13.1.4 Naraščanje in padanje funkcije

#### Naraščajoča funkcija

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **naraščajoča**, če za poljubna  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , kjer je  $x_1 < x_2$ , velja  $f(x_1) \leq f(x_2)$ .

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **strogo naraščajoča**, če za poljubna  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , kjer je  $x_1 < x_2$ , velja  $f(x_1) < f(x_2)$ .

#### Padajoča funkcija

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **padajoča**, če za poljubna  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , kjer je  $x_1 < x_2$ , velja  $f(x_1) \geq f(x_2)$ .

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **strogo padajoča**, če za poljubna  $x_1, x_2 \in (a, b)$ , kjer je  $x_1 < x_2$ , velja  $f(x_1) > f(x_2)$ .

### 13.1.5 Injektivnost in surjektivnost

#### Surjektivnost

Funkcija  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je **surjektivna**, če je zaloga vrednosti  $Z_f$  funkcije enaka njeni kodomeni  $\mathcal{Y}$  – vsak element kodomene  $\mathcal{Y}$  je slika vsaj enega elementa iz domene  $\mathcal{X}$ .

$$\forall y \in \mathcal{Y}. \exists x \in \mathcal{X} \ni f(x) = y$$

#### Injektivnost

Funkcija  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je **injektivna**, če se dva poljubna različna originala iz domene  $\mathcal{X}$  preslikata v različni sliki v kodomeni  $\mathcal{Y}$  – vsak element kodomene  $\mathcal{Y}$  je slika kvečjemu enega elementa iz domene  $\mathcal{X}$ .

$$\forall x, y \in \mathcal{X} : f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$$

Funkcija  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  je **bijektivna**, če je injektivna in surjektivna hkrati – vsak element iz kodomene  $\mathcal{Y}$  je slika natanko enega elementa domene  $\mathcal{X}$ .

### 13.1.6 Omejenost funkcije

#### Omejenost navzgor

Funkcija  $f$  je **navzgor omejena**, če obstaja tako realno število  $M$ , da je  $f(x) \leq M$  za vsak  $x \in D_f$ . Število  $M$  imenujemo *zgornja meja*.

$$\exists M \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni f(x) \leq M$$

#### Omejenost navzdol

Funkcija  $f$  je **navzdol omejena**, če obstaja tako realno število  $m$ , da je  $f(x) \geq m$  za vsak  $x \in D_f$ . Število  $m$  imenujemo *spodnja meja*.

$$\exists m \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni f(x) \geq m$$

#### Omejenost

Funkcija  $f$  je **omejena**, če je navzgor omejena in navzdol omejena.

$$\exists m, M \in \mathbb{R}. \forall x \in D_f \ni f(x) \in [m, M]$$

#### Neomejenost navzgor

Funkcija  $f$  je **navzgor neomejena**, če za vsako pozitivno realno število  $M$  obstaja tak  $x \in D_f$ , da je  $f(x) > M$ .

$$\forall M \in \mathbb{R}^+. \exists x \in D_f \ni f(x) > M$$

#### Neomejenost navzdol

Funkcija  $f$  je **navzdol neomejena**, če za vsako negativno realno število  $N$  obstaja tak  $x \in D_f$ , da je  $f(x) < N$ .

$$\forall N \in \mathbb{R}^-. \exists x \in D_f \ni f(x) < N$$

#### Neomejenost

Funkcija  $f$  je **neomejena**, če je navzgor neomejena in navzdol neomejena.

### 13.1.7 Predznak funkcije

#### Pozitivnost

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **pozitivna**, če za vsak  $x \in (a, b)$  velja  $f(x) > 0$ .

$$\forall x \in (a, b) \cap D_f \ni f(x) > 0$$

#### Negativnost

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **negativna**, če za vsak  $x \in (a, b)$  velja  $f(x) < 0$ .

$$\forall x \in (a, b) \cap D_f \ni f(x) < 0$$

### 13.1.8 Sodost in lihost funkcije

#### Sodost

Funkcija  $f$  je **soda**, če za vsak  $x \in D_f$  velja  $f(-x) = f(x)$ .

$$\forall x \in D_f : f(-x) = f(x)$$

Graf sode funkcije je simetričen glede na ordinatno os.

#### Lihost

Funkcija  $f$  je **liha**, če za vsak  $x \in D_f$  velja  $f(-x) = -f(x)$ .


$$\forall x \in D_f : f(-x) = -f(x)$$

Graf lihe funkcije je simetričen glede na koordinatno izhodišče.

### 13.1.9 Konveksnost in konkavnost funkcije


#### Konveksnost

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **konveksna**, če za poljubna  $x_1, x_2 \in (a, b)$  velja, da je graf funkcije pod zveznico točk  $(x_1, f(x_1))$  in  $(x_2, f(x_2))$ .



#### Konkavnost

Funkcija  $f$  je na intervalu  $(a, b)$  **konkavna**, če za poljubna  $x_1, x_2 \in (a, b)$  velja, da je graf funkcije nad zveznico točk  $(x_1, f(x_1))$  in  $(x_2, f(x_2))$ .



**Naloga 13.1.** Za katere  $x$  je dana funkcija definirana? Zapišite definicijsko območje.

- $f(x) = \frac{1}{x}$
- $g(x) = 2x - 3$
- $h(x) = \frac{x}{x - 3}$
- $i(x) = x^2 - 2x + 1$
- $j(x) = \frac{x - 1}{x + 1}$
- $k(x) = \sqrt{x - 4}$
- $l(x) = (x - 3)^{-2}$
- $m(x) = \sqrt{3x + 4}$
- $n(x) = \frac{x - 1}{x^2 + 5x + 6}$
- $o(x) = \sqrt{3 - 6x}$


**Naloga 13.2.** Izračunajte začetno vrednost in ničle funkcije.

- $f(x) = 2x - 4$
- $g(x) = x^2 - 4$
- $h(x) = 5x + 2$
- $i(x) = \frac{x + 3}{x - 3}$
- $j(x) = (x - 1)^{-2} - 1$
- $k(x) = \frac{1}{x}$
- $l(x) = \frac{2x + 4}{2x^2 - 1}$
- $m(x) = \sqrt{x + 5}$
- $n(x) = \sqrt{2x + 6}$

**Naloga 13.3.** Narišite graf funkcije. Izračunajte ničle in začetno vrednost ter vrednosti preverite na grafu.


- $f(x) = x - 3$
- $g(x) = 2x + 1$
- $h(x) = -2x + 1$
- $p(x) = -\frac{1}{2}x + 1$
- $q(x) = \frac{2 - x}{4}$
- $r(x) = |2x - 4| - 1$

**Naloga 13.4.** Z grafa funkcije razberite, kam funkcija preslika originalne  $x = -1$ ,  $x = 0$ ,  $x = 1$  in  $x = 2$ .



**Naloga 13.5.** *Narisan je graf funkcije. Zapišite:*


- začetno vrednost funkcije,
- intervale, kjer funkcija narašča oziroma pada,
- natančno zgornjo in spodnjo mejo, če je funkcija navzgor ali navzdol omejena.




**Naloga 13.6.** *Računsko preverite, ali je dana funkcija soda ali liha.*


- |                     |                         |                                      |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| • $f(x) = 3x$       | • $i(x) = x^2 + 1$      | • $l(x) = 5x^3 - 4x + 1$             |
| • $g(x) = -3x + 1$  | • $j(x) = x^2 + 3x - 1$ | • $m(x) = \frac{x^3 - 2x}{7x^3 + x}$ |
| • $h(x) = 2 x  + 4$ | • $k(x) = x^3 + 2x$     |                                      |

**Naloga 13.7.** *Z grafa funkcije razberite, ali je funkcija soda ali liha.*






**Naloga 13.8.** Z grafa funkcije razberite, na katerih intervalih je funkcija konveksna in na katerih konkavna.



**Naloga 13.9.** Z grafa funkcije razberite, ali je realna funkcija realne spremenljivke injektivna, surjektivna, bijektivna.



## 13.2 Transformacije funkcij

### 13.2.1 Zrcaljenja

#### Zrcaljenje preko abscisne osi

Zrcaljenje preko abscisne osi vsako točko  $T(x, y)$  grafa funkcije preslika v točko  $T'(x, -y)$ .

$$Z_x : (x, y) \mapsto (x, -y)$$

Do prezrcaljene funkcije  $f$  preko abscisne osi pridemo tako, da funkcijo  $f$  pomnožimo z  $-1$

$$Z_x : f(x) \mapsto -f(x)$$

#### Zrcaljenje preko ordinatne osi

Zrcaljenje preko ordinatne osi vsako točko  $T(x, y)$  grafa funkcije preslika v točko  $T'(-x, y)$ .

$$Z_y : (x, y) \mapsto (-x, y)$$

Do prezrcaljene funkcije  $f$  preko ordinatne osi pridemo tako, da neodvisno spremenljivko  $x$  funkcije  $f$  pomnožimo z  $-1$

$$Z_y : f(x) \mapsto f(-x)$$

#### Zrcaljenje preko izhodišča

Zrcaljenje preko izhodišča vsako točko  $T(x, y)$  grafa funkcije preslika v točko  $T'(-x, -y)$ .

$$Z_i : (x, y) \mapsto (-x, -y)$$

Do prezrcaljene funkcije  $f$  preko izhodišča pridemo tako, da neodvisno spremenljivko  $x$  funkcije  $f$  in funkcijo  $f$  pomnožimo z  $-1$





$$Z_i : f(x) \mapsto -f(-x)$$

#### Absolutna vrednost funkcije

Absolutna vrednost funkcije  $f$  vse negativne vrednosti funkcije  $f$  pomnoži z  $-1$ , pozitivne vrednosti pa ohrani.

$$T_1 : f(x) \mapsto |f(x)|$$


Tisti del grafa funkcije  $f$ , ki leži pod abscisno osjo, se preslika preko abscisne osi. Del grafa, ki leži nad abscisno osjo se ohrani.





Če v funkciji  $f(x)$  neodvisno spremenljivko  $x$  nadomestimo z  $|x|$ , dobimo novo funkcijo, ki je soda.

$$T_2 : f(x) \mapsto f(|x|)$$



### 13.2.2 Premiki

#### Vzporedni premik vzdolž ordinatne osi


Vzporedni premik v smeri ordinatne osi za  $q$  vsako točko  $T(x, y)$  grafa funkcije preslika v točko  $T'(x, y + q)$ .

$$P_y : (x, y) \mapsto (x, y + q)$$

Do premaknjene funkcije  $f$  vzdolž ordinatne osi pridemo tako, da funkciji  $f$  prištejemo  $q$ .

$$P_y : f(x) \mapsto f(x) + q$$

Pri  $q > 0$  se graf premakne v pozitivni smeri ordinatne osi (navzgor), pri  $q < 0$  se graf premakne v negativni smeri ordinatne osi (navzdol).



#### Vzporedni premik vzdolž abscisne osi


Vzporedni premik v smeri abscisne osi za  $p$  vsako točko  $T(x, y)$  grafa funkcije preslika v točko  $T'(x + p, y)$ .

$$P_x : (x, y) \mapsto (x + p, y)$$

Do premaknjene funkcije  $f$  vzdolž abscisne osi pridemo tako, da neodvisni spremenljivki  $x$  funkcije odštejemo  $p$ .

$$P_x : f(x) \mapsto f(x - p)$$

Pri  $p > 0$  se graf premakne v pozitivni smeri abscisne osi (v desno), pri  $p < 0$  se graf premakne v negativni smeri abscisne osi (v levo).




### Premik za vektor

Premik za vektor  $(p, q)$  vsako točko  $T(x, y)$  grafa funkcije preslika v točko  $T'(x + p, y + q)$ .

$$P_v : (x, y) \mapsto (x + p, y + q)$$

Do premaknjene funkcije  $f$  za vektor  $(p, q)$  pridemo tako, da funkciji  $f$  prištejemo  $q$ , neodvisni spremenljivki  $x$  funkcije pa odštejemo  $p$ .

$$P_v : f(x) \mapsto f(x - p) + q$$



### 13.2.3 Raztegi

#### Razteg vzdolž ordinatne osi


Razteg za faktor  $k \in \mathbb{R}^*$  vzdolž ordinatne osi vsako točko  $T(x, y)$  grafa funkcije preslika v točko  $T'(x, ky)$ .

$$R_y : (x, y) \mapsto (x, ky)$$

Do raztegnjene funkcije  $f$  za faktor  $k \in \mathbb{R}^*$  vzdolž ordinatne osi pridemo tako, da funkcijo pomnožimo s  $k$ .

$$R_y : f(x) \mapsto kf(x)$$

Pri  $|k| > 1$  se graf funkcije raztegne pri  $|k| < 1$  pa skrči vzdolž ordinatne osi. Za  $k = 1$  se graf funkcije ohrani – identična preslikava.



#### Razteg vzdolž abscisne osi


Razteg za faktor  $k \in \mathbb{R}^*$  vzdolž abscisne osi vsako točko  $T(x, y)$  grafa funkcije preslika v točko  $T'(\frac{x}{k}, y)$ .

$$R_x : (x, y) \mapsto (\frac{x}{k}, y)$$

Do raztegnjene funkcije  $f$  za faktor  $k \in \mathbb{R}^*$  vzdolž abscisne osi pridemo tako, da neodvisno spremenljivko  $x$  funkcije  $f$  pomnožimo s  $k$ .

$$R_x : f(x) \mapsto f(kx)$$



Pri  $|k| > 1$  se graf funkcije skrči pri  $|k| < 1$  pa raztegne vzdolž abscisne osi. Za  $k = 1$  se graf funkcije ohrani – identična preslikava.



**Naloga 13.10.** V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije  $f(x)$ . Narišite graf funkcije  $g(x) = f(x) + k$  in zapišite predpis nove funkcije, ki ji pripada premaknjeni graf.



- $f(x) = 2x, k = 2$

- $f(x) = x^2, k = 2$



- $f(x) = |x - 2| + 2, k = -3$

- $f(x) = -x^2 + 4x, k = -2$



**Naloga 13.11.** Graf funkcije  $f$  togo premaknemo za  $k$  navzgor ali navzdol in dobimo graf funkcije  $g$ . Zapišite predpis funkcije  $g$ .


- $f(x) = 4x - 1$ , togi premik za 3 navzgor
- $f(x) = -2x + 3$ , togi premik za 1 navzdol
- $f(x) = \frac{5-x}{2}$ , togi premik za 4 navzgor
- $f(x) = \sqrt{x-1}$ , togi premik za 7 navzdol

**Naloga 13.12.** Graf funkcije  $f$  togo premaknemo za  $k$  v levo ali desno in dobimo graf funkcije  $g$ . Zapišite predpis funkcije  $g$ .


- $f(x) = 4x - 1$ , togi premik za 3 v levo
- $f(x) = -2x + 3$ , togi premik za 1 v desno
- $f(x) = \frac{5-x}{2}$ , togi premik za 4 v desno
- $f(x) = \sqrt{x-1}$ , togi premik za 7 v levo

**Naloga 13.13.** V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije  $f(x)$ . Narišite graf funkcije  $g(x) = f(x - k)$  in zapišite predpis nove funkcije, ki ji pripada premaknjeni graf.


- $f(x) = 2x$ ,  $k = -2$




- $f(x) = x^2$ ,  $k = 2$



- $f(x) = |x - 2| + 2$ ,  $k = 2$




- $f(x) = -x^2 + 4x$ ,  $k = 3$




**Naloga 13.14.** V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije  $f(x)$ . Narišite graf funkcije  $g(x) = -f(x)$  in zapišite predpis funkcije  $g(x)$ .


- $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$




- $f(x) = |x - 3| - 2$



- $f(x) = x^3 - 4x$




- $f(x) = \sqrt{x}$




**Naloga 13.15.** V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije  $f(x)$ . Narišite graf funkcije  $g(x) = f(-x)$  in zapišite predpis funkcije  $g(x)$ .


- $f(x) = \frac{1}{2}x - 2$




- $f(x) = x^3 - 4x$



- $f(x) = |x - 3| - 2$



- $f(x) = \sqrt{x}$



**Naloga 13.16.** Če graf funkcije  $f$  prezrcalimo čez abscisno os, dobimo graf funkcije  $g$ . Če pa graf funkcije  $f$  prezrcalimo čez ordinatno os, dobimo graf funkcije  $h$ . Zapišite predpisa funkcije  $g$  in funkcije  $h$ .



- $f(x) = 4x - 1$
- $f(x) = -2x + 2$
- $f(x) = \frac{5-x}{2}$
- $f(x) = \sqrt{x-1}$
- $f(x) = x^2 - 3x$

**Naloga 13.17.** Dan je predpis funkcije  $f(x)$ . Če graf funkcije premaknemo in zrcalimo po navodilu, dobimo graf funkcije  $g$ . Zapišite predpis funkcije  $g(x)$ .



- $f(x) = 2x - 1$ , togi premik za 5 v desno in za 2 navzdol
- $f(x) = -3x + 5$ , togi premik za 4 v levo in za 3 navzgor
- $f(x) = |x| + 1$ , togi premik za 3 v desno in za 1 navzdol
- $f(x) = -2x + 1$ , zrcaljenje čez abscisno os
- $f(x) = 4x - 1$ , zrcaljenje čez ordinatno os
- $f(x) = -7x - 6$ , togi premik za 2 v desno in za 3 navzdol, zrcaljenje čez abscisno os
- $f(x) = x^2 - 1$ , togi premik za 2 v desno in za 1 navzdol
- $f(x) = -x^3 + 2x - 1$ , togi premik za 1 v levo in za 2 navzgor
- $f(x) = 3x^2 - 7$ , zrcaljenje čez abscisno os
- $f(x) = -2x^2 + 3$ , zrcaljenje čez ordinatno os
- $f(x) = x^{-2}$ , togi premik za 2 v desno in za 1 navzdol
- $f(x) = (x-1)^{-2} + 1$ , togi premik za 1 v levo in za 1 navzdol

**Naloga 13.18.** V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije  $f(x)$ . Narišite grafa funkcij  $g(x) = |f(x)|$  in  $h(x) = f(|x|)$ .

- $f(x) = 2x - 3$
- $f(x) = \sin x$





- $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x - 4$
- $f(x) = (x-3)^{-2} - 2$



**Naloga 13.19.** V koordinatnem sistemu je narisana graf funkcije  $f(x)$ . Narišite grafa funkcij  $g(x) = kf(x)$  in  $h(x) = f(kx)$  ter zapišite njuna predpisa.

•  $f(x) = x + 2, k = 2$

•  $f(x) = x^2 - 2x - 6, k = \frac{1}{2}$




**Naloga 13.20.** Graf funkcije  $f$  raztegnemo ali skrčimo za faktor  $k$  v smeri abscisne ali ordinatne osi. Dobimo graf funkcije  $g$ . Zapišite predpis funkcije  $g$ .

- $f(x) = 4x - 1$ , razteg v smeri ordinatne osi za faktor 2
- $f(x) = -2x + 3$ , skrčitev v smeri abscisne osi za faktor 2 in zrcaljenje čez abscisno os
- $f(X) = \frac{5-x}{2}$ , razteg v smeri ordinatne osi za faktor 4
- $f(x) = \sqrt{x-1}$ , skrčitev v smeri abscisne osi za faktor 2

**Naloga 13.21.** Če graf funkcije  $f$  transformiramo po navodilu, dobimo graf funkcije  $g$ . Zapišite predpis funkcije  $g$ .

- $f(x) = 5x - 1$ , togi premik za 4 v desno, zrcaljenje čez abscisno os
- $f(x) = 6 - 3x$ , razteg za faktor 2 v smeri ordinatne osi in togi premik za 4 navzgor
- $f(x) = 7x + 2$ , zrcaljenje čez abscisno in čez ordinatno os
- $f(X) = -4x + 1$ , skrčitev za faktor 2 v smeri abscisne osi in togi premik za 3 v levo
- $f(x) = 2x + 3$ , razteg v smeri abscisne osi za faktor 2 in zrcaljenje čez abscisno os
- $f(x) = x^2$ , togi premik za 3 v levo in 2 navzgor
- $f(x) = x^3$ , togi premik za 2 v desno, zrcaljenje čez ordinatno os
- $f(X) = \frac{x}{x+1}$ , togi premik za 2 v levo in za 5 navzgor
- $f(x) = \frac{x}{x+1}$ , zrcaljenje čez abscisno in čez ordinatno os




**Naloga 13.22.** Narisan je graf funkcije  $f(x) = x^2 - 2x - 4$ .



- Narišite graf funkcije  $g(x) = f(x - 3) + 2$  in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije  $h(x) = |f(x + 4)|$  in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije  $i(x) = f(|x|) + 2$  in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije  $j(x) = f(-x) + 2$  in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije  $k(x) = -\frac{1}{2}f(x)$  in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije  $l(x) = f(\frac{1}{2}x)$  in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije  $m(x) = |f(2x)|$  in zapišite predpis funkcije.
- Narišite graf funkcije  $n(x) = -f(-x)$  in zapišite predpis funkcije.

**Naloga 13.23.** Narisan je graf funkcije  $f(x)$ .

- |                                                                           |                                                                           |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| • Narišite graf funkcije $g(x) = f(-x) + 4$ in zapišite predpis funkcije. | • Narišite graf funkcije $h(x) = -f(x) + 4$ in zapišite predpis funkcije. | • Narišite graf funkcije $e(x) = f(x - 3) - 4$ in zapišite predpis funkcije. |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|





### 13.3 Inverzna funkcija

Naj bo  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  bijektivna funkcija, ki vsakemu originalu  $x \in \mathcal{X}$  priredi sliko  $y = f(x) \in \mathcal{Y}$ . **Inverzna funkcija**  $f^{-1}$  je funkcija, ki slika iz množice  $\mathcal{Y}$  v množico  $\mathcal{X}$  in sliki  $y$  priredi original  $x$ :  $f^{-1}(y) = x$ .

$$\begin{array}{ll} f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y} & f^{-1} : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X} \\ f : x \mapsto y & f^{-1} : y \mapsto x \end{array}$$

Definicijsko območje funkcije  $f^{-1}$  je množica  $\mathcal{Y}$ , njena zaloga vrednosti pa množica  $\mathcal{X}$ .

Graf inverzne funkcije  $f^{-1}$  je simetričen grafu funkcije  $f$  glede na simetralo lihih kvadrantov  $y = x$ . Če je točka  $T(x_0, y_0) \in \Gamma_f$ , potem je točka  $T'(y_0, x_0) \in \Gamma_{f^{-1}}$ .

Inverzna funkcija  $f^{-1} : \mathcal{Y} \rightarrow \mathcal{X}$  funkcije  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  obstaja natanko tedaj, ko je funkcija  $f$  bijektivna.

Če je funkcija  $f : \mathcal{X} \rightarrow \mathcal{Y}$  injektivna, ni pa surjektivna, obstaja inverzna funkcija  $f^{-1} : Z_f \rightarrow \mathcal{X}$  in je  $Z_f \subset \mathcal{Y}$ .


**Naloga 13.24.** Linearni funkciji zapišite predpis inverzne funkcije.

- $f(x) = -4x + 2$
- $h(x) = 3x - \frac{7}{4}$
- $j(x) = \frac{x+5}{3}$
- $g(x) = 2x - 1$
- $i(x) = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}$

**Naloga 13.25.** Bijektivni funkciji zapišite funkcijski predpis inverzne funkcije.

- $f(x) = x^3$
- $i(x) = 5x + 27$
- $l(x) = \frac{x+1}{x-7}$
- $g(x) = x^5 - 2$
- $j(x) = (x+5)^3$
- $m(x) = \frac{3x-2}{x+1}$
- $h(x) = (x-1)^3$
- $k(x) = x^3 + 5$
- $n(x) = \frac{5x-3}{4x-1}$

**Naloga 13.26.** Grafu bijektivne funkcije na sliki narišite graf inverzne funkcije.





Poglavje 14

Potenčna funkcija

## 14.1 Potenčna funkcija z naravnim eksponentom


**Potenčna funkcija z naravnim eksponentom** je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom

$$f(x) = x^n; \quad n \in \mathbb{R}.$$

$$f(x) = x$$


$$g(x) = x^2 \quad k(x) = x^4$$

$$h(x) = x^3 \quad l(x) = x^5$$




### Lastnosti potenčnih funkcij z naravnim sodim eksponentom

- $D_f = \mathbb{R}$  in  $Z_f = [0, \infty)$
- Graf je parabola sode stopnje.
- Vse parabole potekajo skozi točke  $T_0(0,0)$ ,  $T_1(1,1)$  in  $T_2(-1,1)$ .
- So padajoče za  $x \in (-\infty, 0)$  in naraščajoče za  $x \in (0, \infty)$ .
- So sode – grafi so simetrični glede na  $y$ -os.
- So konveksne.
- Imajo večkratno ničlo sode stopnje  $x = 0$ .
- Imajo teme v točki  $T_0(0,0)$ .



### Lastnosti potenčnih funkcij z naravnim lihim eksponentom, večjim od 1

- $D_f = \mathbb{R}$  in  $Z_f = \mathbb{R}$
- Graf je parabola lihe stopnje.
- Vse parabole potekajo skozi točke  $T_0(0,0)$ ,  $T_1(1,1)$  in  $T_3(-1,-1)$ .
- So naraščajoče za vse  $x \in \mathbb{R}$ .
- So lihe – grafi simetrični glede na koordinatno izhodišče.
- So konveksne za  $x \in (0, \infty)$  in konkavne za  $x \in (-\infty, 0)$ .
- Imajo večkratno ničlo lihe stopnje  $x = 0$ .
- So bijektivne.



**Naloga 14.1.** Katere izmed točk  $(1, 27)$ ,  $(-1, 9)$ ,  $(10, 157)$  ležijo na grafu funkcije  $f(x) = 2(x - 3)^4 - 5$ ?

**Naloga 14.2.** Dana je funkcija  $f(x) = x^3$ . Zapišite predpis za funkcijo  $g$ , katere graf je premaknjen:

- za 2 v levo in za 3 navzgor;
- za 3 v desno in za 2 navzgor;
- za 1 v levo in za 5 navzdol;
- za 4 v desno in za 1 navzdol.


**Naloga 14.3.** Dana je funkcija  $f(x) = (x + 3)^3 + 1$ . Zapišite predpis za funkcijo  $g$ , katere graf je premaknjen:

- za 2 v levo in za 3 navzgor;
- za 3 v desno in za 2 navzgor;
- za 1 v levo in za 5 navzdol;
- za 4 v desno in za 1 navzdol;
- za 1 v desno in za 3 navzdol;
- za 5 v levo in za 4 navzdol.


**Naloga 14.4.** Graf funkcije  $g$  smo dobili s togim premikom grafa funkcije  $f(x) = x^2$ . Zapišite vektor premika. Narišite graf. V kateri točki ima funkcija  $g$  teme?

- $g(x) = (x - 3)^2 + 1$
- $g(x) = (x - 2)^2 - 1$
- $g(x) = (x + 3)^2 + 4$
- $g(x) = (x + 1)^2 - 5$

**Naloga 14.5.** Z grafa funkcije  $f(x) = (x + a)^n + b$  razberite vrednosti parametrov  $a$ ,  $b$  in  $n$ .




**Naloga 14.6.** Z grafa funkcije  $f(x) = (x + a)^n + b$  razberite vrednosti parametrov  $a$ ,  $b$  in  $n$ .




**Naloga 14.7.** Narišite graf funkcije  $f$ , potem pa v isti koordinatni sistem še graf funkcije  $g$ .

- $f(x) = x^3$ ,  $g(x) = \frac{1}{2}x^3$
- $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = -2x^2$
- $f(x) = x^4$ ,  $g(x) = -x^4$
- $f(x) = x^3$ ,  $g(x) = |2x^3|$

**Naloga 14.8.** Z grafa funkcije  $f(x) = a(x - p)^2 + q$  razberite vrednosti parametrov  $a$ ,  $p$  in  $q$ .



**Naloga 14.9.** Z grafa funkcije  $f(x) = a(x - p)^3 + q$  razberite vrednosti parametrov  $a$ ,  $p$  in  $q$ .



**Naloga 14.10.** Izračunajte presečišče grafa dane funkcije  $f$  in dane premice.

- $f(x) = (x - 3)^2 - 2$  in  $y = -2x + 4$
- $f(x) = 2(x - 1)^2 + 4$  in  $y = 6$
- $f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3$  in  $y = x - 1$

**Naloga 14.11.** Izračunajte presečišče grafov danih funkcij  $f$  in  $g$ .

- $f(x) = (x - 3)^2$  in  $g(x) = x^2 + 3$
- $f(x) = (x - 3)^2 - 2$  in  $g(x) = (x - 4)^2 + 1$
- $f(x) = -x^2 + 2$  in  $g(x) = (x - 1)^2 + 1$

**Naloga 14.12.** Naj bo prvič funkcija  $f$  dana s predpisom  $f(x) = x^2$ , drugič pa s  $f(x) = x^3$ . Zapišite predpis funkcije  $g$  za oba primera in narišite oba grafa.

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| • $g(x) = f(x - 2)$     | • $g(x) = -f(x) + 1$     |
| • $g(x) = f(x + 1)$     | • $g(x) = -f(x - 2) + 1$ |
| • $g(x) = f(x) + 1$     | • $g(x) =  f(x) - 1 $    |
| • $g(x) = f(x) - 2$     | • $g(x) = 2f(x)$         |
| • $g(x) = f(x + 1) - 3$ | • $g(x) = f( x ) + 1$    |

## 14.2 Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom

**Potenčna funkcija z negativnim celim eksponentom** je realna funkcija realne spremenljivke, podana s predpisom


$$f(x) = x^{-n} = \frac{1}{x^n}; \quad n \in \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

$$f(x) = x^{-1}$$

$$g(x) = x^{-2}$$


$$h(x) = x^{-3}$$

$$k(x) = x^{-4}$$




### Lastnosti potenčnih funkcij z negativnim sodim eksponentom

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- $Z_f = (0, \infty)$
- Grafi potekajo skozi točki  $T_1(1,1)$  in  $T_2(-1,1)$ .
- So naraščajoče za  $x \in (-\infty, 0)$  in padajoče za  $x \in (0, \infty)$ .
- So sode – grafi so simetrični glede na ordinatno os.
- So konveksne za  $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ .
- Nimajo ničel.
- $x = 0$  je navpična asimptota,  $y = 0$  je vodoravna asimptota.



### Lastnosti potenčnih funkcij z negativnim lihim eksponentom

- $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- $Z_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$
- Grafi potekajo skozi točki  $T_1(1,1)$  in  $T_3(-1,-1)$ .
- So padajoče za  $x \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$ .
- So lihe – grafi so simetrični glede na koordinatno izhodišče.
- So konkavne za  $x \in (-\infty, 0)$  in konveksne za  $x \in (0, \infty)$ .
- Nimajo ničel.
- $x = 0$  je navpična asimptota,  $y = 0$  je vodoravna asimptota.



**Naloga 14.13.** Katere izmed točk  $(0, 5)$ ,  $(-1, \frac{11}{4})$ ,  $(2, -5)$  ležijo na grafu funkcije  $f(x) = 2(x-1)^{-3} + 3$ ?

**Naloga 14.14.** Naj bo  $f(x) = x^{-2}$ . Če graf funkcije  $f$  premaknemo po navodilu, dobimo graf funkcije  $g$ . Zapišite predpis funkcije  $g$ , njeno definicijsko območje, zalogo vrednosti, enačbi navpične in vodoravne asimptote, izračunajte ničle ter začetno vrednost in narišite njen graf.

- prmeik za 2 v levo in za 3 navzdol
- premik za 2 v desno in za 1 navzdol
- premik za 1 v desno in za 2 navzgor
- premik za 2 v levo in zrcaljenje čez ordinatno os
- premik za 2 v levo in zrcaljenje čez abscisno os
- premik za 2 navzgor, razteg za faktor 0.5 in zrcaljenje čez abscisno os

**Naloga 14.15.** Naj bo  $f(x) = x^{-3}$ . Če graf funkcije  $f$  premaknemo po navodilu, dobimo graf funkcije  $g$ . Zapišite predpis funkcije  $g$ , njeno definicijsko območje, zalogo vrednosti, enačbi navpične in vodoravne asimptote, izračunajte ničle ter začetno vrednost in narišite njen graf.

- za 2 v levo in za 3 navzdol
- za 2 v desno in za 1 navzdol
- za 1 v levo in za 2 navzgor
- za 2 v levo in zrcaljenje čez abscisno os
- za 2 v levo in zrcaljenje čez ordinatno os
- za 3 navzdol in zrcaljenje čez abscisno os
- premik za 1 navzgor in zrcaljenje čez koordinatno izhodišče

**Naloga 14.16.** Graf funkcije  $g$  smo dobili s togim premikom grafa funkcije  $f(x) = x^{-2}$ . Zapišite vektor premika ter enačbi navpične in vodoravne asimptote.

- $g(x) = (x-3)^{-2} + 1$
- $g(x) = (x-2)^{-2} - 1$
- $g(x) = (x+3)^{-2} + 4$
- $g(x) = (x+1)^{-2} - 5$

**Naloga 14.17.** Izračunajte presečišče grafa dane funkcije  $f$  in dane premice.

- $f(x) = (x-3)^{-1} - 2$  in  $y = -1$
- $f(x) = 2(x-1)^{-2} + 4$  in  $y = 6$
- $f(x) = -\frac{1}{2}x^{-2} + 3$  in  $y = 1$

**Naloga 14.18.** Naj bo  $f(x) = x^{-1}$ . Zapišite predpis funkcije  $g$  in narišite njen graf.

- $g(x) = f(x-2)$
- $g(x) = f(x+1)$
- $g(x) = f(x) + 1$
- $g(x) = f(x) - 2$
- $g(x) = f(x+2) - 1$
- $g(x) = -f(x) + 1$
- $g(x) = -f(x-2) + 1$
- $g(x) = |f(x) - 1|$
- $g(x) = 2f(x)$
- $g(x) = f(|x|) + 1$

**Naloga 14.19.** Naj bo  $f(x) = x^{-2}$ . Zapišite predpis funkcije  $g$  in narišite njen graf.





- $g(x) = f(x-2)$
- $g(x) = f(x+1)$
- $g(x) = f(x) + 1$
- $g(x) = f(x) - 2$
- $g(x) = f(x+2) - 3$
- $g(x) = -f(x) + 1$
- $g(x) = -f(x-2) + 1$
- $g(x) = |f(x) - 1|$
- $g(x) = 2f(x)$
- $g(x) = f(|x|) + 1$

**Naloga 14.20.** Dana je funkcija  $f(x)$ . Narišite graf funkcije  $g(x)$ .

- $f(x) = x^{-1}$ ,  $g(x) = -f(x)$
- $f(x) = x^{-2}$ ,  $g(x) = 0.5f(x)$
- $f(x) = x^2$ ,  $g(x) = -f(x-1)$
- $f(x) = x^3$ ,  $g(x) = -2f(x)$
- $f(x) = x^{-2}$ ,  $g(x) = 2f(x+1)$
- $f(x) = x^{-1}$ ,  $g(x) = 3f(x-2) - 1$
- $f(x) = x^3$ ,  $g(x) = 2f(x+1) + 3$



**Naloga 14.21.** Graf ene od potenčnih funkcij ( $x^2$ ,  $x^3$ ,  $x^{-1}$ ,  $x^{-2}$ ) smo raztegnili v smeri ordinatne osi in ga premaknili v smeri abscisne ter ordinatne osi in tako dobili graf na sliki. Zapišite funkcijo, katere graf je narisani. Z grafa razberite, če je mogoče, definicijsko območje, ničle, začetno vrednost in interval, kjer funkcija narašča. Ali je funkcija injektivna?






## Poglavje 15

# Korenska funkcija

### 15.1 Korenska funkcija z lihim korenskim eksponentom

Vse potenčne funkcije z lihim naravnim eksponentom  $f(x) = x^{2k+1}; k \in \mathbb{N}$  so bijektivne, zato jim lahko priredimo inverzne funkcije – to so **korenske funkcije z lihim korenskim eksponentom**, podane s predpisom

$$f^{-1}(x) = \sqrt[2k+1]{x}; \quad k \in \mathbb{N}.$$




#### Lastnosti korenskih funkcij z lihim korenskim eksponentom

- $D_f = \mathbb{R}; Z_f = \mathbb{R}$
- So naraščajoče za vse  $x \in \mathbb{R}$ .
- Grafi potekajo skozi točke  $T_0(0,0)$ ,  $T_1(1,1)$  in  $T_2(-1,-1)$ .
- So negativne za  $x \in (-\infty, 0)$  in pozitivne za  $x \in (0, \infty)$ .
- So neomejene.
- So lihe – grafi so simetrični glede na koordinatno izhodišče.
- So konveksne za  $x \in (-\infty, 0)$  in konkavne za  $x \in (0, \infty)$ .
- Imajo ničlo pri  $x = 0$ .
- Tangenta na krivuljo v ničli je  $y$ -os.

### 15.2 Korenska funkcija s sodim korenskim eksponentom

Potenčne funkcije s sodim naravnim eksponentom  $f(x) = x^{2k}; k \in \mathbb{N}$  niso bijektivne. Če jim hočemo prirediti inverzne funkcije, moramo skrajšati definicijsko območje na interval  $[0, \infty)$ . Tako dobimo **korenske funkcije s sodim korenskim eksponentom**, podane s predpisom

$$f^{-1}(x) = \sqrt[2k]{x}; \quad k \in \mathbb{N}.$$



#### Lastnosti korenskih funkcij s sodim korenskim eksponentom

- $D_f = [0, \infty); Z_f = [0, \infty)$
- So naraščajoče za vse  $x \in \mathbb{R}$ .
- Grafi potekajo skozi točki  $T_0(0,0)$  in  $T_1(1,1)$ .
- So pozitivne za vse  $x \in (0, \infty)$ .
- So navzdol omejene z  $y = 0$  in navzgor neomejene.
- So konkavne za  $x \in (0, \infty)$ .
- Imajo ničlo pri  $x = 0$ .
- Tangenta na krivuljo v ničli je  $y$ -os.


**Naloga 15.1.** Zapišite definicijsko območje funkcije, izračunajte ničlo in začetno vrednost funkcije ter narišite njen graf.

- $f(x) = \sqrt{x+2}$
- $g(x) = \sqrt{x-2}$
- $h(x) = \sqrt{x-1} - 3$
- $i(x) = \sqrt{-x}$
- $j(x) = \sqrt{2x-1}$
- $k(x) = 2\sqrt{x+4}$
- $l(x) = \sqrt{8-4x}$
- $m(x) = 1 - \sqrt{4-2x}$
- $n(x) = -\sqrt[3]{x}$
- $o(x) = \sqrt[3]{x-2}$
- $p(x) = \sqrt[3]{x} + 1$
- $q(x) = \sqrt[3]{x-1} - 2$
- $r(x) = \sqrt[3]{|x-2|}$
- $s(x) = |\sqrt{x-1}|$

**Naloga 15.2.** Zapišite predpis za funkcijo, katere graf dobimo, če krivuljo  $y = \sqrt{x}$  premaknemo in raztegnemo ali skrčimo po navodilih.

- Togo premaknemo za 3 v desno in 1 navzdol.
- Togo premaknemo za 2 v levo in jo skrčimo za faktor 5 v smeri ordinatne osi.
- Togo premaknemo za 4 navzdol in jo zrcalimo čez abscisno os.
- Togo premaknemo za 3 navzgor in jo zrcalimo čez ordinatno os.

**Naloga 15.3.** Zapišite predpis funkcije, katere graf je na sliki.



**Naloga 15.4.** Zapišite predpis inverzne funkcije dani funkciji.

- $f : [0, \infty) \rightarrow (-\infty, 3]$   
 $x \mapsto -x^2 + 3$
- $g : [-9, \infty) \rightarrow [-4, \infty)$   
 $x \mapsto (x+9)^2 - 4$
- $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto (2x-11)^3 + 5$
- $i : [23, \infty) \rightarrow [-31, \infty)$   
 $x \mapsto 3(x-23)^2 - 31$
- $j : [-1, \infty) \rightarrow [-8, \infty)$   
 $x \mapsto \sqrt{x+1} - 8$
- $k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto \sqrt[3]{x-1} - 7$
- $l : [-0.5, \infty) \rightarrow [0, \infty)$   
 $x \mapsto 3\sqrt{2x+1}$
- $m : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$   
 $x \mapsto 5\sqrt[3]{7x+12} - 1$

## Poglavje 16

# Kvadratna funkcija

### 16.1 Kvadratna funkcija v splošni in temenski obliki

**Naloga 16.1.** *Narišite graf funkcije, zapišite koordinati temena in začetno vrednost funkcije.*

- $f(x) = 2x^2$
- $g(x) = -\frac{1}{4}x^2$
- $h(x) = x^2 + 2$
- $i(x) = x^2 - 1$
- $j(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2$
- $k(x) = -2x^2 + 1$
- $l(x) = (x - 2)^2$
- $m(x) = (x + 1)^2$
- $n(x) = -2(x + 1)^2$
- $o(x) = \frac{1}{2}(x + 4)^2$

**Naloga 16.2.** *Graf  $y = x^2$  transformiramo po navodilu. Zapišite predpis funkcije v splošni obliki, katere graf je transformiran po navodilu. Določite koordinati temena. Zapišite zalogo vrednosti določene funkcije.*

- Togi premik za vektor  $\vec{v} = (-2, 3)$ .
- Togi premik za vektor  $\vec{v} = (-1, -0.5)$ .
- Togi premik za vektor  $\vec{v} = (0, 1)$  in razteg za faktor 2 v smeri ordinatne osi.
- Togi premik za vektor  $\vec{v} = (1, 3)$  in zrcaljenje čez abscisno os.
- Togi premik za vektor  $\vec{v} = (2, 0)$  in zrcaljenje čez ordinatno os.
- Togi premik za vektor  $\vec{v} = (-1, -2)$ , skrčitev za faktor 2 v smeri ordinatne osi in zrcaljenje čez abscisno os.

**Naloga 16.3.** *Izračunajte teme kvadratne funkcije in njen predpis zapišite v temenski obliki.*

- $f(x) = 2x^2 - 12x + 19$
- $g(x) = -x^2 - 2x + 2$
- $h(x) = -3x^2 - 12x - 13$
- $i(x) = \frac{1}{2}x^2 - 4x + 7$
- $j(x) = \frac{1}{3}x^2 + 4x + 10$
- $k(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 3x - 4$

**Naloga 16.5.** *Za kateri vektor v smeri abscisne osi moramo premakniti dano parabolo, da bo dobljena krivulja graf sode funkcije? Zapišite njeno enačbo.*

- $y = 2x^2 - 12x + 17$
- $y = -x^2 - 6x - 5$
- $y = \frac{1}{2}x^2 - 2x + 3$
- $y = -\frac{3}{4}x^2 - 12x - 13$

**Naloga 16.4.** *Izračunajte teme parabole  $y = 3x^2 + 6x + 5$ . Parabolo premaknemo za vektor  $\vec{v} = (3, -1)$ . Zapišite splošno enačbo premaknjene parabole in določite njeno teme.*

**Naloga 16.6.** *Zapišite simetrijsko os in teme parabole.*

- $y = 5x^2 - 40x + 90$
- $y = -2x^2 - 12x + 1$
- $y = -\frac{5}{6}x^2 - 3\frac{1}{3}x$
- $y = \frac{2}{3}x^2 - \frac{3}{4}x + \frac{1}{7}$

**Naloga 16.7.** *Zapišite splošno obliko enačbe parabole, ki:*

- ima teme v točki  $T(3, -2)$  in poteka skozi točko  $A(1, 6)$ .
- ima teme v točki  $T(1, 5)$  in seka ordinatno os pri 4.
- ima teme v točki  $T(-2, 3)$  in na njej leži točka  $B(-1, 0)$ .
- ima teme v točki  $T(0.5, -0.75)$  in gre skozi koordinatno izhodišče.

**Naloga 16.8.** *Zapišite enačbo parabole, ki gre skozi točke  $A$ ,  $B$  in  $C$ . Ali točka  $D$  leži na tej paraboli?*

- $A(1, -3)$ ,  $B(0, -7)$ ,  $C(-1, -13)$  in  $D(2, -1)$
- $A(1, 0)$ ,  $B(2, 3)$ ,  $C(-1, 6)$  in  $D(0, 1)$
- $A(1, 3)$ ,  $B(0.5, 5)$ ,  $C(0, 5)$  in  $D(3, 10)$

**Naloga 16.9.** *Dana je družina parabol  $y = (k + 1)x^2 + 2x + 1$ . Za katero vrednost parametra  $k$  bo:*

- abscisa temena  $x = \frac{1}{3}$ ?
- teme ležalo na abscisni osi?
- premica  $x = -2$  simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici  $y = x + 1$ ?
- parabola sekala ordinatno os pri 1?

**Naloga 16.10.** Dana je družina parabol  $y = mx^2 - 3x + (m + 1)$ . Za katero vrednost parametra  $m$  bo:

- abscisa temena  $x = 6$ ?
- parabola sekala ordinatno os pri 3?
- premica  $x = 3$  simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici  $y = 1$ ?

**Naloga 16.12.** Dana je funkcija  $f(x) = 2(x - 1)^2 - 2$ . Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

**Naloga 16.11.** Dana je kvadratna funkcija  $f(x) = (x - 2)^2 + 1$ . Zapišite njen predpis v splošni obliki. Zapišite predpis funkcije, ki jo dobimo pri:

- zrcaljenju čez abscisno os.
- zrcaljenju čez ordinatno os.
- zrcaljenju čez koordinatno izhodišče.

**Naloga 16.13.** Dana je funkcija  $f(x) = \frac{1}{2}(x - 3)^2 - \frac{3}{2}$ . Narišite grafe:

- $y = f(x)$
- $y = |f(x)|$
- $y = f(|x|)$
- $y = -f(x)$
- $y = f(-x)$

## 16.2 Ničle kvadratne funkcije in rešitve kvadratne enačbe



**Naloga 16.14.** *Rešite kvadratno enačbo.*

- $x^2 - 14x + 24 = 0$
- $-x^2 + 10x + 39 = 0$
- $2x^2 + 24x + 70 = 0$
- $\frac{1}{2}x^2 + x - 60 = 0$
- $x^2 - 10x + 25 = 0$
- $x^2 - 9 = 0$
- $3x^2 - 2x = 2x^2 - 35 - 14x$
- $x^2 - 10x = 36 - x^2 + 4x$
- $x^2 - 10x = 5x - 2x^2$
- $70 + x^2 - x = 2x^2 - 2x - 2$
- $2x^2 - 10x = 5x + x^2$
- $3x^2 - 4x = 25 - 4x + 2x^2$

**Naloga 16.15.** *Rešite kvadratno enačbo.*

- $4x^2 + 5x - 6 = 0$
- $12x^2 + 11x + 2 = 0$
- $3x^2 + 10x - 8 = 0$
- $x^2 - 6x + 2 = 0$

**Naloga 16.16.** *Rešite enačbo.*

- $2x^3 - 5x^2 - 3x = 0$
- $(2x - 1)^2 - 5(2x - 1) + 6 = 0$
- $\frac{1}{x} - \frac{1}{x+2} = \frac{2}{15}$

**Naloga 16.17.** *Izračunajte ničli kvadratne funkcije in jo zapišite v faktorizirani obliki.*

- $f(x) = 2x^2 - x - 1$
- $g(x) = 4x^2 + 2x + 2$
- $h(x) = -3x^2 - 4x + 4$
- $i(x) = 8x^2 - 2x - 3$

**Naloga 16.18.** *V splošni obliki zapišite predpis kvadratne funkcije, ki:*

- ima ničli  $x_1 = -2$  in  $x_2 = 3$  ter začetno vrednost  $f(0) = -12$ .
- ima ničli  $x_1 = 1$  in  $x_2 = 3$ , največja vrednost, ki jo zavzame je 5.
- ima ničli  $x_1 = -7$  in  $x_2 = 1$ ,  $x = 1$  pa preslika v  $y = 4$ .
- ima dvojno ničlo  $x_{1,2} = -3$  in začetno vrednost  $i(0) = 3$ .

**Naloga 16.19.** *Zapišite enačbo parabole, ki:*

- seka abscisno os v  $x_1 = -1$  in  $x_2 = 4$ , ordinatno os pa pri 8.
- seka abscisno os v  $x_1 = -1$  in  $x_2 = 5$ , teme pa leži na premici  $y = 9$ .
- seka abscisno os v  $x_1 = 4$  in  $x_2 = 7$ , gre skozi točko  $A(2, 20)$ .
- seka abscisno os v  $x_1 = -2$  in  $x_2 = -6$ , zaloga vrednosti pa je  $(-\infty, 2]$ .

**Naloga 16.20.** *V faktorizirani obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:*

- teme v točki  $T(7, -3)$  in ničlo  $x_1 = 6$ .
- teme v točki  $T(1, 9)$  in ničlo  $x_1 = -2$ .
- teme v točki  $T(3, -4)$  in ničlo  $x_1 = -1$ .

**Naloga 16.21.** *V temenski obliki zapišite kvadratno funkcijo, ki ima:*

- ničli  $x_1 = -5$  in  $x_2 = 3$ , teme pa v točki  $T(x, 32)$ .
- ničli  $x_1 = -\frac{1}{2}$  in  $x_2 = \frac{5}{2}$ , teme pa v točki  $T(x, -9)$ .
- ničli  $x_1 = -4$  in  $x_2 = 2$ , teme pa v točki  $T(x, 18)$ .

**Naloga 16.22.** *Dana je družina kvadratnih funkcij. Za katero vrednost parametra  $m$  ima funkcija eno dvojno ničlo? Izračunajte tudi ničlo.*

- $f(x) = 4x^2 + (m + 1)x + 1$
- $g(x) = -2x^2 + mx - x - 18$
- $h(x) = -x^2 + mx - x + m - 1$

**Naloga 16.23.** *Dana je družina parabol. Za katero vrednost parametra  $n$  se parabola dotika abscisne osi. Izračunajte dotikališče.*

- $y = 2x^2 + (n - 3)x + 2$
- $y = -4x^2 + nx - 2x - 1$

### 16.3 Kvadratna neenačba

**Naloga 16.24.** *Rešite kvadratno neenačbo.*

- $x^2 + 6x - 7 < 0$
- $x^2 - 5x + 6 > 0$
- $-x^2 + 5x - 6 > 0$
- $-2x^2 + 4x + 70 < 0$
- $x^2 + x + 1 > 0$
- $-2x^2 + 4x - 2 < 0$
- $x^2 - 13x + 12 \leq 0$
- $4x^2 - 4x + 1 \leq 0$
- $-4x^2 + 12x - 5 \geq 0$
- $2x^2 - 31x + 99 \geq 0$
- $x^2 \leq 1$
- $3x^2 + 6x + 3 \leq 0$

**Naloga 16.25.** *Določite definicijsko območje funkcije.*

- $f(x) = \sqrt{x^2 - 2x - 15}$
- $g(x) = \sqrt{-2x^2 + 5x + 3}$
- $h(x) = \sqrt{10x - 1 - 25x^2}$
- $i(x) = \sqrt{-(x^2 + 10x + 2)}$
- $j(x) = \sqrt{x^2 - 4x - 7}$

**Naloga 16.26.** *Dana je družina kvadratnih funkcij  $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$ . Za katero vrednost parametra  $m$  ima funkcija dve različni realni ničli?*

**Naloga 16.27.** *Dana je družina parabol  $y = 2x^2 + (3 - m)x + 2$ . Za katero vrednost parametra  $m$  parabola dvakrat seka abscisno os?*

**Naloga 16.28.** *Dana je družina kvadratnih funkcij  $g(x) = \frac{1}{2}x^2 + mx - 1$ . Za katero vrednost parametra  $m$  funkcija nima realnih ničel?*

**Naloga 16.29.** *Dana je družina parabol  $y = (m + 3)x^2 - mx + 2$ . Za katero vrednost parametra  $m$  parabola ne seka niti se ne dotika abscisne osi?*

## 16.4 Presečišče dveh krivulj

**Naloga 16.30.** Izračunajte skupne točke premice in parabole oziroma dveh parabol, če obstajajo.

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| • $y = x^2 + 9x + 4$   | • $y = x^2 + 5x - 2$  |
| • $y = x - 2$          | • $y = x^2 + 2x + 4$  |
| • $y = x^2 + 3x - 3$   | • $y = x^2 - 3x - 8$  |
| • $y = 5x - 4$         | • $y = -x^2 + 5x + 2$ |
| • $y = -2x^2 + 3x + 4$ | • $y = 2x^2 + 5$      |
| • $y = 2x + 1$         | • $y = x^2 + 2x + 8$  |
| • $y = x^2 - x + 2$    | • $y = x^2 + 1$       |
| • $y = -2x + 1$        | • $y = -x^2$          |

**Naloga 16.31.** Dani sta parabola  $y = x^2 - 2x + 5$  in družina premic  $y = kx - 4$ . Kateremu pogoju mora ustrezati parameter  $k$ , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališč.

**Naloga 16.32.** Dani sta družina parabol  $y = -3x^2 + mx - 142$  in premica  $y = 6x - 34$ . Kateremu pogoju mora ustrezati parameter  $m$ , da bo premica sekanta parabole?

**Naloga 16.33.** Dani sta parabola  $y = \frac{3}{5}x^2 - 3x + 4$  in družina premic  $y = kx - 11$ . Kateremu pogoju mora ustrezati parameter  $k$ , da bo premica mimobežnica? Izračunajte koordinati dotikališč.

**Naloga 16.34.** Dani sta parabola  $y = -x^2 + 7x - 1$  in družina premic  $y = 5x + n$ . Kateremu pogoju mora ustrezati parameter  $n$ , da bo premica tangenta parabole? Izračunajte koordinati dotikališča.

**Naloga 16.35.** Dani sta parabola  $y = 3x^2 - 4x - 1$  in družina premic  $y = 8x + n$ . Kateremu pogoju mora ustrezati parameter  $n$ , da bo premica sekanta parabole?

**Naloga 16.36.** Dani sta družina parabol  $y = -2x^2 + bx + 5$  in premica  $y = -4x + 7$ . Kateremu pogoju mora ustrezati parameter  $b$ , da bo premica mimobežnica?

**Naloga 16.37.** Dani sta družina parabol  $y = x^2 - mx + 3$  in parabola  $y = -2x^2 + 4x - 9$ . Kateremu pogoju mora ustrezati parameter  $m$ , da se paraboli ne bosta sekali niti dotikali?

## 16.5 Uporaba kvadratne funkcije

**Naloga 16.38.** Nogometaš je podal žogo svojemu soigralcu. Na kateri višini  $h$  se nahaja žoga, ko je horizontalno oddaljena za  $a$  od prvega igralca, lahko izračunamo po formuli

$$h(a) = -\frac{1}{10}a^2 + 2a.$$

- Koliko metrov proč od podajalca žoge pade žoga na tla?
- Koliko metrov od igralca je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga, ko je najvišje?

**Naloga 16.39.** Zavorna pot avtomobila je odvisna od mnogih dejavnikov (vrsta cestišča, kakovost pnevmatik, teža avtomobila ...), še najbolj pa od hitrosti, ki jo ima avtomobil. To odvisnost lahko izrazimo s funkcijo

$$P(v) = \frac{75}{10000}v^2 + \frac{25}{100}v,$$

kjer je  $P$  pot v metrih, ki jo naredi od začetka zaviranja do trenutka, ko se avto ustavi,  $v$  pa hitrost v km/h, ki jo ima avtomobil ob začetku zaviranja.

- Izračunajte, kolikšna je zavorna pot pri hitrosti 10 km/h, 50 km/h, 100 km/h in 150 km/h.
- Za koliko se poveča zavorna pot, če hitrost povečamo za 10 km/h: s 50 km/h na 60 km/h ali s 110 km/h na 120 km/h?
- Kolikšna je lahko največja hitrost, da se bo avto ustavil najkasneje po 8 m.

**Naloga 16.40.** Ko vratar na nogometnem igrišču brcne žogo, višino žoge opišemo s formulo

$$h(a) = -\frac{1}{25}(a - 5)(a - 65),$$

kjer je  $a$  horizontalna oddaljenost žoge od gola.

- Kako daleč od gola pade žoga na tla?
- Kako daleč od gola stoji vratar?
- Koliko metrov od gola je žoga najvišje?
- Na kateri višini je žoga takrat, ko doseže največjo višino?

**Naloga 16.41.** S pomočjo funkcije

$$d(x) = \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x$$

lahko izračunamo, koliko diagonal ima večkotnik z  $x$  oglišči ( $x$ -kotnik).

- Skicirajte graf te funkcije.
- Razložite, kako lahko iz grafa preberemo, koliko diagonal ima  $x$ -kotnik?
- S pomočjo funkcije izračunajte, koliko diagonal ima 5-kotnik in koliko 10-kotnik.

## Kvadratna funkcija – vaje

**Naloga 16.42.** Dana je funkcija  $f(x) = 2x^2 - 3$ .

- Narišite njen graf.
- Če graf premaknete za 2 v levo, dobite graf funkcije  $g$ . Zapišite predpis funkcije  $g$  v splošni obliki.
- Zapišite koordinati temena funkcije  $f$  in funkcije  $g$ .
- Narišite še grafe funkcij  $|g(x)|$ ,  $g(|x|)$  in  $-g(x)$ .

**Naloga 16.43.** Izračunajte teme parabole  $y = \frac{3}{4}x^2 - 2x + \frac{7}{2}$ .

**Naloga 16.44.** Zapišite splošno enačbo parabole, ki ima teme v točki  $T(4, 5)$  in ordinatno os seka pri  $-3$ .

**Naloga 16.45.** Dana je družina parabol  $y = mx^2 - 3x + (m + 1)$ . Za katero vrednost parametra  $m$  bo:

- abscisa temena  $x = 6$ ?
- parabola sekala ordinatno os pri 3?
- premica  $x = 3$  simetrijska os parabole?
- teme ležalo na premici  $y = 1$ ?

**Naloga 16.46.** Rešite enačbo.

- $t^2 - 2t = 0$
- $m^2 - 8m = 16$
- $2x + 3 = 2x^2$
- $8a^2 + 14a - 4 = 0$
- $z^2 + z = -1$
- $m^2 + 81 = -18m$

**Naloga 16.47.** Izračunajte ničli funkcije in predpis funkcije zapišite v faktorizirani obliki.

- $f(x) = 25x^2 - 10x + 1$
- $g(x) = x^2 - 6x + 2$
- $h(x) = -5x^2 + 3x$

**Naloga 16.48.** V splošni obliki zapišite predpis kvadratne funkcije, ki ima ničlo in teme v točki  $T(4, 0)$  in katere graf poteka skozi točko  $(5, -3)$ .

**Naloga 16.49.** V splošni obliki zapišite predpis kvadratne funkcije, ki ima teme v točki  $T(\frac{1}{2}, -6)$  in ima ničlo  $x = -3$ .

**Naloga 16.50.** Rešite neenačbo  $-x^2 + 5x + 13 > x^2 - 7 - x$ .

**Naloga 16.51.** Dana je družina kvadratnih funkcij  $f(x) = mx^2 + 4x + m - 3$ . Za katero vrednost parametra  $m$  ima funkcija dve različni realni ničli?

**Naloga 16.52.** Dani sta funkciji  $f$  in  $g$ . Na katerem intervalu leži graf funkcije  $g$  nad grafom funkcije  $f$ ?

- $f(x) = x^2 + 2x - 1$  in  $g(x) = -2x^2 - 4x - 1$
- $f(x) = 2x^2 - 12x + 20$  in  $g(x) = x^2 - 6x - 10$
- $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - x + 4$  in  $g(x) = -x^2 + 6x$
- $f(x) = -x^2 + 6x - 9$  in  $g(x) = x^2 + 2$

**Naloga 16.53.** Rešite sistem neenačb.

- $(-x^2 + 22 > 9x) \wedge (2x^2 - x + 5 < 10x)$
- $(\frac{1}{2}x^2 < -2x) \wedge (-x^2 + 4 \geq 0)$

**Naloga 16.54.** Izračunajte koordinate skupnih točk parabol  $y = -x^2 + 3x - 4$  in  $y = x^2 + 8x - 2$ , če le-te obstajajo.





## Poglavje 17

# Eksponentna funkcija

### 17.1 Eksponentna funkcija in njen graf



**Naloga 17.1.** Potenco zapišite v obliki  $ka^x$ .

- |                    |                                 |                                        |
|--------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| • $3^{x-2}$        | • $\frac{4^x}{12^x}$            | • $\frac{8^{x-1}}{2^{2x-5}}$           |
| • $5^{3-x}$        | • $\frac{6 \cdot 2^x}{3^{x+1}}$ | • $2^x \cdot \frac{4^{x+2}}{2^{2x+3}}$ |
| • $2^x \cdot 11^x$ |                                 |                                        |
| • $5^{3+2x}$       |                                 |                                        |

**Naloga 17.2.** Določite, ali je funkcija naraščajoča ali padajoča.

- |                                          |                  |                                       |
|------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|
| • $f(x) = 6^x$                           | • $f(x) = 0.5^x$ | • $f(x) = \left(\frac{3}{2}\right)^x$ |
| • $f(x) = \left(\frac{5}{2}\right)^{-x}$ | • $f(x) = 1.3^x$ | • $f(x) = e^{-x}$                     |
| • $f(x) = 4^{-x}$                        |                  |                                       |

**Naloga 17.3.** Določite osnovo  $a$ , če veste, da graf funkcije  $f(x) = a^x$  poteka skozi dano točko.

- $A(2, 9)$
- $B(-3, 64)$
- $C(2, 5)$

**Naloga 17.4.** Zapišite vrednost funkcije pri posameznih vrednostih neodvisne spremenljivke  $x$ .

- $f(x) = 3^{x-1}, f(-2), f(0), f(3)$
- $g(x) = 3 - 2^{x+1}; g(-1), g(0), g(2)$
- $h(x) = 4^{2x+3} + 1, h(-0.5), h(0), h(1)$
- $i(x) = 5 - 10^{-x+1}, i(-1), i(0), i(1)$
- $j(x) = -2^{x-1} - 2, j(-2), j(0), j(1)$
- $k(x) = 1 - 6^{2x-1}, k(-1), k(0), k(1)$

**Naloga 17.5.** Izračunajte začetno vrednost in ničlo, zapišite enačbo vodoravne asimptote in zalogo vrednosti ter narišite graf dane funkcije.

- |                                            |                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|
| • $f(x) = \left(\frac{2}{3}\right)^x + 2$  | • $l(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-3} - 4$  |
| • $g(x) = 3^x - 3$                         | • $m(x) = 3^{x+2} - 3$                         |
| • $h(x) = 2^x - 4$                         | • $n(x) = -\left(\frac{5}{2}\right)^{x+1} + 1$ |
| • $i(x) = -4^x + 2$                        | • $o(x) = -2^{-x+1} + 2$                       |
| • $j(x) = \left(\frac{1}{2}\right)^x - 2$  | • $p(x) = 4^{x+1} - 1$                         |
| • $k(x) = -\left(\frac{4}{3}\right)^x + 1$ | • $r(x) = -5^{x-2} + 1$                        |

## 17.2 Eksponentna enačba

**Naloga 17.6.** *Rešite eksponentno enačbo.*

- $5^{2-3x} = 125$
- $4^{1-2x} = 64$
- $2^{5x-2} = 32$
- $7^{4+x} = 7 \cdot 7^{2x-3}$
- $e^{3x-5} = 1$
- $8^{x^2} = 8^{3x+10}$
- $2^{-x} = 16$
- $3^{x+4} = 81$
- $9^{x-10} - 1 = 0$
- $7^{5x+10} - 7^{3x-4} = 0$
- $4^{1-x} = \left(\frac{1}{4}\right)^{2x-3}$
- $\left(\frac{2}{5}\right)^x = \left(\frac{5}{2}\right)^{-3}$
- $81^{x-4} = 9^{3x}$
- $3^{3x} = \left(\frac{1}{9}\right)^{x-10}$
- $8 \cdot 2^{x-5} - 32 = 0$
- $4^{x+3} \cdot 8^{x-3} = 128$

**Naloga 17.7.** *Rešite eksponentno enačbo.*

- $81^{2x+1} = \sqrt{3}$
- $9^{2-2x} - 27 = 0$
- $16^{x^2} - 4^2 = 0$
- $3^{4x+1} : 3^x = 243$
- $64^{3x-2} = 2\sqrt{2}$
- $625 \cdot 5^{3x+2} = 125$
- $\left(\frac{1}{8}\right)^{-x} = \left(\frac{1}{32}\right)^{1-x}$
- $27 \cdot 27^{2x-3} = 81^{3x-5}$
- $8^{x+1} = \left(\frac{1}{16}\right)^{3-2x}$
- $3^{2x+1} \cdot 3^x = 243$
- $4^{x-2} = 2^{3x+1}$
- $16^{x^2} - 2 = 0$
- $9^{x+3} = 3\sqrt{3}$
- $8^{1-5x} - 32 = 0$
- $27^x = 9^{x-2}$
- $216^x = 6^{x-2}$
- $4 \cdot e^{3x+3} = 4$
- $9^{x(x+1)} = 81$

**Naloga 17.8.** *Rešite eksponentno enačbo.*

- $3^{x+1} - 3^x = 162$
- $4^{x+1} - 8 \cdot 4^{x-1} = 32$
- $3^{x+1} + 3^x - 108 = 0$
- $2^{x-1} + 2^{x-2} + 2^{x-3} = 448$
- $4 \cdot 3^{x+1} - 3^{x+2} - 3^{x-1} = 72$
- $9^{x+2} + 5 \cdot 9^{x+1} = 14$
- $4^{x+2} - 4^x - 60 = 0$
- $6^{x+1} - 6^{x-1} - 210 = 0$
- $5^{2x+1} - 5^{x+1} = 0$

### 17.3 Eksponentna neenačba

**Naloga 17.9.** *Rešite eksponentno neenačbo.*

- $4^{x-2} > 0.125$
- $\left(\frac{1}{27}\right)^{4-x} < 9^{2x}$
- $2^{2-2x} < \left(\frac{1}{4}\right)^{2x-3}$
- $0.25^{2-x} > \frac{256}{2^{x+3}}$
- $\frac{10^{\frac{x}{3}} \cdot 1000}{10^x} < 0.01$

**Naloga 17.10.** *Rešite eksponentno neenačbo.*

- $5^{2x+1} > 5^x + 4$
- $9^x - 2 \cdot 3^x > 3$
- $25^{-x} + 5^{-x+1} \geq 50$
- $81^x + 5 \cdot 9^x \leq 24$

## 17.4 Uporaba eksponentne funkcije



## Poglavje 18

# Logaritemska funkcija