

(제품명)

[원료약품 및 그 분량]

의약품 표준제조기준					(제품명)	
구 분	유 효 성 분 명	1회 최대 분량(g)	1일 최대 분량(g)	1회 최소 분량(g)	1회 용량(g)	1일 용량(g) (1일 회)

[유효성분의 종류]

세부내용	확인 (적합&부적합)
1) 배합할 수 있는 유효성분의 종류는 <표1>의 성분으로 한다.	
2) 배합하지 않으면 안되는 유효성분은 <표1>의 I항과 II항의 성분 중 1종 이상으로 한다.	
3) <표1>중 I항의 유효성분은 3종까지 배합할 수 있다.	
4) <표1>중 III항의 유효성분을 배합하는 경우는 III항의 유효성분 중 1종만 배합한다.	
5) <표 1>중 II항의 성분인 이부프로펜은 I항의 성분과 배합하지 않는다.	

[유효성분의 분량]

세부내용	확인 (적합&부적합)
1) 각 유효성분의 1회 및 1일 최대분량은 <표1>의 양으로 한다.	
2) <표1>중 I항의 유효성분을 1종 배합하는 경우의 1회량의 하한은 1회 최대분량의 1/2로 한다.	
3) <표1>중 I항의 유효성분을 2종이상 배합하는 경우 또는 Ⅲ항의 유효성분의 1회량의 하한은 1회 최대분량의 1/5로 한다.	
4) < 표1>중 V항의 유효성분의 1회량의 하한은 1일 최대분량의 1/15로 한다.	
5) <표1>중 I항의 유효성분을 2종이상 배합하는 경우는 해당성분마다 배합하는 분량을 각각의 1회 최대분량으로 나누어 얻은 수치의 합이 1/2이상이어야 하고 3/2을 넘어서는 안된다.	
6) <표 2> 중 I란의 유효성분의 1일량의 하한은 1일 최대분량의 1/10이다.	

[효능효과]

- 효능 및 효과의 범위는 다음 범위로 한다.
- 1) 두통, 치통, 발치(이를 뽑음)후 동통(통증), 인후통, 귀의 통증, 관절통, 신경통, 요통, 근육통, 견통(어깨결림), 타박통, 골절통, 염좌통(뺨통증), 월경통(생리통), 외상통의 진통
 - 2) 오한(추위), 발열시의 해열

[용법용량]

의약품 표준제조기준	(제품명)												
(4) 용법.용량 1) 용법은 다음과 같이 한다. ① 1일 1회 복용하는 경우 1일 1회까지로 하고 공복시를 피하여 복용한다 ② 1일 2회 복용하는 경우 1일 2회까지로 하고 공복시를 피하여 복용한다. 복용 간격은 6시간 이상으로 한다. ③ 1일 3회 복용하는 경우 1일 3회까지로 하고 공복시를 피하여 복용한다. 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 3) 캡슐제, 정제(츄어블정 및 발포정 제외)는 만 7세 이하의 영유아의 복용은 인정하지 아니한다. 또한, 츄어블정에 대해서는 원칙적으로 만 3세 미만을 대상으로 하는 용법은 인정하지 않는다. <표3> 연령 구분별 용량의 환산 계수표 <table><tr><th>연 령 구 분</th><th>계 수</th></tr><tr><td>만 15세 이상</td><td>1</td></tr><tr><td>만 11세 이상 - 만 15세 미만</td><td>2/3</td></tr><tr><td>만 7세 이상 - 만 11세 미만</td><td>1/2</td></tr><tr><td>만 3세 이상 - 만 7세 미만</td><td>1/3</td></tr><tr><td>만 1세 이상 - 만 3세 미만</td><td>1/4</td></tr></table>	연 령 구 분	계 수	만 15세 이상	1	만 11세 이상 - 만 15세 미만	2/3	만 7세 이상 - 만 11세 미만	1/2	만 3세 이상 - 만 7세 미만	1/3	만 1세 이상 - 만 3세 미만	1/4	
연 령 구 분	계 수												
만 15세 이상	1												
만 11세 이상 - 만 15세 미만	2/3												
만 7세 이상 - 만 11세 미만	1/2												
만 3세 이상 - 만 7세 미만	1/3												
만 1세 이상 - 만 3세 미만	1/4												

[사용상의 주의사항] (해당 부분 하이라이트)

의약품 표준제조기준	(제품명)
1. 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.(아세트아미노펜 함유제제) 2) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.(살리실산나트륨, 아스피린, 아스피린알루미늄, 이부프로펜 함유제제) 3) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상 및 위장출혈이 유발될 수 있다.(아세트아미노펜과 다음 성분의 복합제: 살리실산나트륨, 아스피린, 아스피린알루미늄) 4) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스 - 존슨 증후군(SJS), 독성 표피 괴사용해(TEN)와 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.(아세트아미노펜 함유제제) 5) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약을 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.(아세트아미노펜 함유제제) 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용시 천식을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기) 4) 만 15세 미만의 어린이(아스피린, 아스피린알루미늄, 살리실산나트륨, 히드로탈시트 함유제제) 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 다른 해열진통제, 감기약, 진정제 4. <삭제>	

5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과 의사, 약사와 상의 할 것.

1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아(갓난아기) 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일수 있으므로 의사와 상의할 것.)

2) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

3) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람

4) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환¹⁾²⁾, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종(부기)²⁾ 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

¹⁾아스피린, 아스피린알루미늄, 아세트아미노펜, 에텐자미드, 살리실산나트륨 함유제제

²⁾감초 함유제제

5) 고령자(노인)

6) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부

7) 의사 또는 치과 의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

8) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람

9) 나트륨 제한식이를 하는 사람(살리실산나트륨(나트륨 5mEq 이상 함유) 함유제제)

10) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람(아스피린, 아스피린알루미늄, 에텐자미드, 살리실산나트륨, 이부프로펜 함유제제)

11) 편도선절제술, 구강(입안)수술 후 7일 이내의 사람(췌어블정에 한함)

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통¹⁾²⁾, 소화관출혈¹⁾²⁾, 위부불쾌감(배가 거북함)¹⁾²⁾, 어지러움, 난청(귀먹음)¹⁾, 부종(부기), 이명¹⁾

¹⁾아스피린, 아스피린알루미늄, 에텐자미드, 살리실산콜린, 살리실산나트륨 함유제제

²⁾이부프로펜 함유제제

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증(심한 증상) 증상이 나타난 경우

① 속(아나필락시) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기),

가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.

② 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용해(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.

③ 천식

④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다.(아세트아미노펜 함유제제)

⑤ 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종(부기), 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)(감초 함유제제)

⑥ 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.(감초 함유제제)

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

7. 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

8. 기타 이 약의 복용 시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독 하에 복용시킬 것.(어린이의 용법·용량이 있는 경우)
- 4) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 5) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.(아세트아미노펜 함유제제)
- 6) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.(감초 함유제제)

9. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 (괄호 안의 내용은 필요할

경우에 기재할 것) 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것. (용기 등에 표시가 잘 되어있어 오용(잘못 사용)할 소지가 없을 경우에는 기재하지 않아도 된다.)	
--	--