

[원료약품 및 그 분량]

의약품 표준제조기준					제품명	
구 분	유효 성분 명	1회 최소 분량(g)	1일 최소 분량 (g)	1일 최대 분량 (g)	1회 용량 (g)	1일 용량 (g) (1일 n회, 1회 n캡슐)

[유효성분의 종류]

세부내용	확인 (적합&부적합&해당없음)
1) 배합할 수 있는 유효성분의 종류는 <표1>의 성분으로 한다.	
2) 한약처방을 사용하는 경우에 동처방의 규격은 업소에서 작성한 규격을 인정하고 규격설정을 위한 기초 시험자료를 제출하여야 한다.	
3) 배합하지 않으면 안되는 유효성분은 <표1>의 Ⅰ항과 Ⅱ항의 성분 중 1종 이상으로 한다.	
4) <표1>중 Ⅰ항의 유효성분은 3종까지 배합할 수 있다.	
5) <표1>중 Ⅲ항, Ⅳ항, V-1항, Ⅵ항, Ⅶ항, Ⅷ항, Ⅸ항목의 유효성분 또는 라란의 한약처방을 배합하는 경우는 각 항 또는 라란의 각각 1종으로 한다.	
6) 마황 또는 마황을 함유하는 한약처방 및 이들의 엑스는 <표1>의 V-1항의 유효성분과의 배합은 인정하지 않는다.	
7) <표1>중 라란의 한약처방과 가, 나 또는 다란의 생약과의 배합은 인정하지 않는다.	

8) 항소산 이외의 한약처방을 배합하는 경우는 엑스에 한하여 배합한다.	
9) <표1>중 라란의 한약처방의 구성생약 및 분량은 <표2>에 의한다.	
10) <표1>중 Ⅱ항의 성분인 이부프로펜은 Ⅰ항의 성분, Ⅸ항의 성분, 가란의 생약 성분 또는 다란 중 지룡, 라란의 한약처방의 성분과 동시에 배합하지 않는다.	
11) <표1>의 Ⅶ항의 성분은 X항의 성분, 가란의 생약 성분 또는 라란의 한약 처방과 동시에 배합할 수 없다.	
12) <표1>의 Ⅸ항의 성분은 <표1>의 Ⅱ항의 성분, X항의 성분, 가란의 생약성분 또는 라란의 한약처방과 동시에 배합할 수 없다.	

[유효성분의 분량]

세부내용	확인 (적합&부적합&해당없음)
1) 각 유효성분의 1일 최대분량은 별도로 정한 경우를 제외하고 <표1>의 양으로 한다. 다만, <표1>의 V-1항의 유효성분 또는 가란의 생약에 Ⅱ항의 성분을 배합하는 경우는 해당 유효성분마다 배합하는 분량을 각각의 1일 최대분량으로 나누어 얻은 수치의 합이 3/2를 넘어서는 아니된다.	
2) <표1>중 I 항의 유효성분을 2종 이상 배합하는 경우 또는 가란 및 나란의 생약을 2종 이상 배합하는 경우는 해당 유효성분 및 생약의 배합량을 각각의 1일 최대분량으로 나누어 얻은 수치의 합이 1을 넘어서는 안된다.	
3) <표1>중 I 항의 유효성분에 지렁이나 갈근탕 또는 마황탕을 배합하는 경우는 해당 유효성분 또는 처방마다 배합하는 분량을 각각의 1일 최대분량으로 나누어 얻은 수치의 합이 1을 넘어서는 안된다.	
4) <표1>중 라란에 있는 한약처방의 배합 분량은 1일 최대분량의 1/5이상 1/2미만으로 한다.	
5) 각 유효성분의 배합량의 하한은 별도로 정하는 경우를 제외하고는 1일 최대분량의 1/2로 한다.	
6) <표1>중 I 항의 유효성분 중 아세트아미노펜만 배합하는 경우 아세트아미노펜의 1일 배합량의 하한은 600mg으로 한다. <표1>중 I 항의 유효성분을 2종 이상 배합하는 경우의 배합량의 하한은 각 유효성분의 1일 최대분량의 1.5로 하고, 또 해당 유효성분마다 배합하는 분량을 각각의 1일 최대분량으로 나누어 얻은 수치의 합이 1/2이상이어야 한다.	
7) <표1>중 Ⅲ항 및 Ⅳ항의 유효성분의 배합량의 하한은 1일 최대분량의 1/5로 한다.	
8) <표1>중 XⅢ항에 기재된 유효성분의 배합량의 하한은 해당 1일 최대분량의 다음에 각각 기재된 괄호내의 양으로 한다.	
9) <표1>중 가란, 나란 및 다란의 생약의 배합량의 하한은 각각 1일 최대분량의 1/10로 한다.	
10) 기침 또는 가래의 효능 및 효과의 근거가 <표1>의 가란 또는 나란에만 의할 경우 가란 또는 나란에 기재된 생약의 배합량의 하한은 각각 1일 최대 분량의 1/2로 한다. 다만, 나란의 생약을 2종 이상 배합하는 경우 배합량의 하한은 배합하는 해당생약의 1일 최대분량의 1/5로 하고, 또 해당생약마다 배합하는 분량을 각각의 1일 최대분량으로 나누어 얻은 수치의 합이 1/2이상이어야 한다.	
11) 내용액제의 경우 1회 복용하는 카페인 양이 30mg을 초과하여서는 아니된다.	
12) 아스피린과 V-1항의 성분과는 배합하지 않는다.	

[효능효과]

: 감기의 증상상(여러 증상)(콧물, 코막힘, 재채기, 인후(목구멍)통, 기침, 가래, 오한(춥고 떨리는 증상), 발열, 두통, 관절통, 근육통)의 완화

※ 다만, 다음 표 우란의 유효성분 중 1종이 배합되지 않을 경우는 동표 좌란의 효능·효과를 표시할 수 없다.

의약품 표준제조기준		(제품명)
좌란	우란	해당여부
콧물, 코막힘, 재채기	<표1>의 Ⅲ항 또는 Ⅵ항의 성분	
기침	<표1>의 Ⅳ항, Ⅴ항의 성분 및 가란의 생약	
가래	<표1>의 Ⅳ항의 구연산티페피딘 또는 히벤즈산티페피딘 또는 Ⅴ항, Ⅶ항, Ⅸ항의 성분 및 가란 또는 나란의 생약	

[용법용량]

의약품 표준제조기준	(제품명)												
1) 용법은 1일 3회 식후 30분에 복용하는 것으로 한다. 다만, 내용액제 및 시럽제는 매 식후 및 필요한 경우는 취침시에 복용하는 것으로 하고 원칙적으로 복용간격은 4시간으로 한다. 2) 캡슐제, 정제(츄어블정 및 발포정 제외)는 만 7세 이하의 영·유아에 대한 복용은 인정하지 아니한다. 또한, 츄어블정에 대해서는 원칙적으로 만 3세 미만을 대상으로 하는 용법은 인정하지 않는다. 3) 만2세 미만의 영·유아를 대상으로 하는 용법은 인정하지 아니한다. 다만, 꼭 필요할 경우 의사의 진료를 받는다. 4) 만 15세 미만의 어린이에 있어서 유효성분의 1일 최대분량은 유효성분의 분량에 <표3>의 해당 연령구분에 대응하는 계수란의 수치를 곱한 양으로 한다. <표3> 연령 구분별 용량의 환산 계수표 <table><tr><th>연령구분</th><th>계수</th></tr><tr><td>만 15세 이상</td><td>1</td></tr><tr><td>만 11세 이상 - 만 15세 미만</td><td>2/3</td></tr><tr><td>만 7세 이상 - 만 11세 미만</td><td>1/2</td></tr><tr><td>만 3세 이상 - 만 7세 미만</td><td>1/3</td></tr><tr><td>만 1세 이상 - 만 3세 미만</td><td>1/4</td></tr></table>	연령구분	계수	만 15세 이상	1	만 11세 이상 - 만 15세 미만	2/3	만 7세 이상 - 만 11세 미만	1/2	만 3세 이상 - 만 7세 미만	1/3	만 1세 이상 - 만 3세 미만	1/4	
연령구분	계수												
만 15세 이상	1												
만 11세 이상 - 만 15세 미만	2/3												
만 7세 이상 - 만 11세 미만	1/2												
만 3세 이상 - 만 7세 미만	1/3												
만 1세 이상 - 만 3세 미만	1/4												
5) 아스피린, 아스피린알루미늄, 히드로탈시트를 함유하는 제제는 만 15세 미만의 어린이를 대상으로 하는 용법은 인정되지 아니한다. 6) 츄어블정의 경우 기본적으로 복용방법을 ‘입안에서 녹이거나 씹어서 복용한다.’로 명기하여야 한다.													

[사용상의 주의사항] (해당 부분 하이라이트)

감기약의 사용상의 주의사항은 다음과 같다.

의약품 표준제조기준	(제품명)
1. 경고 1) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상이 유발될 수 있다.(아세트아미노펜 함유제제) 2) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다.(아스피린, 아스피린알루미늄 함유제제) 3) 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 이 약이나 다른 해열 진통제를 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다. 이러한 사람이 이 약을 복용하면 간손상 및 위장출혈이 유발될 수 있다.(아세트아미노펜과 다음 성분의 복합제: 아스피린, 아스피린알루미늄) 4) 아세트아미노펜을 복용한 환자에서 매우 드물게 급성 전신성 발진성 농포증(급성 전신성 발진성 고름물집증)(AGEP), 스티븐스 - 존슨 증후군 (SJS), 독성 표피 괴사용해(TEN)와 같은 중대한 피부 반응이 보고되었고, 이러한 중대한 피부반응은 치명적일 수 있다. 따라서 이러한 중대한 피부 반응의 징후에 대하여 환자들에게 충분히 알리고, 이 약 투여 후 피부발 진이나 다른 과민반응의 징후가 나타나면 즉시 복용을 중단하도록 하여야 한다.(아세트아미노펜 함유제제) 5) 이 약은 아세트아미노펜을 함유하고 있다. 아세트아미노펜으로 일일 최대 용량(4,000mg)을 초과할 경우 간손상을 일으킬 수 있으므로 이 약 을 일일 최대 용량(4000mg)을 초과하여 복용하여서는 아니되며, 아세트 아미노펜을 포함하는 다른 제품과 함께 복용하여서는 안 된다.(아세트아 미노펜 함유제제) 6) 슈도에페드린 함유 제제 복용 시 급성 전신성 발진성 농포증(AGEP) 과 같은 중증 피부 이상반응이 나타날 수 있다. 발열, 홍반, 다수의 작은 농포와 같은 증상이 관찰될 경우 이 약의 복용을 중단하고 의사 또는 약 사와 상의해야 한다(슈도에페드린 함유제제) 2. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 2) 이 약 및 이 약의 구성성분, 다른 해열진통제, 감기약 복용 시 천식을 일으킨 적이 있는 사람 3) 만3개월 미만의 영아 4) 만15세 미만의 어린이(아스피린, 아스피린알루미늄, 히드로탈사이트 함 유제제) 5) 수유부(수유중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 수유를 중단할 것.)(디펜히드라민염산염, 디펜히드라민탄닌산염 함유제제) 6) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복 용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 7) 중증 또는 조절되지 않는 고혈압 환자(슈도에페드린 함유제제) 8) 중증 급성 또는 만성 신장질환/신부전 환자(슈도에페드린 함유제제) 3. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용하지 말 것. 진해거담제, 다른 감기약, 해열진통제, 진정제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염용 경구제, 멸미약, 알레르기용약), 디펜히드라민을 함유하는 제제(피부에 적용하는 제제 포함)¹⁾, 위장진통진경제²⁾ ¹⁾디펜히드라민 및 그 염류 함유제제 ²⁾벨라돈나총알칼로이드 함유제제 4. <삭제> 5. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것.	

1) 수두 또는 인플루엔자에 감염되어 있거나 또는 의심되는 영아 및 만 15세 미만의 어린이(구역이나 구토를 수반하는 행동의 변화가 있다면, 드물지만 심각한 질병인 레이증후군의 초기 증상일수 있으므로 의사와 상의할 것.)

2) 슈도에페드린 성분과 관련하여 허혈성 대장염의 증상(급격한 복통, 직장 출혈 등)이 발현될 경우(슈도에페드린 함유제제)

3) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성피부염, 기관지천식, 알레르기성비염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람

4) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람

5) 간장질환, 신장질환, 심장질환¹⁾²⁾³⁾⁵⁾, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압, 부종²⁾, 위십이지장궤양³⁾, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)⁴⁾⁵⁾, 배뇨곤란⁴⁾⁵⁾ 등이 있는 사람, 고령자¹⁾²⁾, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람

¹⁾에페드린 및 그 염류, 마황 함유제제

²⁾감초 함유제제

³⁾아스피린, 아스피린알루미늄, 아세트아미노펜, 에텐자미드 함유제제

⁴⁾항히스타민제 함유제제

⁵⁾벨라돈나총알칼로이드 함유제제

6) 속쓰림, 위부불쾌감, 위통과 같은 위장문제가 지속 혹은 재발되거나 궤양, 출혈문제를 가지고 있는 사람

7) 구토와 설사로 많은 수분을 손실하거나 수분을 흡수하지 않는 사람 또는 이뇨제를 복용하는 사람(아스피린, 아스피린알루미늄, 에텐자미드, 이부프로펜 함유제제)

8) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 (임신 30주 이후 살리실산나트륨, 살리실아미드, 아스피린, 아스피린알루미늄, 살리실산콜린, 이부프로펜 성분 함유 제제의 투여가 권고되지 않는다)

9) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람(당뇨약, 통풍약, 관절염약, 항응고제, 스테로이드제 등 다른 약물을 투여 받고 있는 사람)

10) 인터페론 제제로 치료를 받고 있는 사람(소시호탕 함유제제)

11) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침(항히스타민제, 진해제, 거담제 함유제제)

12) 편도선절제술, 구강수술 후 7일 이내의 사람(추어블경에 한함)

6. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

발진·발적, 가려움, 구역·구토, 식욕부진, 변비, 위통³⁾⁵⁾, 소화관출혈³⁾⁵⁾, 위부불쾌감³⁾⁵⁾, 난청³⁾, 부종, 이명³⁾, 배뇨곤란¹⁾, 목마름(지속적이거나 심한)¹⁾, 빈뇨²⁾, 배뇨통증²⁾, 혈뇨²⁾, 잔뇨감²⁾, 어지러움, 불안⁴⁾, 떨림⁴⁾, 불면⁴⁾, 두통⁶⁾, 안면홍조⁶⁾, 비정상적인 눈부심⁶⁾

¹⁾항히스타민제 함유제제

²⁾소시호탕, 시호계지탕 함유제제

³⁾아스피린, 아스피린알루미늄, 살리실산콜린, 에텐자미드 함유제제

⁴⁾에페드린 및 그 염류, 마황 함유제제

⁵⁾이부프로펜 함유제제

⁶⁾벨라돈나총알칼로이드 함유제제

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우

① 속(아나필락시스) : 복용후 바로 두드러기, 부종, 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.

② 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용해(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적, 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.

③ 천식

④ 간기능장애 : 전신의 나른함, 황달(피부 또는 눈의 흰자위가 황색을 띄게 됨)등이 나타날 수 있다.(아세트아미노펜, 소시호탕, 시호계지탕, 카르보시스테인, 갈근탕 함유제제)

⑤ 간질성폐렴 : 헛기침(가래를 동반하지 않는 기침)을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타날 수 있다(이러한 증상은 감기의 증상과 구별하기 어려울 수 있다. 헛기침, 발열 등의 증상이 악화되는 경우 복용을 중지하고, 의사의 진료를 받도록 한다).(소시호탕, 시호계지탕, 맥문동탕 함유제제)

⑥ 간질성폐렴 : 기침을 동반하고, 숨이 차고, 호흡곤란, 발열 등이 나타난다.(아스피린, 아스피린알루미늄, 아세트아미노펜, 에텐자미드 함유제제)

⑦ 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)(감초 함유제제)

⑧ 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.(감초 함유제제)

⑨ 가역적 후뇌 병증 증후군 및 가역적 뇌혈관 수축 증후군: 갑작스러운 심한 두통, 번개 두통, 구역, 구토, 혼돈, 발작, 시각 장애 등이 발현될 수 있다 (슈도에페드린 함유제제)

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

7. 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

8. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.

2) 장기간 계속 복용하지 말 것.

3) 어린이에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것. (어린이의 용법·용량이 있는 경우)

4) 복용시에는 음주하지 말 것.

5) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.(항히스타민제 함유제제)

6) 바르비탈계 약물, 삼환계 항우울제 및 알코올을 투여한 환자는 다량의 아세트아미노펜을 대사시키는 능력이 감소되어 아세트아미노펜의 혈장 반감기를 증가시킬 수 있다.(아세트아미노펜 함유제제)

7) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.(감초 함유제제)

8) 이 약의 복용으로 당뇨병 검사치에 영향을 줄 수 있다.(1일 최대배합량이 원지로 1g 이상 또는 세네가로 1.2g 이상(엑스제는 원생약으로 환산해서 원지 1g 또는 세네가 1.2g 이상)함유제제)

9) 동물실험에서 브롬헥신염산염을 장기간 다량 연속 투여할 경우 혈청 중에 아미노산전이효소와 가래양이 일시적으로 상승한다는 보고가 있다.(브롬헥신염산염 함유제제)

10) 이 약을 복용하면 일시적으로 가래 양이 증가하는 경우가 있다.(브롬헥신염산염 함유제제)

9. 저장상의 주의사항

1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것

2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 (궤호 안의 내용은 필요할 경우에 기재할 것)

3) 오용을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것. (용기 등에 표시가 잘 되어있어 오용할 소지가 없을 경우에는 기재하지 않아도 된다.)