

(제품명)

[원료약품 및 그 분량]

의약품 표준제조기준					(제품명)	
구 분	유 효 성 분 명	1회 최대 분량(g)	1일 최대 분량(g)	1회 최소 분량(g)	1회 용량(g)	1일 용량(g) (1일 3회)

[유효성분의 종류]

세부내용	확인 (적합&부적합)
1) 배합가능한 유효성분의 종류는 <표1>에 기재된 것으로 한다. 단, 트로키제에 배합할 수 있는 유효성분의 종류는 이 표에 열거하는 것 중에서 △표시를 한 것에 한한다. 또한, 이 표 9항에 열거하는 유효성분은 트로키제이외의 제제에 배합해서는 안 된다.	
2) 반드시 배합해야 할 유효성분은 <표1>의 1항, 2항, 3항, 가란의 유효성분 중 1종으로 한다.	
3) <표1>중 8항의 유효성분은 1항 또는 7항의 유효성분을 함유하는 제제에 한해서만 배합할 수 있다.	
4) <표1> 중 1항~9항의 유효성분의 배합은 동일항내에서는 1종으로 한다.	
5) <표1>중 나란 또는 다란에 있는 유효성분의 배합은 동일란 내에서는 5종까지로 한다.	
6) <표1>중 가란의 유효성분은 2항 또는 4항의 유효성분과의 배합을 인정하지 아니한다.	

[유효성분의 분량]

세부내용	확인 (적합&부적합)
1) 각 유효성분의 1회 및 1일 최대분량은 <표1>에 기재된 양으로 한다. 다만, <표1> 중 2항, 4항, 가란의 유효성분에 8항의 유효성분을 배합하는 경우에는 8항의 1회 및 1일 최대분량을 <표1>에 기재된 양의 1/2로 한다.	
2) <표1>중 2항과 4항의 유효성분을 배합하는 경우 및 가란과 나란의 유효성분을 2종 이상 배합하는 경우에는 해당 유효성분마다 배합하는 분량을 각각의 1일 최대분량으로 나누어 얻은 수치의 합이 1을 넘어서는 안된다.	
3) 각 유효성분의 배합량의 하한은 별도로 정한 경우를 제외하고는 1회 및 1일 최대분량의 1/2로 한다. 다만, 8항의 유효성분은 1/5로 한다.	
4) <표1>중 2항과 4항의 유효성분을 배합하는 경우의 배합량의 하한은 다음과 같다. ① 2항의 유효성분으로 기침, 천식 및 가래에 대한 효능을 나타내는 경우, 4항의 유효성분의 배합량의 하한은 1회 및 1일 최대분량의 1/5로 한다. ② 2항 및 4항 이외의 유효성분으로 기침에 대한 효능을 나타내는 경우, 2항 및 4항의 유효성분의 배합량의 하한은 각각 1회 및 1일 최대분량의 1/5로 한다. 다만, 비례배합한 경우의 배합량의 하한은 해당유효성분 마다 배합하는 분량을 각각의 1일 최대분량으로 나누어 얻은 수치의 합이 1/2이 되도록 한다. ③ 4항의 유효성분으로 천식 및 가래에 대한 효능을 나타내는 경우, 2항의 유효성분의 배합량의 하한은 1회 및 1일 최대 분량의 1/5로 한다.	
5) 생약의 배합량의 하한은 1일 최대분량의 1/10로 한다. 다만, 생약을 배합함으로써 그 생약에 인정되는 효능을 나타내는 경우에는 1/2로 한다.	
6) 9항의 성분을 배합하는 트로키제 중 소아의 용법이 있는 경우 <표 2> 계수와 상관없이 성인과 동일하게 배합분량을 설정한다.	
7) 1일 5-6회 복용하는 용법을 지닌 트로키제는 각 유효성분의 배합량 하한선은 1일 최대분량의 1/2로 한다.	
8) 10항의 성분 배합량 하한선은 1일 최대분량의 1/5로 한다.	

[효능효과]

: 기침, 가래, 천식

의약품 표준제조기준		(제품명)
좌 란	우 란	해당여부
기 침	<표1>의 1항, 2항, 3항, 가란의 유효성분	
가 래	<표1>의 2항, 4항, 5항, 가란 및 나란의 유효성분과 동 <표1>항 중 구연산티페피딘, 히벤즈산티페피딘	
천 식	<표1>의 2항, 4항 및 가란의 유효성분 (다만, 동 <표1>의 1항의 유효성분이 동시에 배합되었을 경우는 제외)	

효능효과의 범위는 기침, 가래, 천식으로 한다.

다만, 다음 표 우란의 유효성분 중 1종이 배합되지 않을 경우에는 동표 좌란의 효능효과를 표방할 수 없다. 또한 트로키제는 상기에 의한바 이외에 <표 1> 9항의 유효성분이 배합되는 경우에는 ‘구내염, 편도염, 인·후두염으로 인한 목쉼·목의 불편감·인후통·목이 부어오름’ 도 병행해서 명시할 수 있다.

[용법용량]

의약품 표준제조기준	(제품명)														
1) 용법은 1일 3-4회 복용하는 것으로 하고 복용시기 또는 복용간격을 명기 한다. 단, 트로키제 및 내용액제는 1일 6회까지 복용하는 것으로 해도 지장은 없지만 1일 5-6회 복용할 경우에는 원칙적으로 트로키제는 2시간 이상, 내용액제는 약 4시간 간격을 두고 복용하는 것으로 해야 한다. 4) 캡슐제, 트로키제 및 정제(츄어블정 및 발포정 제외)는 만 7세 이하의 영유아에 대한 복용은 인정하지 아니한다. 또한, 츄어블정에 대해서는 원칙적으로 만 3세 미만을 대상으로 하는 용법은 인정하지 않는다.. <표3> 연령 구분별 용량의 환산 계수표 <table><tr><th>연 령 구 분</th><th>계 수</th></tr><tr><td>만 15세 이상</td><td>1</td></tr><tr><td>만 11세 이상 - 만 15세 미만</td><td>2/3</td></tr><tr><td>만 8세 이상 - 만 11세 미만</td><td>1/2</td></tr><tr><td>만 5세 이상 - 만 8세 미만</td><td>1/3</td></tr><tr><td>만 3세 이상 - 만 5세 미만</td><td>1/4</td></tr><tr><td>만 2세 이상 - 만 3세 미만</td><td>1/5</td></tr></table>	연 령 구 분	계 수	만 15세 이상	1	만 11세 이상 - 만 15세 미만	2/3	만 8세 이상 - 만 11세 미만	1/2	만 5세 이상 - 만 8세 미만	1/3	만 3세 이상 - 만 5세 미만	1/4	만 2세 이상 - 만 3세 미만	1/5	
연 령 구 분	계 수														
만 15세 이상	1														
만 11세 이상 - 만 15세 미만	2/3														
만 8세 이상 - 만 11세 미만	1/2														
만 5세 이상 - 만 8세 미만	1/3														
만 3세 이상 - 만 5세 미만	1/4														
만 2세 이상 - 만 3세 미만	1/5														

[사용상의 주의사항] (해당 부분 하이라이트)

의약품 표준제조기준	(제품명)
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것. 1) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성(노스카핀 또는 염산노스카핀 함유제제) 2) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기) 3) 만 15세 미만의 소아(프로메타진염산염 함유제제) 4) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람 5) 수유부(수유중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 수유를 중단할 것.)(아미노필린, 테오필린, 디펜히드라민 및 그 염류 함유제제) 6) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 7) 만15세 미만 소아(히드로탈시트를 유효성분으로 함유하는 제제에 한함) 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것. 다른 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 감기약, 항히스타민제를 함유하는 내복약(비염(코염)용 경구제, 멸미약, 알레르기용약), 진정제, 디펜히드라민을 함유하는 제제(피부에 적용하는 제제 포함)¹⁾ ¹⁾디펜히드라민 및 그 염류 함유제제 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 알레르기성비염(코염), 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 3) 간장질환, 신장(콩팥)질환, 심장질환¹⁾²⁾, 갑상선질환, 당뇨병, 고혈압¹⁾²⁾, 부종(부기)²⁾, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)³⁾, 배뇨(소변을 뚫)곤란³⁾, 간질⁴⁾ 등이 있는 사람, 고령자(노인)¹⁾²⁾, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 ¹⁾2항의 기관지확장제, 마황 함유제제 ²⁾감초 함유제제 ³⁾항히스타민제 함유제제 ⁴⁾디프로필린 함유제제 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부 5) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람 6) 다음과 같은 기침이 있는 사람 흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성	

기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침
7) 편도선절제술, 구강(입안)수술 후 7일 이내의 사람(췌
어불정에 한함)

**4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의
사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이
첨부분서를 소지할 것.**

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우
발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 구역·구토, 식욕부
진, 어지러움, 배뇨(소변을 똥)곤란¹⁾, 목마름(지속적이거
나 심한)¹⁾, 동계(두근거림)²⁾, 불안³⁾, 떨림³⁾, 불면³⁾

¹⁾항히스타민제 함유제제

²⁾4항의 크산틴류 함유제제

³⁾2항의 기관지확장제, 마황 함유제제

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나
타난 경우

① 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발
이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이
높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량
이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용
할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부
종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므
로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확
인되는 경우 복용을 중지할 것.)(감초 함유제제)

② 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날
수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마
비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.(감초
함유제제)

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우
의사의 진료를 받는다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것

2) 장기간 계속 복용하지 말 것.(1일 최대 배합량이 글
리시리진산으로서 40mg 이상 또는 감초로서 1g 이상
함유제제)

3) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하
에 복용시킬 것.(소아의 용법·용량이 있는 경우)

4) 만 7세 이하의 영(갓난아기)·유아에게는 시럽제를 복
용시킬 것.(캡슐제, 트로키제 및 정제)

5) 복용시에는 음주하지 말 것.

6) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차
운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.(항히스타민제
함유제제)

7) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그

염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.(감초 함유제제)

8) 이 약의 복용으로 당뇨병 검사치에 영향을 줄 수 있다.(1일 최대배합량이 원지로 1g 이상 또는 세네가로 1.2g 이상(엑스제는 원생약으로 환산해서 원지 1g 또는 세네가 1.2g 이상)함유제제)

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 장소에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 (괄호 안의 내용은 필요할 경우에 기재할 것)
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
(용기 등에 표시가 잘 되어있어 오용(잘못 사용)할 소지가 없을 경우에는 기재하지 않아도 된다.)