

(제품명)

[원료약품 및 그 분량]

의약품 표준제조기준					(제품명)	
구 분	유 효 성 분 명	1회 최대 분량(g)	1일 최대 분량(g)	1회 최소 분량(g)	1회 용량(g)	1일 용량(g) (1일 3회)

[유효성분의 종류]

세부내용	확인 (적합&부적합)
1) 배합가능한 유효성분의 종류는 <표 1>에 기재된 것으로 한다.	
2) 반드시 배합해야할 유효성분은 <표 1>의 I 란에 기재된 것으로 한다.	
3) <표 1>의 각란에 기재된 유효성분은 상호 배합가능하다.	
4) <표 1>의 I 란, Ⅲ란, IV란 또는 V란에 기재된 유효성분을 배합한 경우 동일란내에서는 1종에 한한다.	
5) <표 1>의 Ⅱ란에 기재된 유효성분을 배합하는 경우 1항에서는 2종까지로 하고, 2항에서는 1종으로 한다.	
6) <표 1>의 IV란 2항 및 VI란의 생약엑스는 원칙적으로 수성엑스(물 또는 30%이하의 묽은 에탄올 엑스)로 한다.	

[유효성분의 분량]

세부내용	확인 (적합&부적합)
1) <표 1>에 기재된 유효성분의 1일 최대분량은 별도로 정한 경우를 제외하고 동표에 기재된 양으로 하며, 1회 최대분량은 1일 최대분량의 1/3로 한다. 다만, 내용액제의 경우 1회 최대분량은 1일 최대분량의 1/6로 한다.	
2) <표 1>의 Ⅱ란 1항의 유효성분과 Ⅴ란의 유효성분을 배합할 경우 Ⅴ란의 유효성분의 1일 최대분량은 동표에 규정된 양의 1/2로 한다.	
3) <표 1>의 Ⅱ란에 기재된 유효성분을 2종이상 배합할 경우 해당 유효성분마다 배합할 분량을 각각의 1일 최대분량으로 나누어 얻은 수치의 합이 2를 초과해서는 안된다.	
4) <표 1>의 Ⅰ란에 기재된 유효성분의 1일량의 하한은 1일 최대분량의 1/2로 한다.	
5) <표 1>의 Ⅱ란, Ⅲ란 및 Ⅴ란에 기재된 유효성분의 1일량의 하한은 1일 최대분량의 1/5로 한다.	
6) <표 1>의 Ⅳ란 및 Ⅵ란에 기재된 유효성분의 1일량의 하한은 1일 최대분량의 1/10로 한다.	
7) 각 유효성분의 배합법. 배합계수는 <표 2>를 참고한다.	

[효능효과]

: 효능효과는 "코감기(급성비염), 알레르기성비염(코염) 또는 부비동염에 의한 다음 증상의 완화 : 코막힘, 콧물, 재채기, 눈물, 인후(목구멍)통, 머리 무거움"의 범위로 한다.

[용법용량]

의약품 표준제조기준	(제품명)												
1) 용법은 원칙적으로 1일 3회 복용하고, 복용시기 또는 복용간격을 명기한다. 이 경우, 복용간격은 4시간 이상으로 한다. 그러나 내용액제에 대해서는 1일 6회까지 복용하도록 해도 지장은 없지만, 1일 6회 복용할 경우에는 원칙적으로 약 4시간 간격을 두고 복용해야 한다. 2) 기재 예는 다음과 같다. ① 고형제의 경우 ㉠ 1일 3회, 매 식후에 복용한다. ㉡ 1일 3회 복용한다. 그러나, 복용간격은 4시간 이상으로 한다. ㉢ 1일 3회, 4시간 이상의 간격을 두고 복용한다. 4) 캡슐제, 환제 및 정제(추어불정 및 발포정 제외)는 만 7세 이하의 영&#228;유아의 복용은 인정하지 아니한다. 또한, 추어불정에 대해서는 원칙적으로 만 3세 미만을 대상으로 하는 용법은 인정하지 않는다. <표3> 연령 구분별 용량의 환산 계수표 <table><tr><th>연 령 구 분</th><th>계 수</th></tr><tr><td>만 15세 이상</td><td>1</td></tr><tr><td>만 11세 이상 - 만 15세 미만</td><td>2/3</td></tr><tr><td>만 7세 이상 - 만 11세 미만</td><td>1/2</td></tr><tr><td>만 3세 이상 - 만 7세 미만</td><td>1/3</td></tr><tr><td>만 1세 이상 - 만 3세 미만</td><td>1/4</td></tr></table>	연 령 구 분	계 수	만 15세 이상	1	만 11세 이상 - 만 15세 미만	2/3	만 7세 이상 - 만 11세 미만	1/2	만 3세 이상 - 만 7세 미만	1/3	만 1세 이상 - 만 3세 미만	1/4	
연 령 구 분	계 수												
만 15세 이상	1												
만 11세 이상 - 만 15세 미만	2/3												
만 7세 이상 - 만 11세 미만	1/2												
만 3세 이상 - 만 7세 미만	1/3												
만 1세 이상 - 만 3세 미만	1/4												

[사용상의 주의사항] (해당 부분 하이라이트)

의약품 표준제조기준	(제품명)
1. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하지 말 것 1) 만 3개월 미만의 영아(갓난아기) 2) 만 15세 미만의 소아(프로메타진염산염 함유제제) 3) 이 약 및 이 약의 구성성분에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람(염화리소짐 함유제제 제외) 4) 이 약 및 이 약의 구성성분 또는 달걀에 대한 과민반응 및 그 병력이 있는 사람(염화리소짐 함유제제) 5) 수유부(수유중인 사람은 이 약을 복용하지 않거나 수유를 중단할 것.)(디펜히드라민 및 그 염류 또는 스코폴리아엑스 함유제제) 6) MAO억제제(항우울제, 항정신병제, 감정조절제, 항파킨슨제 등)를 복용하고 있거나 복용을 중단한 후 2주 이내의 사람 2. 이 약을 복용하는 동안 다음의 약을 복용(사용)하지 말 것. 다른 비염(코염)용 경구제, 항히스타민제를 함유하는 내복약(감기약, 진해(기침을 그치게 함)거담제(가래약), 멀미약, 알레르기용약 등), 디펜히드라민을 함유하는 제제(피부에 적용하는 제제 포함)¹⁾ ¹⁾디펜히드라민 및 그 염류 함유제제 3. 다음과 같은 사람은 이 약을 복용하기 전에 의사, 치과의사, 약사와 상의 할 것. 1) 본인, 양친 또는 형제 등이 두드러기, 접촉성 피부염, 편두통, 음식물알레르기 등을 일으키기 쉬운 체질을 갖고 있는 사람 2) 지금까지 약에 의해 알레르기 증상(예 : 발열, 발진, 관절통, 천식, 가려움증 등)을 일으킨 적이 있는 사람 3) 고혈압¹⁾²⁾, 심장질환¹⁾²⁾³⁾, 신장(콩팥)질환¹⁾, 간장질환⁴⁾, 혈액응고이상(출혈경향)⁴⁾, 부종(부기)¹⁾, 녹내장(예 : 눈의 통증, 눈이 침침함 등)³⁾, 배뇨(소변을 뚫)곤란³⁾, 갑상선질환²⁾, 당뇨병²⁾ 등이 있는 사람, 몸이 약한 사람 또는 고열이 있는 사람 ¹⁾감초, 글리시리진산 함유제제 ²⁾페닐레프린염산염, di-메칠에페드린염산염, 염산메톡시페나민 함유제제 ³⁾항히스타민제, 부교감신경차단제 함유제제 ⁴⁾브로멜라인 함유제제 4) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성, 수유부¹⁾ ¹⁾di-메틸에페드린염산염, 염산트리프롤리딘 함유제제, 벤조산나트륨카페인, 카페인무수물 또는 카페인수화물을 카페인으로서 1회 100mg 이상 함유제제 5) 고령자(노인) 6) 의사 또는 치과의사의 치료를 받고 있는 사람	

7) 다음과 같은 기침이 있는 사람

흡연, 천식, 만성 기관지염, 폐기종, 과도한 가래가 동반되는 기침, 1주 이상 지속 또는 재발되는 기침, 만성 기침, 발열·발진이나 지속적인 두통이 동반되는 기침

8) 편도선절제술, 구강(입안)수술 후 7일 이내의 사람(췌어불정에 한함)

4. 다음과 같은 경우 이 약의 복용을 즉각 중지하고 의사, 치과의사, 약사와 상의할 것. 상담 시 가능한 한 이첨부분서를 소지할 것.

1) 이 약의 복용에 의해 다음의 증상이 나타난 경우

출혈성뇌졸중, 구역·구토, 목마름(지속적이거나 심한), 변비, 식욕부진, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 가려움, 배뇨(소변을 똥)곤란, 두통¹⁾, 안면홍조¹⁾, 비정상적인 눈부심¹⁾

¹⁾부교감신경차단제 함유제제

2) 이 약의 복용에 의해 드물게 아래의 중증 증상이 나타난 경우

① 속(아나필락시) : 복용후 바로 두드러기, 부종(부기), 가슴답답함 등과 함께 안색이 창백하고, 손발이 차고, 식은땀, 숨쉬기 곤란함 등이 나타날 수 있다.(염화리소짐 함유제제, 클로르페니라민말레산염·벨라돈나(총)알카로이드·카페인 함유제제, 클로르페니라민말레산염·벨라돈나(총)알카로이드·카페인 함유제제)

② 피부점막안증후군(스티븐스-존슨증후군), 중독성표피괴사용해(리엘증후군) : 고열을 동반하고, 발진·발적(충혈되어 붉어짐), 화상과 같이 물집이 생기는 등의 심한 증상이 전신피부, 입이나 눈점막에 나타날 수 있다.(염화리소짐 함유제제)

③ 위알도스테론증 : 요량이 감소하거나 얼굴과 손발이 붓고, 눈꺼풀이 무거워지고, 손이 굳어지고, 혈압이 높아지거나 두통 등이 나타날 수 있다.(1일 최대 복용량이 감초로서 1g 이상인 제제는 장기간 계속하여 복용할 경우 저칼륨혈증, 혈압상승, 나트륨 체액의 저류, 부종, 체중증가 등의 위알도스테론증이 나타날 수 있으므로, 관찰(혈청칼륨치의 측정)을 충분히 하고 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.)(감초, 글리시리진산 함유제제)

④ 근병증 : 저칼륨혈증의 결과로서 근병증이 나타날 수 있으므로, 관찰을 충분히 하고 무력감, 사지경련, 마비 등의 이상이 확인되는 경우 복용을 중지할 것.(감초, 글리시리진산 함유제제)

3) 5~6회 복용하여도 증상이 좋아지지 않을 경우

5. 소아에 대한 투여

만2세 미만에게 투여하지 않는다. 다만, 꼭 필요한 경우 의사의 진료를 받는다.

6. 기타 이 약의 복용시 주의할 사항

- 1) 정해진 용법·용량을 잘 지킬 것.
- 2) 장기간 계속 복용하지 말 것.
- 3) 소아에게 복용시킬 경우에는 보호자의 지도 감독하에 복용시킬 것.(소아의 용법·용량이 있는 경우)
- 4) 복용하는 동안 졸음이 오는 경우가 있으므로 자동차 운전 또는 기계류의 운전 조작을 피할 것.
- 5) 복용시에는 음주하지 말 것.
- 6) 칼륨함유제제, 감초함유제제, 글리시리진산 또는 그 염류 함유제제, 루프계 이뇨제(푸로세미드, 에타크린산) 또는 티아지드계 이뇨제(트리클로르메티아지드)와 병용(함께 복용)시 위알도스테론증이나 저칼륨혈증으로 인하여 근병증이 나타나기 쉬우므로 신중히 복용할 것.(감초함유제제)

7. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손에 닿지 않는 곳에 보관할 것
- 2) 직사광선을 피하고 될 수 있는 한 습기가 적은 서늘한 곳에(밀폐하여) 보관할 것 (괄호 안의 내용은 필요할 경우에 기재할 것)
- 3) 오용(잘못 사용)을 막고 품질의 보존을 위하여 다른 용기에 바꾸어 넣지 말 것.
(용기 등에 표시가 잘 되어있어 오용할 소지가 없을 경우에는 기재하지 않아도 된다.)

