

(A)
uidA
224-bp amplicon (nt 843–1066) of the 1812-bp gene
variants: UPEC + NCBI genomes (n = 6,231)
Variant (%)
F3
F2
B1c
LB
LF
F1c
B2
B3
5′
3′
A (n=1,797) 1 0 2 0 0 0 0 1
B1 (n=1,222) 1 0 2 0 0 0 0 1
B2 (n=1,510) 0 0 0 0 0 0 0 0
C (n=291) 1 0 3 0 0 0 0 1
D (n=669) 0 0 0 1 0 0 0 1
E (n=372) 0 1 0 0 0 0 0 0
F (n=113) 0 0 0 0 0 0 0 1
G (n=90) 0 0 0 0 0 0 0 0
Position in amplicon (nt)
papGII
233-bp amplicon (nt 510–742) of the 1011-bp gene
variants: papGII genomes of UPEC + NCBI (n = 645); axis reversed
papGII (n=645) 0 0 0 0 1 0 0 0
papGIII (n=239) 0 1 1 3 11 10 8 9
papGIV (n=87) 8 5 5 7 10 8 8 9
papGI (n=3) 6 10 10 7 9 7 8 8
Median number of mismatches to the primer (UPEC + NCBI genomes pooled)
(B)
LAMP limit of detection for uidA (median ± IQR)
CFU/ml
10^6
10^5
10^4
10^3
10^2
NTC
Relative Fluorescence (fold-change)
Time [min]
(C)
LAMP limit of detection for papGII (median ± IQR)