

## Blatt 3: Funktionen

Mittelwert Ihrer Selbsteinschätzung:

-1: "hab nicht mal die Aufgabe gelesen"

0: "weiß nicht wie ich anfangen soll"

1: "habe begonnen, bin dann aber hängen geblieben"

2: "konnte alles rechnen, bin aber unsicher, ob es stimmt"

3: "alles klar hier"

### Definitionsbereich und Graphen von Funktionen

**Aufgabe 1:** \_\_\_\_\_ Definitions- und Bildbereich

Geben Sie von den folgenden Funktionen  $f$  jeweils den Definitionsbereich  $\mathbb{D}_f$  an. Überlegen Sie sich anhand von Skizzen welches Bild von den jeweiligen Definitionsbereichen unter den entsprechenden Abbildungen  $f$  Sie erwarten.

(a)  $f(x) = x + 2$

(b)  $f(x) = \sqrt{x}$

(c)  $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+2}}$

(d)  $f(x) = \ln x$

(e)  $f(x) = \frac{1}{\ln x}$

(f)  $f(x) = \frac{\sqrt{x(4-x)}}{\log_2(|2x+3| - |x-5|)}$

(g)  $f(x) = \tan x$

(h)  $f(x) = \cot(x - \pi)$

Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite 8

**Aufgabe 2:** \_\_\_\_\_

Um eine reelle Zahl  $x$  in Vorzeichen, Vor- und Nachkommastellen aufzuteilen, werden die Funktionen "Signum" (Vorzeichen) und "Gaußklammer" (ganzer Teil, "Entier") durch

$$\operatorname{sig} x = \begin{cases} +1, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases} \quad \text{und} \quad \lfloor x \rfloor = z \in \mathbb{Z}, \quad z \leq x < z + 1$$

eingeführt. Skizzieren Sie die Graphen folgender Funktionen:

(a)  $f(x) = \operatorname{sig} x$

(b)  $f(x) = \lfloor x \rfloor$

(c)  $f(x) = x - \lfloor x \rfloor$

(d)  $f(x) = \operatorname{sig} \lfloor |x| \rfloor$


(e)  $f(x) = |x - \operatorname{sig} \lfloor |x| \rfloor|$

Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite 10

**Aufgabe 3:** \_\_\_\_\_e

Ordnen Sie Graphen und Funktionen einander zu:




Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite [11](#)

**Aufgabe 4:** \_\_\_\_\_ln

Ordnen Sie Graphen und Funktionen einander zu:



Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite [11](#)

**Grenzwerte bestimmen / (hebbare) Unstetigkeitsstellen**

**Aufgabe 5:** \_\_\_\_\_ Verhalten im Unendlichen

Untersuchen Sie folgende Ausdrücke:

(a)  $\lim_{x \rightarrow 2} x^3 - 2x + 4x^2 - 1$

(b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{x^2}$

(c)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x}$

(d)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{x}$

(e)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^2}{x}$

(f)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-2x}{x}$

(g)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 4}{(3x - 1)(x + 3)}$

(h)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^3 - 4x^2}{(1 - x^2)2x}$

Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite [12](#)

**Aufgabe 6:** \_\_\_\_\_ ((hebbare) Unstetigkeitsstellen)

(a)  $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 5}{x^2 + x - 10}$

(b)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 2x}{x}$

(c)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x + 3}{x^2 - 3x + 2}$

(d)  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 6x^2 + 11x - 6}{x - 1}$

(e)  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 - 9}{x + 3}$

(f)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-x^2 - 3x + 10}{2x^2 + x - 10}$

(g)  $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2}{x^2 + 6x + 9}$

(h)  $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x}{x^2 - 4}$

Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite [13](#)

**Aufgabe 7:** \_\_\_\_\_ (Un-) Stetigkeiten

Gibt es bei den folgenden Funktionen Unstetigkeitsstellen? Wenn ja, wo und von welcher Art sind diese? Geben Sie zunächst den Definitionsbereich der Funktion an und untersuchen Sie dann (Grenzwert!) die jeweilige Funktion an den Stellen, wo diese nicht definiert ist. Machen Sie sich Skizzen der Funktionsgraphen.

(a)  $f(x) = \frac{1 - x}{1 - \sqrt{x}}$

(b)  $g(t) = \frac{t}{|t|}$

(c)  $h(s) = \frac{1}{|s| - 1}$

(d)  $v(\alpha) = \frac{\alpha - 4}{\sqrt{\alpha} - 2}$

Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite [15](#)

**Laboraufgabe 8:** \_\_\_\_\_ Betragsungleichung und Geometrische Reihe

- Ermitteln Sie graphisch mit Matlab die Lösungsmenge

$$M = \{x \in \mathbb{R} \mid |2x + 3| - |x - 5| > 0\}.$$

•

$$p(x) = \sum_{k=0}^N x^k \approx \frac{1}{1-x} = f(x)$$

Untersuchen Sie die Näherung von  $p(x)$  an  $f(x)$  graphisch und fokussieren Sie auf interessante Punkte/Polstellen.

Selbsteinschätzung:

**Umkehrabbildungen**

**Aufgabe 9:** \_\_\_\_\_

Bestimmen Sie für die folgenden Funktionen den Definitionsbereich in  $\mathbb{R}$  und Teilmengen  $A$  auf die eingeschränkt die Funktion umkehrbar ist und das entsprechende Bild  $B$ , so dass  $f : A \rightarrow B$  bijektiv ist. Berechnen Sie die Umkehrfunktion

(i)  $f(x) = 2x - 1$

(ii)  $f(x) = x^2 + 12x - 4$

(iii)  $f(x) = \frac{1}{x}$

(iv)  $f(x) = \frac{x+3}{2x}$

(v)  $f(x) = |x|$

(vi)  $f(x) = \sqrt{x}$

Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite 16

**Aufgabe 10:** \_\_\_\_\_

Berechnen Sie die Umkehrfunktion  $f^{-1}$  aus

(a)  $f(x) = a^x$

(b)  $f(x) = 1 - a^x$

(c)  $f(x) = a^{x-2}$

(d)  $f(x) = 2a^{1-x}$

und vereinfachen Sie den Ausdruck  $(f^{-1} \circ f)(x)$ .

Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite 16

**Komposition (Aufgaben zum Tutorial)**

**Aufgabe 11:**

(a) Gegeben sind die Funktionen

$$f(x) = 2x - 1, \quad g(x) = x^3 \quad \text{und} \quad h(x) = |x| + 1.$$

Berechnen Sie

$$(i) (f + g)(2) \quad (ii) (f \cdot g)(-3) \quad (iii) (h - g)(1) \quad (iv) \left(\frac{g}{h}\right)(4)$$

(b) Berechnen Sie für die Funktionen  $f$ ,  $g$  und  $h$  aus Aufgabenteil (a) die folgenden Ausdrücke:

$$\begin{array}{llll} (i) & (f \circ g)(2) & (ii) & (g \circ f)(2) \\ (iii) & (g \circ h)(-3) & (iv) & (h \circ g)(-3) \\ (v) & (h \circ g \circ f)(3) & (vi) & (f \circ f)(4) \end{array}$$

(c) Zerlegen Sie folgende Funktionen in Kompositionen aus elementaren Funktionen, bzw. Linearkombination von elementaren Funktionen:

$$\begin{array}{ll} (i) & (f \circ g \circ h)(x) = \sqrt{\frac{1}{x+3}} \\ (ii) & (g \circ h \circ f)(x) = (5x)^2 - 1 \\ (iii) & (l \circ h \circ g \circ f)(x) = |7x+2| + 5 \\ (iv) & (h \circ f \circ g)(x) = \frac{1}{(3x^7+1)^{\frac{1}{7}}} \end{array}$$

gilt.

(d) Königsetappe: noch mal

$$f(x) = \cos \left( \tan^2 \left( \frac{\sqrt{x}}{2-x} \right) \right)$$


(e) und noch eins

$$f(x) = \frac{\log_a \left( (e^x + 2x^2)^2 - 1 \right)}{\sqrt[13]{x^4}}$$

Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite 16

**Laboraufgabe 12:** Komposition & Umkehrung im Kino



In einem Kino beginnt die Filmvorführung um 20:00 Uhr. Der Ansturm auf die Kassen beginnt gegen 19:20 für die reservierten Karten, hat seinen Höhepunkt gegen 19:50 und flacht dann ab. Einige verzichten auf die Werbung zu Beginn und kommen bis 20:20 Uhr verspätet und dann sind da noch die, die ohnehin immer spät dran sind. Insgesamt kann man die Anzahl am Kino ankommender Besucher\*innen mit der Funktion

$$b(t) = \alpha e^{-\beta(t-\gamma)^2}, \quad [t] = \text{sec}$$

beschreiben, wobei

$$\alpha = 2 \cdot 10^{-2}, \quad \beta = 2 \gamma^{-2}, \quad \gamma = 2100.$$

$\bar{t} = (t_i)_i \in \mathbb{N}_0^{4201}$  Zeitpunkte in Sekunden des betrachteten Bereichs  
 $\bar{b} = (b_i)_i = (b(t_i))_i \in \mathbb{R}^{4201}$  Anzahl ankommende Besucher zu diesen Zeitpunkten.

1. In einem Programm `Kino.m`: Belegen Sie die Felder `t` und `b`.
2. Belegen Sie das Feld `B` mit **ganzzahligen** Werten **anwesender** Besucher aus den Werten von `b` und die zugehörigen Zeitpunkte

$$T(i) = T(B(i)).$$

Plotten Sie die diskreten Funktionen  $T(B)$  und  $B(T)$ . Wieviele Besucher sind am Ende des betrachteten Zeitraums im Kino?

**Tipp:** Elegante Berechnung mit den Matlabfunktionen `find`, `cumsum` und `round` möglich.

3. Die Kassen (`K`) öffnen je nach Anzahl anwesender Besucher gemäß

$$K(B) = \lfloor \log(B) + 0.5 \rfloor.$$

Zur besseren Planung der Kassendienste wollen wir wissen zu welchen Uhrzeiten jeweils eine neue Kasse eröffnet werden muss.

**Hinweis:** Wir vernachlässigen die Tatsache, dass die Schlangen an den Kassen sich bei der Abfertigung auch wieder verkürzen.

Selbsteinschätzung: