

Blatt 2: Konvergenz von Reihen

Mittelwert Ihrer Selbsteinschätzung:

-1: "hab nicht mal die Aufgabe gelesen"

0: "weiß nicht wie ich anfangen soll"

1: "habe begonnen, bin dann aber hängen geblieben"

2: "konnte alles rechnen, bin aber unsicher, ob es stimmt"

3: "alles klar hier"

Aufgabe 1: Konvergenz von Reihen

Untersuchen Sie folgende Reihen auf Konvergenz. Verwenden Sie dabei verschiedene Kriterien (QK=Quotientenkriterium, WK=Wurzelkriterium, MK=Majoranten-/Minorantenkriterium, LK=Leibnizkriterium, IK=Integralkriterium). Welche Kriterien liefern eine Aussage (Di=Divergenz, Ko=Konvergenz) und welche nicht (kA=keine Aussage)?

$$\begin{array}{lll}
 (i) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n-1}{n!} & (ii) \quad \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \binom{2k}{k} & (iii) \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{3^n} \\
 (iv) \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} = \frac{1}{2} & (v) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^k} & (vi) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(k+1)} \\
 (vii) \quad \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{2k+1} & (viii) \quad \sum_{k=2}^{\infty} (-1)^k \frac{k}{k^2-1} & (ix) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2^n} \\
 (x) \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sqrt{n + \frac{1}{n}}}{n} & (xi) \quad \sum_{k=2}^{\infty} \frac{k}{k^2-1} &
 \end{array}$$

	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)
QK	Ko	Di	Ko	Ko	Ko	Ko	Ko	Ko	Di	Di	Ko
WK			Ko	Ko	Ko						
MK											
LK											
IK											

Selbsteinschätzung:

Lösung auf Seite 3

Laboraufgabe 2: _____ Mandelbrots Apfelmännchen

(a)

Komplexe Zahlen in Matlab schreibt man genau so wie man komplexe Zahlen schreibt

```
>> X=1+2*i;
```

Und man kann wie auf Papier mit Bleistift gewohnt damit rechnen:


```
>> Y=-2+3*i;
```

```
>> X+Y
```

```
>> X*Y
```

```
>> X/Y
```

Probieren Sie das mal aus.



(b) Mit den Befehlen

```
>> real(X) und >> imag(X)
```

greifen Sie jeweils auf Real- und Imaginärteil von komplexen Zahlen zu. Der Plot von komplexen Zahlen (irgendwelche mal eben) geht dann beispielsweise so:

```
>> P = rand(10,1)+i*rand(10,1);
```

```
>> plot(real(P),imag(P),'ro');
```

(c) Nun können Sie Ihre erste Folge von komplexen Zahlen programmieren:

$$X_0 = 0;$$
$$X_{n+1} = X_n^2 + C;$$

Wählen Sie für C verschiedene komplexe Zahlen. Etwa:

```
C=-0.19-i*0.6; ,
```

```
C=1+i; ,
```

```
C=-0.2+0.75*i;
```

Plotten Sie X_0, \dots, X_{100} .

(d) Legen Sie ein Raster über das Gebiet $[-2, 1] \times [-1, 1]$ mit einem Feinheitgrad, der über einen Parameter bestimmt werden kann. Berechnen Sie Folgenglieder für jedes C , welches einem Rasterknoten entspricht und das für alle Knoten. Plotten Sie nicht die Folge, sondern das jeweilige C , wenn die Folge konvergiert.

(e) Wiederholen Sie Punkt (d) für Folgen mit Häufungspunkten.

Selbsteinschätzung: