

# Metody Optymalizacji - Lista 1

Janusz Witkowski 254663

2 kwietnia 2023

## 1 Zadanie 1

### 1.1 Model

#### 1.1.1 Zmienne decyzyjne

Użyta została tylko jedna zmienna decyzyjna  $\mathbf{X}$ , która jest wektorem spełniającym warunek  $\mathbf{X} \geq \mathbf{0}$ . Teoretycznym rozwiązaniem problemu będącego zagadnieniem tego zadania jest wektor  $\mathbf{Y} = \mathbf{1}$ . Będziemy mogli później porównać wynikowy wektor  $\mathbf{X}$  z  $\mathbf{Y}$ , aby przekonać się o precyzji GNU MathProg.

#### 1.1.2 Ograniczenia

Za ograniczenia przyjmujemy równania liniowe podane w treści zadania:

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

przy warunkach

$$a_{ij} = \frac{1}{i+j-1}, i, j \in 1, \dots, n$$
$$c_i = b_i = \sum_{j=1}^n \frac{1}{i+j-1}, i \in 1, \dots, n$$

Macierz  $A$  jest tzw. macierzą Hilberta, powodującą złe uwarunkowanie zagadnienia.

#### 1.1.3 Funkcja celu

Funkcja celu ma postać podaną w treści polecenia

$$\min \mathbf{c}^T \mathbf{x}$$

## 1.2 Wyniki

## 2 Zadanie 2

### 2.1 Model

#### 2.1.1 Zmienne decyzyjne

Chcemy w pewien sposób zamodelować rozkład jazdy dźwigów różnego typu z jednych miast do innych. Na razie przyjmijmy, że dźwigów nie da się podzielić, żebyśmy obracali się w programowaniu całkowitoliczbowym. Zdefiniujemy następującą zmienną decyzyjną:

$$x \in \mathbb{Z}^{n \times n \times 2}, x \geq 0$$

Przez  $x_{abt}$  będziemy rozumieć ile dźwigów typu  $t$  należy przetransportować z miasta  $a$  do miasta  $b$ .

### 2.1.2 Parametry

Wprowadźmy pewne parametry, ściśle związane z problemem.

$$d \in \mathbb{Z}^{2 \times n}, d \geq 0$$

$$r \in \mathbb{Z}^{2 \times n}, r \geq 0$$

$$z \in \{0, 1\}^{2 \times 2}$$

$$l \in \mathbb{R}^{n \times n}, l \geq 0$$

$$k \in \mathbb{R}^2, k \geq 0$$

Niech  $d_{ta}$  oznacza ile dźwigów typu  $t$  brakuje w mieście  $a$ . Niech  $r_{ta}$  oznacza nadmiar dźwigów typu  $t$  w mieście  $a$ . Niech  $z_{ts}$  oznacza czy dźwig typu  $t$  może zastąpić dźwig typu  $s$ . Niech  $l_{ab}$  oznacza dystans w kilometrach między miastem  $a$  a miastem  $b$ . Niech  $k_t$  oznacza koszt transportu dźwigu typu  $t$  za każdy przebyty kilometr.

### 2.1.3 Ograniczenia

Aby zagwarantować dopuszczalność potencjalnych rozkładów transportu, zdefiniujmy trzy ograniczenia:

1. **Nasyć popyt na różne typy** - każde miasto powinno otrzymać takie dźwigi aby mogło funkcjonować (dźwigi typu II mogą zastąpić dźwigi typu I)

$$(\forall a \in \{1, \dots, n\}, t \in \{I, II\}) \left( \sum_{b=1}^n \sum_{s \in \{I, II\}} x_{abs} \cdot z_{st} \geq d_{ta} \right)$$

2. **Z pustego nawet Salomon nie należy** - miasto nie może oddać więcej dźwigów niż samo posiada

$$(\forall a \in \{1, \dots, n\}, t \in \{I, II\}) \left( \sum_{b=1}^n x_{abt} \leq r_{ta} \right)$$

3. **Nie zgub żadnego dźwigu po drodze** - potrzebujące miasta powinny dostać łącznie tyle dźwigów by zaspokoić swoje niedobory

$$(\forall a \in \{1, \dots, n\}) \left( \sum_{b=1}^n \sum_{t \in \{I, II\}} x_{abs} \geq \sum_{s \in \{I, II\}} d_{sa} \right)$$

### 2.1.4 Funkcja celu

Chcemy zminimalizować koszty transportu dźwigów między miastami. Zaproponujmy następującą funkcję celu:

$$\min \sum_{t \in \{I, II\}} \sum_{a=1}^n \sum_{b=1}^n l_{ab} \cdot x_{abt} \cdot k_t$$

## 2.2 Wyniki

# 3 Zadanie 3

## 3.1 Model

### 3.1.1 Zmienne decyzyjne

### 3.1.2 Ograniczenia

### 3.1.3 Funkcja celu

## 3.2 Wyniki

# 4 Zadanie 4

## 4.1 Model

### 4.1.1 Zmienne decyzyjne

W modelu wykorzystano następujące zmienne decyzyjne:

$$\begin{aligned}x &\in \{0, 1\}^{n \times m} \\t &\in \{0, 1\}^{\{1, \dots, 5\} \times \{1, \dots, 48\}} \\s &\in \{0, 1\}^{\{1, 2, 3\}}\end{aligned}$$

$x_{gc}$  oznacza zapis Studenta na kurs  $c$  do grupy  $g$ .  $t_{dh}$  indykuje czy Student jest zajęty w dniu  $d$  o godzinie  $h/2$ .  $s_k$  mówi czy Student zapisał się na zajęcia sportowe  $k$ .

### 4.1.2 Parametry

W modelu wykorzystano następujące parametry, ściśle powiązane z problemem:

$$\begin{aligned}r &\in \mathbb{Z}^{n \times m}, 0 \leq r \leq 10 \\w &\in \mathbb{Z}^{n \times m}, 1 \leq w \leq 5 \\b &\in \mathbb{Z}^{n \times m}, 1 \leq b \leq 48 \\e &\in \mathbb{Z}^{n \times m}, 1 \leq e \leq 48 \\sw &\in \mathbb{Z}^{[3]}, 1 \leq sw \leq 5 \\sb &\in \mathbb{Z}^{[3]}, 1 \leq sb \leq 48 \\se &\in \mathbb{Z}^{[3]}, 1 \leq se \leq 48\end{aligned}$$

$r_{gc}$  jest oceną (priorytetem) grupy, ustawioną przez Studenta.  $w_{gc}$  mówi w którym dniu tygodnia odbywają się zajęcia grupy  $g$  kursu  $c$ .  $b_{gc}$  oznacza o której pół-godzinie zajęcia się zaczynają.  $e_{gc}$  oznacza o której pół-godzinie zajęcia się kończą. Analogicznie dla  $sw$ ,  $sb$ ,  $se$  dla zajęć sportowych.

#### 4.1.3 Ograniczenia

Musimy rozpisać kilka ograniczeń do określenia modelu, zarówno dla podstawowego wariantu zadania, jak i rozszerzonego.

1. **Realizacja programu studiów** - Student musi zapisać się do dokładnie jednej grupy zajęciowej dla każdego kursu

$$(\forall c \in [m]) \left( \sum_{g \in [n]} x_{gc} \right) = 1$$

2. **Sport to zdrowie** - Student chce zapisać się na co najmniej jedną z trzech możliwych grup z zajęć sportowych

$$\sum_{i \in [3]} s_i \geq 1$$

3. **Nie żyjemy w kwantowej superpozycji** - zajęcia nie mogą się na siebie nakładać (zapiszemy tu od razu terminy)

$$(\forall d \in [5], h \in [24 \cdot 2]) t_{dh} = \left( \sum_{g \in [n]} \sum_{c \in [m]} x_{gc} \cdot (\text{if } d_{gc} = d \text{ then } 1 \text{ else } 0) \cdot (\text{if } h < b_{gc} \text{ then } 0 \text{ else } (\text{if } h \geq e_{gc} \text{ then } 0 \text{ else } 1)) \right) + \\ \left( \sum_{i \in [3]} (\text{if } sw_i \neq d \text{ then } 0 \text{ else } (\text{if } h < sb_i \text{ then } 0 \text{ else } (\text{if } h \geq se_i \text{ then } 0 \text{ else } 1))) \right)$$

4. **Nie przemęczaj się** - maksymalnie 4 godziny zajęć obowiązkowych w dniu

$$(\forall d \in [5]) \left( \sum_{g \in [n]} \sum_{c \in [m]} x_{gc} \cdot (\text{if } d_{gc} = d \text{ then } b_{gc} - e_{gc} \text{ else } 0) \right)$$

5. **Przez żołądek do mózgu** - każdego dnia znajdź co najmniej 1 godzinę przerwy między 12:00 a 14:00 (tj. nie zajmuj w tym okresie więcej niż 1 godziny zajęciami)

$$(\forall d \in [5]) \left( \sum_{h \in \{12 \cdot 2, \dots, 14 \cdot 2 - 1\}} t_{dh} \right) \leq 1 \cdot 2$$

6. *[Rozszerzenie]* **Napięty grafik tygodnia** - środy i piątki mają być wolne od zajęć obowiązkowych

$$(\forall d \in \{3, 5\}) \left( \sum_{g \in [n]} \sum_{c \in [m]} x_{gc} \cdot (\text{if } w_{gc} = d \text{ then } 1 \text{ else } 0) \right) = 0$$

7. *[Rozszerzenie]* **Ponadprzeciętna satysfakcja** - wybieraj kursy o ocenie równej co najmniej 5

$$\left( \sum_{g \in [n]} \sum_{c \in [m]} x_{gc} \cdot (\text{if } r_{gc} < 5 \text{ then } 1 \text{ else } 0) \right) = 0$$

#### 4.1.4 Funkcja celu

Student chce zmaksymalizować sumę punktów priorytetowych z każdych zajęć na które się zapisze.

$$\max \sum_{g \in [n]} \sum_{c \in [m]} x_{gc} \cdot r_{gc}$$

## 4.2 Wyniki

Znaleziony podstawowy grafik ma wartość funkcji celu równą 37 i wygląda następująco:

| Kurs       | Grupa |
|------------|-------|
| Algebra    | III   |
| Analiza    | II    |
| Fizyka     | IV    |
| Minerały   | I     |
| Organiczna | II    |

Możemy zobaczyć jak wygląda ten grafik godzinowo:

|       | Pn. | Wt. | Śr. | Cz. | Pt. |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8:00  | x   |     |     |     |     |
| 8:30  | x   |     |     |     |     |
| 9:00  | x   |     |     |     |     |
| 9:30  | x   |     |     |     |     |
| 10:00 |     | x   | x   |     |     |
| 10:30 | x   | x   | x   |     |     |
| 11:00 | x   | x   | x   |     |     |
| 11:30 | x   | x   | x   |     |     |
| 12:00 |     |     |     |     |     |
| 12:30 |     |     |     |     |     |
| 13:00 |     |     |     |     |     |
| 13:30 |     |     |     |     |     |
| 14:00 |     |     |     |     |     |
| 14:30 |     |     |     |     |     |
| 15:00 |     |     |     |     |     |
| 15:30 |     |     |     |     |     |
| 16:00 |     |     |     |     |     |
| 16:30 |     |     |     |     |     |
| 17:00 |     |     |     | x   |     |
| 17:30 |     |     |     | x   |     |
| 18:00 |     |     |     | x   |     |
| 18:30 |     |     |     | x   |     |
| 19:00 |     |     |     | x   |     |
| 19:30 |     |     |     | x   |     |
| 20:00 |     |     |     |     |     |

Widać, że Student nie ma więcej niż 4 godzin ćwiczeń dziennie, ma możliwe przerwy na lunch, oraz że może uprawiać sport w co najmniej jednej grupie (tj. Pn 13:00-15:00).

Po wczytaniu modelu dla wariantu rozszerzonego, udało się odnaleźć takie oto rozwiązanie z wartości funkcji celu równą 28:

| Kurs       | Grupa |
|------------|-------|
| Algebra    | I     |
| Analiza    | IV    |
| Fizyka     | II    |
| Minerały   | III   |
| Organiczna | II    |

|       | Pn. | Wt. | Śr. | Cz. | Pt. |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 8:00  |     |     |     | x   |     |
| 8:30  |     |     |     | x   |     |
| 9:00  |     |     |     | x   |     |
| 9:30  |     |     |     | x   |     |
| 10:00 |     | x   |     |     |     |
| 10:30 | x   | x   |     |     |     |
| 11:00 | x   | x   |     |     |     |
| 11:30 | x   | x   |     |     |     |
| 12:00 |     | x   |     |     |     |
| 12:30 |     | x   |     |     |     |
| 13:00 | x   |     |     | x   |     |
| 13:30 | x   |     |     | x   |     |
| 14:00 | x   |     |     | x   |     |
| 14:30 | x   |     |     | x   |     |
| 15:00 |     |     |     |     |     |
| 15:30 |     |     |     |     |     |
| 16:00 |     |     |     |     |     |
| 16:30 |     |     |     |     |     |
| 17:00 |     |     |     |     |     |
| 17:30 |     |     |     |     |     |
| 18:00 |     |     |     |     |     |
| 18:30 |     |     |     |     |     |
| 19:00 |     |     |     |     |     |
| 19:30 |     |     |     |     |     |
| 20:00 |     |     |     |     |     |

Tutaj Student również ma swobodę w lunchu i w uprawianiu sportu (grupa Śr 11:00-13:00).