

# 峰考速成课

## 《复变函数与积分变换》

习题答案

(微信扫一扫)



### 版权声明:

内容来自高斯课堂原创, 讲义笔记和相关图文均有著作权, 视频课程已申请版权, 登记号: 陕作登字-2018-I-00001958, 根据《中华人民共和国著作权法》、《中华人民共和国著作权法实施条例》、《信息网络传播权保护条例》等有关规定, 如有侵权, 将根据法律法规提及诉讼。

## 课时一 复数

考点	重要程度	分值	常见题型
1. 复数的表示、几何意义	★★★★★	6 ~ 12	选择、填空
2. 复数的运算		3 ~ 4	选择、填空
3. 复数的方根		3 ~ 8	计算题、选择、填空

### 1. 复数的表示、几何意义


(1)  $z = x + iy$

$x$ : 实部,  $Re(z)$

$y$ : 虚部,  $Im(z)$

$r$ :  $z$  的模长,  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$

$\theta$ :  $z$  的辐角  $\begin{cases} \text{Arg } z = \theta + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots \\ \arg z = \theta, -\pi < \theta \leq \pi, \text{ 辐角主值, 也叫主辐角} \end{cases}$



(2)  $z = re^{i\theta}$  指数表示


(3)  $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$  三角表示

题 1. 设  $z = 1 - i$ , 则  $\arg z =$  ( )。

A.  $-1$       B.  $\frac{\pi}{2}$       C.  $-\frac{\pi}{4}$       D.  $\frac{\pi}{4}$

解:  $\arctan 1 = \frac{\pi}{4}$        $\arg z = -\frac{\pi}{4}$

答案: C




题 2. 数  $\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$  的指数形式为 \_\_\_\_\_, 三角形式为 \_\_\_\_\_。

解:  $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$

$\arctan \left| \frac{y}{x} \right| = \frac{\pi}{3} \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{3}$

$z = re^{i\theta} = e^{-\frac{\pi}{3}i}$

$= r(\cos \theta + i \sin \theta) = \cos\left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right)$



题 3.  $\sin \alpha + i \cos \alpha$  的三角表示式\_\_\_\_\_，指数表示式\_\_\_\_\_。

解：  $\sin \alpha = \cos \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) \quad \cos \alpha = \sin \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right)$

$$\sin \alpha + i \cos \alpha = \cos \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) + i \sin \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right) = e^{i \left( \frac{\pi}{2} - \alpha \right)}$$

题 4. 把方程  $|z - 2i| = |z + 2i|$  表示成直角坐标方程。

解：令  $z = x + iy$ ，代入得  $|x + iy - 2i| = |x + iy + 2i|$

整理得  $|x + i(y - 2)| = |x + i(y + 2)|$

$$\sqrt{x^2 + (y - 2)^2} = \sqrt{x^2 + (y + 2)^2}$$

两边平方得：  $x^2 + (y - 2)^2 = x^2 + (y + 2)^2$

化简得  $y = 0$

题 5. 方程  $|z + 2 - 3i| = \sqrt{2}$  所代表的曲线是 ( )。

- A. 中心为  $2 - 3i$ ，半径为  $\sqrt{2}$  的圆周      B. 中心为  $-2 + 3i$ ，半径为 2 的圆周
- C. 中心为  $-2 + 3i$ ，半径为  $\sqrt{2}$  的圆周      D. 中心为  $2 - 3i$ ，半径为 2 的圆周

解：  $|z - (-2 + 3i)| = \sqrt{2}$ ， $z$  点到  $(-2 + 3i)$  点的距离等于  $\sqrt{2}$

答案：C

## 2、复数的运算

题 1. 设  $z_1 = 1 + 2i$ ， $z_2 = 3 + 4i$ ，则  $z_1 + z_2 =$ \_\_\_\_\_， $\operatorname{Re} \left( \frac{z_1}{z_2} \right) =$ \_\_\_\_\_。

解：  $z_1 + z_2 = (1 + 2i) + (3 + 4i) = (1 + 3) + (2 + 4)i = 4 + 6i$

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{1 + 2i}{3 + 4i} = \frac{(1 + 2i)(3 - 4i)}{(3 + 4i)(3 - 4i)} \\ &= \frac{1 \times 3 - 1 \times 4i + 2i \times 3 + 2i \times (-4i)}{3^2 - (4i)^2} = \frac{3 + (-4 + 6)i - (-8)}{3^2 + 4^2} \\ &= \frac{11 + 2i}{25} \Rightarrow \operatorname{Re} \left( \frac{z_1}{z_2} \right) = \frac{11}{25} \end{aligned}$$

1.  $i^2 = -1$

2.  $z = x + iy, \bar{z} = x - iy$

3.  $(x_1 + iy_1) \pm (x_2 + iy_2)$   
 $= (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$

4.  $(x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2)$   
 $= (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_2y_1 + x_1y_2)$

5.  $\frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)}$

题 2. 当  $z = \frac{1+i}{1-i}$  时,  $z^{100} + z^{75} + z^{50}$  的值等于 ( )。

A.  $i$ B.  $-i$ C.  $1$ D.  $-1$ 

解:  $z = \frac{1+i}{1-i} = \frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i-1}{2} = i$


$$i^1 = i \quad i^2 = -1 \quad i^3 = -i \quad i^4 = 1 \quad i^5 = i \quad \dots$$

$$z^{100} + z^{75} + z^{50} = i^{4 \times 25} + i^{4 \times 18 + 3} + i^{4 \times 12 + 2} = i^0 + i^3 + i^2 = 1 - i - 1 = -i$$

答案: B

题 3. 复数  $\frac{(\cos 4\theta + i \sin 4\theta)^2}{(\cos 3\theta - i \sin 3\theta)^3}$  的指数形式为\_\_\_\_\_。

解: 原式 =  $\frac{(\cos 4\theta + i \sin 4\theta)^2}{[\cos(-3\theta) + i \sin(-3\theta)]^3} = \frac{(e^{i4\theta})^2}{(e^{-i3\theta})^3} = \frac{e^{2 \times 4i\theta}}{e^{3 \times (-3i\theta)}} = e^{2 \times 4i\theta - 3 \times (-3i\theta)} = e^{17i\theta}$



$$z_1 = r_1 e^{i\theta_1} \quad z_2 = r_2 e^{i\theta_2}$$

$$1. \quad z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot r_2 e^{i(\theta_1 + \theta_2)}$$

$$2. \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\theta_1 - \theta_2)}$$

### 3. 复数的方根

题 1. 设  $z = 1 + \sqrt{3}i$ , 求  $z^{\frac{1}{6}}$

解: 把  $z$  化成三角表示式  $z = 1 + \sqrt{3}i = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right)$

$$\text{设 } \omega = \rho (\cos \varphi + i \sin \varphi) = \left[ 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) \right]^{\frac{1}{6}}$$

$$\text{代入 } \rho = 2^{\frac{1}{6}} \quad \varphi = \frac{\frac{\pi}{3} + 2k\pi}{6}, k = 0, 1, \dots, 5$$

$$\omega = \sqrt[n]{x + iy} = (x + iy)^{\frac{1}{n}}$$

$$(1) \quad x + iy = r (\cos \theta + i \sin \theta)$$

$$(2) \quad \text{设 } \omega = \rho (\cos \varphi + i \sin \varphi) \\ = [r (\cos \theta + i \sin \theta)]^{\frac{1}{n}}$$

$$(3) \quad \text{代入 } \rho = r^{\frac{1}{n}}, \quad \varphi = \frac{\theta + 2k\pi}{n}, \\ k = 0, 1, \dots, n-1$$

$$\varphi_1 = \frac{1}{6} \times \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{18} \quad \omega_1 = 2^{\frac{1}{6}} \left( \cos \frac{\pi}{18} + i \sin \frac{\pi}{18} \right) \quad \varphi_2 = \frac{1}{6} \times \left( \frac{\pi}{3} + 2\pi \right) = \frac{7}{18}\pi \quad \omega_2 = 2^{\frac{1}{6}} \left( \cos \frac{7}{18}\pi + i \sin \frac{7}{18}\pi \right)$$

$$\varphi_3 = \frac{1}{6} \times \left( \frac{\pi}{3} + 2 \times 2\pi \right) = \frac{13}{18}\pi \quad \omega_3 = 2^{\frac{1}{6}} \left( \cos \frac{13}{18}\pi + i \sin \frac{13}{18}\pi \right)$$

$$\varphi_4 = \frac{1}{6} \times \left( \frac{\pi}{3} + 2 \times 3\pi \right) = \frac{19}{18}\pi \quad \omega_4 = 2^{\frac{1}{6}} \left( \cos \frac{19}{18}\pi + i \sin \frac{19}{18}\pi \right)$$

$$\varphi_5 = \frac{1}{6} \times \left( \frac{\pi}{3} + 2 \times 4\pi \right) = \frac{25}{18}\pi \quad \omega_5 = 2^{\frac{1}{6}} \left( \cos \frac{25}{18}\pi + i \sin \frac{25}{18}\pi \right)$$

$$\varphi_6 = \frac{1}{6} \times \left( \frac{\pi}{3} + 2 \times 5\pi \right) = \frac{31}{18}\pi \quad \omega_6 = 2^{\frac{1}{6}} \left( \cos \frac{31}{18}\pi + i \sin \frac{31}{18}\pi \right)$$

## 题 2. 求方程 $z^3 + 8 = 0$ 的所有根。

解：  $z^3 = -8 \Rightarrow (z^3)^{\frac{1}{3}} = (-8)^{\frac{1}{3}} \Rightarrow z = (-8)^{\frac{1}{3}}$

$$-8 = 8(\cos \pi + i \sin \pi)$$

设  $\omega = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi) = [8(\cos \pi + i \sin \pi)]^{\frac{1}{3}}$  为  $z^3 + 8 = 0$  的根

$$\rho = 8^{\frac{1}{3}} = 2 \quad \varphi = \frac{\pi + 2k\pi}{3}, k = 0, 1, 2$$

$$\varphi_1 = \frac{\pi}{3}$$


$$\omega_1 = 2 \left( \cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right) = 1 + \sqrt{3}i$$

$$\varphi_2 = \frac{1}{3}(\pi + 2\pi) = \pi$$

$$\omega_2 = 2(\cos \pi + i \sin \pi) = -2$$

$$\varphi_3 = \frac{1}{3}(\pi + 4\pi) = \frac{5}{3}\pi$$

$$\omega_3 = 2 \left( \cos \frac{5}{3}\pi + i \sin \frac{5}{3}\pi \right) = 1 - \sqrt{3}i$$



## 课时一 练习题

1. 复数  $z = -\frac{16}{25} - \frac{16}{25}i$  的主辐角为 ( )。

- A.  $\frac{\pi}{4}$       B.  $-\frac{\pi}{4}$       C.  $\frac{3\pi}{4}$       D.  $-\frac{3\pi}{4}$

2. 复数  $i$  的模为\_\_\_\_\_，主辐角为\_\_\_\_\_，指数表示为\_\_\_\_\_。

3. 已知  $|z| = \sqrt{2}$ ,  $\arg z = \frac{3\pi}{4}$ ，则指数表示  $z =$ \_\_\_\_\_。

4. 求复数  $z = 2e^{\frac{\pi}{3}i}$  的实部、虚部、模以及辐角的值。

5. 方程  $|z+2| = |z-2|$  在  $z$  平面上表示 ( )。

- A. 直线  $x=2$       B. 直线  $y=2$       C. 实轴      D. 虚轴

6. 方程  $|z+2i| = 2$  所代表的曲线是 ( )。

- A. 直线      B. 圆      C. 椭圆      D. 双曲线

7. 方程  $|z-2| = 7 - |z+1|$  表示一个\_\_\_\_\_。

8. 复数  $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$  的模为\_\_\_\_\_辐角为\_\_\_\_\_指数形式为\_\_\_\_\_。

9.  $i^4 - 4i^{-17} + i =$ \_\_\_\_\_。

10.  $\frac{(\cos 2\varphi + i \sin 2\varphi)^3}{(\cos 2\varphi - i \sin 2\varphi)^4} =$ \_\_\_\_\_。

11. 设  $\frac{3+i}{(1+i)^2} = re^{i\theta}$ ，则  $r =$ \_\_\_\_\_。

12. 求  $\sqrt[4]{1+i}$  的值。

13. 若  $z^3 + 8 = 0$ ，且  $\text{Im}(z) > 0$ ，则\_\_\_\_\_。

A.  $z = 2\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$       B.  $z = 2\left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$       C.  $z = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$       D.  $z = 2\left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$

14. 方程  $z^4 + 1 = 0$  的所有根为\_\_\_\_\_。

## 课时二 复变函数

考点	重要程度	占分	常见题型
1. 导数	★★★	3 ~ 4	选择、填空
2. 解析函数	★★★★	6 ~ 10	大题
3. 调和函数	必考	6 ~ 10	大题

### 1. 导数

题 1. 已知  $f(0)=1, f'(0)=1+i$ , 则  $\lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)-1}{z} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\text{解: } \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(z)-1}{z} = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{f(0+z)-f(0)}{z} = f'(0) = 1+i$$

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta z) - f(z_0)}{\Delta z}$$

题 2. 已知  $f(z) = \sin z - 2ie^{-z} + z^2 + 3 - i$ , 则  $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\text{解: } f'(z) = \cos z + 2ie^{-z} + 2z$$

$$f'(0) = f'(z)|_{z=0} = 1 + 2i$$

题 3. 函数  $f(z) = xy + iy$  仅在点  $z = \underline{\hspace{2cm}}$  处可导, 且在该点的导数值为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

$$\text{解: } u(x, y) = xy, v(x, y) = y$$

$$\text{代入 } C-R \text{ 方程 } \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} y = 1 \\ x = 0 \end{cases}$$

$\Rightarrow$  在点  $z = i$  可导

$$f'(z)|_{z=i} = \left( \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} \right) \Big|_{z=i} = (y + i0) \Big|_{z=i} = 1$$

$f(z) = u + iv$  在点  $z$  处可导

$$\Leftrightarrow u, v \text{ 在该点可导且满足 } \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$$

柯西-黎曼方程 (C-R 方程)

$$f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} - i \frac{\partial u}{\partial y}$$

### 2. 解析函数

$f(z) = u + iv$  在区域  $D$  内解析

$\Leftrightarrow u, v$  在区域  $D$  内可导且满足 C-R 方程

$\Leftrightarrow f(z)$  在区域  $D$  内处处可导

题 1. 函数  $f(z) = x^2 + iy^2$ , 判断  $f(z)$  在何处可导, 何处解析。

解:  $u(x, y) = x^2$ ,  $v(x, y) = y^2$

$$\text{代入 } C-R \text{ 方程 } \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} 2x = 2y \\ 0 = 0 \end{cases} \Rightarrow x = y$$

$\therefore f(z)$  在  $x = y$  上可导, 在复平面处处不解析

① 写出  $u(x, y)$ ,  $v(x, y)$

② 代入  $C-R$  方程  $\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases}$

③ 求出可导/解析区域

题 2. 设函数  $f(z) = my^3 + nx^2y + i(x^3 + kxy^2)$  在  $z$  平面上解析, 求  $m, n, k$  的值

解:  $u(x, y) = my^3 + nx^2y$ ,  $v(x, y) = x^3 + kxy^2$

$$\text{代入 } C-R \text{ 方程 } \begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x} \end{cases} \text{ 得 } \begin{cases} 2nxy = 2kxy \\ 3my^2 + nx^2 = -3x^2 - ky^2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m = 1 \\ n = -3 \\ k = -3 \end{cases}$$

题 3. 下列说法正确的是 ( )

A. 如果  $f(z) = u + iv$  在  $z_0$  连续, 则  $f(z)$  在  $z_0$  可导

B. 如果  $f(z) = u + iv$  在  $z_0$  可导, 则  $f(z)$  在  $z_0$  解析

C. 如果  $f(z) = u + iv$  在  $z_0$  不解析, 则  $f(z)$  在  $z_0$  不可导

D. 如果  $f(z) = u + iv$  在  $z_0$  可导, 则  $f(z)$  在  $z_0$  连续

答案: D

连续  $\nRightarrow$  可导  $\nRightarrow$  解析

不连续  $\nRightarrow$  不可导  $\nRightarrow$  不解析

题 4. 函数  $f(z)$  在点  $z_0$  可导是  $f(z)$  在点  $z_0$  解析的 ( )

A. 必要但不充分条件

B. 充分但不必要条件

C. 充分必要条件

D. 既不充分也不必要条件

答案: A

### 3. 调和函数

1. 调和函数  $\varphi(x, y)$ :  $\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2} = 0$

2. 解析函数  $f(z) = u + iv$  满足  $\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \\ \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0 \end{cases}$

3. 解析函数的虚部  $v$  称为实部  $u$  的共轭调和函数



题 1. 函数  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  在区域  $D$  内解析, 则下列命题中错误的是 ( )

- A. 函数  $f(z)$  在区域  $D$  内可导
- B. 函数  $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$  是区域  $D$  的调和函数
- C. 函数  $u(x, y)$ 、 $v(x, y)$  在区域  $D$  内满足柯西黎曼方程
- D. 函数  $u(x, y)$  是  $v(x, y)$  在区域  $D$  内的共轭调和函数

答案: D

题 2. 验证  $u(x, y) = x^2 - y^2 + xy$  是调和函数, 并求相应的解析函数,  $f(z) = u + iv$ , 使其满足  $f(0) = 0$ 。

解: 验证:  $\frac{\partial u}{\partial x} = 2x + y$        $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 2$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -2y + x \quad \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -2$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0 \Rightarrow u(x, y) \text{ 是调和函数}$$

由  $C-R$  方程  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}$  得  $v = \int \frac{\partial u}{\partial x} dy = \int (2x + y) dy = 2xy + \frac{1}{2}y^2 + C(x)$

由  $\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$  得  $\frac{\partial v}{\partial x} = 2y + C'(x) = -(-2y + x) = 2y - x \Rightarrow C'(x) = -x$

$$\Rightarrow C(x) = \int -x dx = -\frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$\therefore v = 2xy + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 + C_1$$

$$\therefore f(z) = u + iv = x^2 - y^2 + xy + i \left( 2xy + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 + C_1 \right)$$

$$z = x + iy$$

由  $f(0) = 0$  得  $C_1 = 0$

$$\therefore f(z) = u + iv = x^2 - y^2 + xy + i \left( 2xy + \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}x^2 \right) = z^2 - \frac{1}{2}iz^2$$

## 课时二 练习题

1. 设  $f(z) = z^5 + z^3 + 2$ , 则  $f'(1+i) =$ \_\_\_\_\_。

A.  $-20+6i$

B.  $20+6i$

C.  $-20-6i$

D.  $20-6i$

2.  $f(z) = (z^2 + \sin z)^2$ , 求  $f'(z)$

3. (判断) 如果  $u(x, y)$  和  $v(x, y)$  可导, 那么  $f = u + iv$  也可导 ( )。

4. 柯西黎曼方程是指 ( )。

A.  $\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}$

B.  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}$

C.  $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{\partial v}{\partial y}$

D.  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$

5. 设  $f(z) = 3x + y + i(3y - x)$ , 则  $f'(-1+i) =$ \_\_\_\_\_。

6. 设  $f(z) = x^3 + y^3 + i(x^2 + y^2)$ , 则  $f'(1+i) =$ \_\_\_\_\_。

7. (判断) 若  $f(z)$  在  $z_0$  点不解析, 则  $f(z)$  在  $z_0$  点必不可导。

8. 若  $f(z) = xy^2 + ix^2y$ , 则  $f(z)$  满足 ( )。

A. 仅在直线  $y = x$  上可导B. 仅在直线  $y = -x$  上可导C. 仅在  $z = 0$  点解析D. 仅在  $z = 0$  点可导

9. 函数  $f(z) = 2x^2 + 3y^2i$  在何处可导, 在何处解析。

10. 设函数  $f(z) = x^2 + axy + by^2 + i(cx^2 + dxy + y^2)$ , 则  $a, b, c, d$  取何值时,  $f(z)$  在平面处处解析。

11. 设  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$  是解析函数, 则  $u$  与  $v$  的关系是\_\_\_\_\_。

12. 证明  $u = 3x^2 - 3y^2 - 2y$  是调和函数, 并求满足  $f(0) = i$  的解析函数  $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$

13. 设  $v = 2x^2 - 2y^2 + x$ , 求解析函数  $f(z) = u + iv$ , 且满足  $f(1) = 3i$

## 课时三 初等函数

考点	重要程度	分值	常见题型
1. exp 指数函数	★★★★	3 ~ 8	选择、填空、计算题
2. Ln 对数函数			
3. $a^b$ 幂函数			
4. 三角函数			

### 1. exp 指数函数

题 1.  $f(z) = e^z$  是周期函数。( )

答案：√

$$1. \exp z = e^z = e^x (\cos y + i \sin y)$$

2.  $\exp z$  以  $2k\pi i$  为周期

题 2. 计算  $e^{\frac{1-\pi}{3}i}$

$$\text{解：原式} = e \left[ \cos \left( -\frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left( -\frac{\pi}{3} \right) \right] = e \left( \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right)$$

### 2. Ln 对数函数

题 1.  $\ln(1+i) = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\text{解：原式} = \ln|1+i| + i \arg(1+i) = \ln\sqrt{2} + i\frac{\pi}{4} = \frac{1}{2}\ln 2 + i\frac{\pi}{4}$$

$$e^\omega = z, \text{ 则 } \omega = \text{Ln} z$$

$$\text{Ln} z = \ln|z| + i \text{Arg} z$$

$$\ln z = \ln|z| + i \arg z \quad \text{主值}$$

题 2.  $e^z - 1 - \sqrt{3}i = 0$ , 则  $\text{Re}(z) = ( \quad )$

A.  $2\ln 2$

B.  $\ln 2$

C.  $\frac{\pi}{3}$

D.  $\frac{2\pi}{3}$

$$\text{解：} e^z = 1 + \sqrt{3}i$$

$$z = \text{Ln}(1 + \sqrt{3}i) = \ln|1 + \sqrt{3}i| + i \text{Arg}(1 + \sqrt{3}i) = \ln 2 + i \left( \frac{\pi}{3} + 2k\pi \right), \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\text{实部 } \text{Re}(z) = \ln 2$$

答案：B

题 3. 下列等式中成立的是 ( )

A.  $\ln z^2 = 2 \ln z$

B.  $\text{Ln} z^2 = 2 \text{Ln} z$

C.  $\text{Arg}(2i) = 2 \text{Arg}(i)$

D.  $e^{i\pi} - 1 = 0$

解：设  $z = re^{i\theta}$ ，则  $z^2 = r^2 e^{2i\theta}$

$$A: \ln z^2 = \ln |z^2| + i \arg(z^2) = \ln r^2 + i2\theta$$

$$= 2 \ln r + 2i\theta = 2(\ln r + i\theta) = 2 \ln z$$

$$B: \operatorname{Ln} z^2 = \ln |z^2| + i \operatorname{Arg}(z^2) = 2 \ln r + i(2\theta + 2k\pi),$$

$$2 \operatorname{Ln} z = 2[\ln r + i(\theta + 2k\pi)] = 2 \ln r + i(2\theta + 4k\pi)$$

$$C: \operatorname{Arg}(2i) = \operatorname{Arg} i = \frac{\pi}{2} + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$D: e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 \quad \therefore e^{i\pi} - 1 \neq 0$$

答案：A

### 3. $a^b$ 幂函数 $a^b = e^{b \operatorname{Ln} a}$

#### 题 1. 计算 $(-1)^i$ 的值

解：原式  $= e^{i \times \operatorname{Ln}(-1)} = e^{i[\ln|-1| + i \operatorname{Arg}(-1)]} = e^{-(\pi + 2k\pi)}, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$

#### 题 2. 计算 $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{1+i}$ 的主值

解：主值  $\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)^{1+i} = e^{(1+i)\ln\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)} = e^{(1+i)\left(\ln\left|\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right| + i \arg\left(\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i\right)\right)} = e^{(1+i) \cdot i \frac{\pi}{3}} = e^{-\frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}i}$

### 4. 三角函数

#### 题 1. $2 \sin i$ 的值等于

$$A. (e - e^{-1})i$$

$$B. (e + e^{-1})^i$$

$$C. e - e^{-1}$$

$$D. e + e^{-1}$$

解：原式  $= 2 \frac{e^{i \times i} - e^{-i \times i}}{2i} = \frac{e^{-1} - e}{i} = (e - e^{-1})i$

答案：A

#### 题 2. 若 $z$ 为任意复数，则 $|\sin z| \leq 1$ ( )

答案：×

$$1. \sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

$$\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

$$2. \sin iy = \frac{e^{-y} - e^y}{2i} = i \operatorname{sh} y \quad \text{双曲正弦函数}$$

$$\cos iy = \frac{e^{-y} + e^y}{2} = \operatorname{ch} y \quad \text{双曲余弦函数}$$

3.  $|\sin z| \leq 1, |\cos z| \leq 1$  不成立

题 3.  $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$  ( )

A. 仅在实轴上成立

B. 在第一象限成立

C. 在上半复平面成立

D. 在复平面上成立

解：由定义： $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ ， $\cos z = \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$ 

$$\sin^2 z = \left( \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} \right)^2 = \frac{e^{2iz} - 2e^{iz} \cdot e^{-iz} + e^{-2iz}}{-4}$$

$$\cos^2 z = \left( \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} \right)^2 = \frac{e^{2iz} + 2e^{iz} \cdot e^{-iz} + e^{-2iz}}{4}$$

$$\begin{aligned} \sin^2 z + \cos^2 z &= \frac{e^{2iz} - 2e^{iz} \cdot e^{-iz} + e^{-2iz}}{-4} + \frac{e^{2iz} + 2e^{iz} \cdot e^{-iz} + e^{-2iz}}{4} \\ &= \frac{4e^{iz} \cdot e^{-iz}}{4} \\ &= 1 \end{aligned}$$

答案：D

## 课时三 练习题

1. 设  $z = e^{-1+i}$ ，则辐角主值\_\_\_\_\_。

A.  $-\frac{\pi}{4}$

B.  $\frac{3\pi}{4}$

C. 1

D.  $\frac{3\pi}{4} + 2k\pi$  ( $k$  为整数)

2. (判断题)  $e^z$  是以  $2\pi i$  为周期的函数。( )3. (判断题) 复数  $\exp\left(\frac{1+i\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{4} e^{\frac{1}{4}}(1+i)$ 。( )4. 计算  $\exp\left[\frac{i(\pi+i)}{3}\right]$ 5.  $\ln(3-4i)$  的虚部为\_\_\_\_\_。6. 求  $\text{Ln}(\sqrt{3}+i)$  的值及主值。7. 解方程  $ie^z + 1 + i = 0$

8. (判断题)  $\operatorname{Ln} z^2 = 2\operatorname{Ln} z$ 。( )

9. 计算  $(1 + \sqrt{3}i)^i$  的值。

10. 计算  $3^i$  的值

11.  $(1-i)^{2i}$  的主值为\_\_\_\_\_ (写成三角形式)

12.  $\sin i =$ \_\_\_\_\_

13.  $\operatorname{Im}(\cos i) =$ \_\_\_\_\_

14. 利用三角函数的定义证明:  $\sin(2z) = 2\sin z \cdot \cos z$ 。

15. 证明: 在复数域中,  $\sin^2 z + \cos^2 z = 1$

16. 下列复数中, 为实数的是 ( )

A.  $(1-i)^3$

B.  $\cos i$

C.  $\ln i$

D.  $e^{1+\frac{\pi}{2}i}$

## 课时四 级数

考点	重要程度	占分	常见题型
1. 复数列的极限	★★	3 ~ 4	选择、填空
2. 收敛、收敛半径	★★★★	3 ~ 4	选择、填空
3. 和函数、幂级数	★★★★	6 ~ 10	大题
4. 洛朗级数	必考	6 ~ 12	大题

### 1. 复数列的极限

1. 复数列  $\{\alpha_n = a_n + ib_n\}$  收敛  $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = a + ib$

2. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + i \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛  $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛

收敛  $\Leftrightarrow$  实部收敛, 虚部收敛

题 1. 设  $a_n = \frac{n}{n+1} + i \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-2n}$ , 则  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$  \_\_\_\_\_。

解:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 1$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right]^{-2} = e^{-2}$   
 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 1 + ie^{-2}$

题 2. 复数列  $\{a_n\}$  收敛的充要条件是  $\operatorname{Re}\{a_n\}, \operatorname{Im}\{a_n\}$  收敛 ( )

答案:  $\checkmark$

### 2. 收敛、收敛半径

题 1. 数项级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2i)^n}{n!}$  的敛散性是\_\_\_\_\_。

解:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2i)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(2i)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(2i)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{(2i)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{2i}{n+1} \right| = 0 < 1$   
 $\therefore \sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{(2i)^n}{n!} \right|$  收敛,  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2i)^n}{n!}$  绝对收敛

1. 绝对收敛:  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  收敛

2. 条件收敛:  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  不收敛,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  收敛

3. 若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$  在  $z_0$  发散, 则  $|z| > |z_0|$  处发散

若  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n z^n$  在  $z_0$  收敛, 则  $|z| < |z_0|$  处绝对收敛

题 2. 如果级数  $\sum_{n=1}^{\infty} c_n z^n$  在  $z = 2i$  点收敛, 则级数在 ( )

A.  $z = 1 + i$  点绝对收敛

B.  $z = -2$  点条件收敛

C.  $z = -2i$  点绝对收敛

D.  $z = 1 + 2i$  点一定发散

答案: A

题 3. 求收敛半径。

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (3-4i)^n z^n$$

$$(2) \sum_{n=1}^{\infty} e^{\frac{i\pi}{n}} z^n$$

解: (1)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(3-4i)^{n+1}}{(3-4i)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |3-4i| = 5 \Rightarrow$  收敛半径  $R = \frac{1}{5}$

(2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| e^{\frac{i\pi}{n}} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1} = 1 \Rightarrow$  收敛半径  $R = 1$

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho, \quad R = \frac{1}{\rho}$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho, \quad R = \frac{1}{\rho}$$

### 3. 和函数、幂级数

幂级数展开 (泰勒级数展开)

$$\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} z^n \quad |z| < 1$$

$$\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n z^n \quad |z| < 1$$

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{n!} \quad 0 < |z| < +\infty$$

$$\sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{(2n+1)}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{(2n+1)}}{(2n+1)!} \quad 0 < |z| < +\infty$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{z^{2n}}{2n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{z^{2n}}{2n!} \quad 0 < |z| < +\infty$$



题 1. 将函数  $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+2)}$  在  $z=2$  处展开为幂级数，并指出收敛半径。

解：  $f(z) = \frac{2}{z+2} - \frac{1}{z+1}$

$$\frac{2}{z+2} = \frac{2}{4+(z-2)} = \frac{1}{2} \frac{1}{1+\frac{z-2}{4}} = \frac{1}{2} \left[ 1 - \frac{z-2}{4} + \left( \frac{z-2}{4} \right)^2 + \cdots \right] = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{z-2}{4} \right)^n$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{1}{4} \right)^n (z-2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 2^{-2n-1} (z-2)^n, \quad \left| \frac{z-2}{4} \right| < 1 \quad \text{即} |z-2| < 4$$

$$\frac{1}{z+1} = \frac{1}{3+(z-2)} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{z-2}{3}} = \frac{1}{3} \left[ 1 - \frac{z-2}{3} + \left( \frac{z-2}{3} \right)^2 + \cdots \right] = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{z-2}{3} \right)^n$$

$$= \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left( \frac{1}{3} \right)^n (z-2)^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n 3^{-n-1} (z-2)^n, \quad \left| \frac{z-2}{3} \right| < 1 \quad \text{即} |z-2| < 3$$

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (2^{-2n-1} - 3^{-n-1}) (z-2)^n, \quad \text{收敛半径} |z-2| < 3$$

题 2. 将  $f(z) = \frac{z}{(z-1)^2}$  展开成  $z$  的幂级数，并求收敛半径。

解：  $\frac{1}{1-z} = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots \quad |z| < 1$

两边求导：  $\frac{1}{(1-z)^2} = 1 + 2z + 3z^2 + 4z^3 + \cdots + nz^{n-1} + \cdots \quad |z| < 1$

$$\therefore f(z) = \frac{z}{(z-1)^2} = z \cdot (1 + 2z + 3z^2 + \cdots + nz^{n-1} + \cdots)$$

$$= z + 2z^2 + 3z^3 + \cdots + nz^n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot z^n \quad |z| < 1$$

题 3. 求函数  $f(z) = \ln(1+z)$  在  $z=0$  处的泰勒展开式，并求出收敛域。

解：  $\because [\ln(1+z)]' = \frac{1}{1+z}$

而  $\frac{1}{1+z} = 1 - z + z^2 - \cdots + (-1)^n z^n + \cdots \quad |z| < 1$

$$\text{两边积分：} \ln(1+z) = z - \frac{z^2}{2} + \frac{z^3}{3} - \frac{z^4}{4} + \cdots + (-1)^n \frac{z^{n+1}}{n+1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{z^n}{n}$$

## 4. 洛朗级数

题 1. 将函数  $f(z) = \frac{1}{(z-1)(z-2)}$  分别在指定的圆环域内展开成洛朗级数。

(1)  $0 < |z-1| < 1$

(2)  $1 < |z-2| < +\infty$

(3)  $2 < |z| < +\infty$

解：(1) 在  $0 < |z-1| < 1$  上

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-1} \cdot \frac{1}{(z-1)-1} = \frac{-1}{z-1} \cdot \frac{1}{1-(z-1)} = \frac{-1}{z-1} \left[ 1 + (z-1) + (z-1)^2 + \cdots + (z-1)^n + \cdots \right] \\ &= \frac{-1}{z-1} \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^n = - \sum_{n=0}^{\infty} (z-1)^{n-1} \end{aligned}$$

(2) 在  $1 < |z-2| < +\infty$  上,  $0 < \left| \frac{1}{z-2} \right| < 1$

$$\begin{aligned} f(z) &= \frac{1}{z-2} \cdot \frac{1}{1+(z-2)} = \frac{1}{(z-2)^2} \cdot \frac{1}{1+\frac{1}{z-2}} \\ &= \frac{1}{(z-2)^2} \cdot \left[ 1 - (z-2)^{-1} + (z-2)^{-2} - \cdots + (-1)^n (z-2)^{-n} + \cdots \right] \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-2)^{-n-2} \end{aligned}$$

(3) 在  $2 < |z| < +\infty$  上,  $0 < \left| \frac{1}{z} \right| < 1$ ,  $0 < \left| \frac{2}{z} \right| < 1$

$$f(z) = \frac{1}{z-2} - \frac{1}{z-1} = \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} - \frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}}$$

$$\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{2}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{2}{z} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} 2^n z^{-n-1}$$

$$\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1-\frac{1}{z}} = \frac{1}{z} \sum_{n=0}^{\infty} \left( \frac{1}{z} \right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} z^{-n-1}$$

$$\therefore f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} (2^n - 1) z^{-n-1}$$

## 课时四 练习题

1. 复数列的通项  $a_n = \frac{n^2+1}{n^2-1} + \frac{(-1)^n}{n}i$ , 则极限  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ \_\_\_\_\_。

2. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + i \sum_{n=1}^{\infty} b_n$  收敛的充要条件是级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  和  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  都收敛 ( )。

3. 下列级数中, 条件收敛的是 ( )。

A.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(1+\sqrt{3}i)^n}{n!}$

B.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n + i}{n+1}$

C.  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{i^n}{n}$

D.  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3+4i}{3}\right)^n$

4. 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(3+5i)^n}{n!}$  的敛散性情况为 ( )。

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 敛散性不能确定

5. 若级数  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n$ ,  $z=5-3i$  绝对收敛, 则该级数在  $z=2+5i$  处的敛散性为 ( )。

A. 绝对收敛

B. 条件收敛

C. 发散

D. 不能确定

6. 级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{z^n}{n^3}$  的收敛半径  $R =$ \_\_\_\_\_。

7. 级数  $\sum_{n=0}^{\infty} (2+i)^n z^n$  的收敛半径为\_\_\_\_\_。

8. 函数  $f(z) = \frac{z}{(z+2)(z-3)}$  在  $z=1$  内的泰勒展开式的收敛圆为 ( )。

A.  $|z|=2$

B.  $|z-1|=2$

C.  $|z|=3$

D.  $|z-1|=3$

9. 幂级数  $S = 1 + z + z^2 + \cdots + z^n + \cdots$ , 则当  $|z| < 1$  时,  $\lim_{n \rightarrow \infty} S =$ \_\_\_\_\_。

10. 函数  $f(z) = \frac{z-1}{z+1}$  在  $z=1$  时展开成泰勒级数为 ( )。

A.  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z-1)^{n+1}, |z-1| < 1$

B.  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{z-1}{2}\right)^{n+1}, |z-1| < 2$

C.  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (z^{n+1} - z^n), |z-1| < 1$

11. 求  $f(z) = \frac{1}{4z-3}$  在  $z=0$  处的泰勒展开式。

12. 求  $\ln(z+1)$  在  $z=0$  处的泰勒展开式。

13. 将函数  $f(z) = \frac{1}{z-5}$  在圆环域 (1)  $0 < |z-2| < 3$  (2)  $3 < |z-2| < +\infty$  内展开成洛朗级数。

14. 将  $f(z) = \frac{1}{z^2(z-i)}$  在去心解析邻域 (1)  $0 < |z-i| < 1$  (2)  $1 < |z-i| < +\infty$  内分别展开成

洛朗级数。

## 课时五 求积分

考点	重要程度	占分	常见题型
1. 简单方法	★★★★	3~8	选择、填空、计算题
2. 柯西-古萨定理	★★★★★	3~8	选择、填空、计算题
3. 柯西积分公式	必考	6~20	计算题
4. $n$ 阶导数	★★★★	6~10	计算题

## 1. 简单方法

题 1. 计算积分  $\int_0^1 z \sin z dz$ 

参数方程法

解：原式  $= \int_0^1 -z d \cos z = -z \cos z \Big|_0^1 + \int_0^1 \cos z dz = -z \cos z \Big|_0^1 + \sin z \Big|_0^1 = \sin 1 - \cos 1$ 题 2. 分别沿  $y=x, y=x^2$ , 计算积分  $\int_0^{1+i} (x^2 + iy) dz$ 解：(1) 沿  $y=x$ , 令  $\begin{cases} x=t \\ y=t \end{cases}$ , 则  $dz = d(x+iy) = (1+i)dt$ 

$$\text{原式} = \int_0^1 (t^2 + it)(1+i)dt = \int_0^1 (t^2 + it^2 + it - t)dt = \int_0^1 (1+i)t^2 + (-1+i)t dt$$

$$= \left[ (1+i) \frac{1}{3} t^3 + (-1+i) \frac{1}{2} t^2 \right] \Big|_0^1 = \frac{1}{3}(1+i) + \frac{1}{2}(-1+i) = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i$$

(2) 沿  $y=x^2$ , 令  $\begin{cases} x=t \\ y=t^2 \end{cases}$ , 则  $dz = d(x+iy) = (1+2it)dt$ 

$$\text{原式} = \int_0^1 (t^2 + it^2)(1+2it)dt = \int_0^1 [(2i-2)t^3 + (1+i)t^2] dt$$

$$= \left( \frac{-1+i}{2} t^4 + \frac{1+i}{3} t^3 \right) \Big|_0^1 = -\frac{1}{6} + \frac{5}{6}i$$

2. 柯西-古萨基本定理  $\oint_c f(z) dz = 0$ 题 1. 设  $c: |z-1| = \frac{1}{2}$ , 则  $\oint_c \frac{\cos z}{z^3} dz = ( \quad )$ A.  $2\pi i$ B.  $\pi i$ 

C. 0

D. 1

解：  $f(z) = \frac{\cos z}{z^3}$  只在  $z=0$  处不解析，在  $|z-1| = \frac{1}{2}$  内处处解析

答案 C

题 2.  $\oint_{|z|=1} \frac{1}{\cos z} dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 解：  $\cos z = 0$  的点为  $z = \frac{\pi}{2} + k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ 若  $f(z)$  在曲线  $c$  围成的区域内解析，

$$\oint_c f(z) dz = 0$$

$$f(z) = \frac{1}{\cos z} \text{ 在 } |z|=1 \text{ 内处处解析}$$

答案：0

### 3. 柯西积分公式

题 1.  $\oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z} dz = ( \quad )$

A.  $2\pi i$       B.  $-2\pi i$       C.  $2\pi$       D.  $-2\pi$

解：原式  $= \oint_{|z|=1} \frac{e^z}{z-0} dz = 2\pi i e^z \Big|_{z=0} = 2\pi i$

答案 A

$f(z)$  在曲线  $c$  的内部解析,  $z_0$  在  $c$  内

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_c \frac{f(z)}{z-z_0} dz$$

$$\oint_c \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$$

题 2. 若  $f(z) = \frac{1}{(z-2)(z-3)}$ , 则  $\oint_{|z|=5} f(z) dz = ( \quad )$

A. 0      B.  $-i$       C.  $i$       D.  $\frac{1}{4}$

解 1: 原式  $= \oint_{|z|=5} \frac{1}{(z-2)(z-3)} dz = \oint_{|z|=5} \frac{1}{(z-3)} - \frac{1}{(z-2)} dz$

$$= \oint_{|z|=5} \frac{1}{(z-3)} dz - \oint_{|z|=5} \frac{1}{(z-2)} dz = 2\pi i - 2\pi i = 0$$

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

解 2: 原式  $= \oint_{c_1} \frac{1}{z-2} dz + \oint_{c_2} \frac{1}{z-3} dz$

令  $c_1, c_2$  分别是以  $z=2, z=3$  为圆心的小圆域

$$\text{原式} = 2\pi i \frac{1}{z-3} \Big|_{z=2} + 2\pi i \frac{1}{z-2} \Big|_{z=3} = 2\pi i - 2\pi i = 0$$

答案：A

题 3. 求  $\oint_{|z|=3} \frac{z+1}{z(z-i)} dz$

解：令  $c_1, c_2$  分别是以  $z=0$  和  $z=i$  为圆心的小圆域

$$\text{原式} = \oint_{c_1} \frac{z+1}{z} dz + \oint_{c_2} \frac{z+1}{z-i} dz = 2\pi i \frac{z+1}{z-i} \Big|_{z=0} + 2\pi i \frac{z+1}{z} \Big|_{z=i} = 2\pi i \cdot i + 2\pi i \cdot (1-i) = 2\pi i$$

### 4. $n$ 阶导数

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \oint \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

题 1. 设  $c$  表示正向圆周  $|\zeta|=2$ ,  $f(z) = \oint_c \frac{\sin 2\zeta}{(\zeta-z)^3} d\zeta$ , 求  $f'(i)$  的值。

解：设  $\sin 2\zeta = f_1(\zeta)$

$$f(z) = \oint_c \frac{\sin 2\zeta}{(\zeta - z)^3} d\zeta = \frac{2\pi i}{2!} f_1''(z) = -4\pi i \sin 2z$$

$$f'(z) = -8\pi i \cos 2z$$

$$f'(i) = -8\pi i \cos 2i = -8\pi i \operatorname{ch} 2$$

## 课时五 练习题

1. 计算积分  $\int_1^{1+i} z e^z dz$  (提示：利用分部积分)

2. 计算  $\int_0^1 z \cos z dz$

3. 求积分  $\int_c \bar{z} dz$ ,  $c$  为从 0 到  $1+3i$  的直线段

4. 设曲线  $c$  是从原点到  $2+3i$  的直线段, 计算积分  $\int_c (x^2 + iy^2) dz$

5.  $\oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 - 4} = \underline{\hspace{2cm}}$

6.  $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z-2} dz = \underline{\hspace{2cm}}$

7.  $\oint_{|z|=1} \frac{1}{z^2 + 2z + 4} dz = \underline{\hspace{2cm}}$

8. 计算  $\oint_c \frac{z}{z^2 + 3z - 4} dz$ ,  $c: |z|=5$

9. 计算  $\oint_{|z|=2} \frac{2z+1}{z^2+2} dz$

10. 计算  $\oint_{|z|=3} \frac{z}{(z+1)(z-2)} dz$

11.  $\oint_{|z|=2} \frac{1}{z-1} dz = \underline{\hspace{2cm}}$

12. 计算  $\oint_c \left( \frac{2}{z-2} + \frac{3}{z+2i} \right) dz, c: |z|=3$

13. 设函数  $f(z)$  在单连通区域  $D$  内解析，在  $D$  内的曲线  $C$  上连续，则对任意  $z \in D$  ( )

A.  $\frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z) d\zeta}{(\zeta - z)^n} = f^{(n)}(z)$

B.  $\frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z) d\zeta}{(\zeta - z)^{n+1}} = f^{(n)}(z)$

C.  $\frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z)^n} = f^{(n)}(z)$

D.  $\frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(\zeta) d\zeta}{(\zeta - z)^{n+1}} = f^{(n)}(z)$

14. 设函数  $f(z)$  在单连通区域  $D$  内解析， $C$  是  $D$  内一条简单正向闭曲线， $z_0$  在  $C$  的内部，则

积分  $\oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{2009}} dz = \underline{\hspace{2cm}}$



## 课时六 留数

考点	重要程度	占分	题型
1. 奇点和零点	★★★	3~8	选择、填空、大题
2. 留数的含义	★★★	6~10	计算题
3. 求留数规则 I、II	必考		
4. 求留数规则 III、IV	★★★★		

### 1. 奇点和零点

题 1. 设  $z = -1$  是函数  $f(z) = 5z^2 + 10z + 5$  的  $m$  级零点, 则  $m =$  \_\_\_\_\_。

解:  $f(z)|_{z=-1} = (5z^2 + 10z + 5)|_{z=-1} = 0$

$$f'(z)|_{z=-1} = (10z + 10)|_{z=-1} = 0$$

$$f''(z)|_{z=-1} = 10 \neq 0$$

$$\therefore m = 2$$

$$1. m \text{ 级零点: } \begin{cases} f^{(m)}(z_0) \neq 0 \\ f^{(n)}(z_0) = 0, \quad n < m \end{cases}$$

2.  $z_0$  是  $f(z)$  的  $m$  级零点

$$\Rightarrow z_0 \text{ 是 } \frac{1}{f(z)} \text{ 的 } m \text{ 级极点}$$

3.  $z_0$  是  $f(z)$  的  $m$  级零点,  $g(z)$  的  $n$  级零点

$$\Rightarrow z_0 \text{ 是 } \frac{g(z)}{f(z)} \text{ 的 } m-n \text{ 级极点}$$

题 2.  $z = 0$  是  $f(z) = \frac{\sin z}{z^4}$  的三级极点 ( )

解:  $z = 0$  是  $z^4$  的 4 级零点

$$(\sin z)' \Big|_{z=0} = \cos z = 1 \neq 0$$

$z = 0$  是  $\sin z$  的 1 级零点

$$\therefore z = 0 \text{ 是 } \frac{\sin z}{z^4} \text{ 的 3 级极点}$$

答案:  $\checkmark$

题 3. 设函数  $f(z)$  与  $g(z)$  分别以  $z = a$  为  $m$  级与  $n$  级极点, 那么下列三个函数: 1)  $f(z)g(z)$ ;

2)  $\frac{f(z)}{g(z)}$ ; 3)  $f(z) + g(z)$  在  $z = a$  处有什么性质?

解: 设  $f(z) = \frac{f_1(z)}{(z-a)^m}$ ,  $g(z) = \frac{g_1(z)}{(z-a)^n}$ ,  $f_1(z) \neq 0$ ,  $g_1(z) \neq 0$

$$1) f(z)g(z) = \frac{f_1(z)g_1(z)}{(z-a)^{m+n}}, \quad m+n \text{ 级极点}$$

$$2) \frac{f(z)}{g(z)} = \frac{f_1(z)/g_1(z)}{(z-a)^{m-n}}$$

当  $m > n$  时,  $m-n$  级极点;

当  $m = n$  时, 可去奇点 (或解析点);

当  $m < n$  时,  $n-m$  级零点。

3) 当  $m > n$  时,  $m$  级极点;

当  $m = n$  时,  $m$  级极点或低于  $m$  级极点;

当  $m < n$  时,  $n$  级极点。

## 2. 留数的定义

题 1.  $\text{Res}\left[\frac{\sin z}{z^2}, 0\right] = \underline{\hspace{2cm}}$

解:  $\frac{\sin z}{z^2}$  在  $z=0$  处展开

$$\frac{\sin z}{z^2} = \frac{1}{z^2} \left( \cdots + z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \cdots \right) = \frac{1}{z} - \frac{z}{3!} + \frac{z^3}{5!} - \cdots$$

$$c_{-1} = 1 \quad \therefore \text{Res}\left[\frac{\sin z}{z^2}, 0\right] = 1$$

答案: 1

题 2.  $\text{Res}\left[\frac{e^z - 1}{z^5}, 0\right] = \underline{\hspace{2cm}}$

解:  $\frac{e^z - 1}{z^5}$  在  $z=0$  处展开

$$\frac{e^z - 1}{z^5} = \frac{1}{z^5} \left( \cdots + (-1) + 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \frac{z^4}{4!} \cdots \right) = \cdots + z^{-4} + \frac{z^{-3}}{2!} + \frac{z^{-2}}{3!} + \frac{z^{-1}}{4!} + \cdots$$

$$c_{-1} = \frac{1}{4!} = \frac{1}{24} \quad \therefore \text{Res}\left[\frac{e^z - 1}{z^5}, 0\right] = \frac{1}{24}$$

答案:  $\frac{1}{24}$

$$\text{若 } f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z - z_0)^n,$$

$$\text{则 } \text{Res}[f(z), z_0] = c_{-1}$$

## 3. 求留数规则 I、II

题 1. 函数  $f(z) = \frac{\sin z}{z\left(z - \frac{\pi}{2}\right)}$  在  $z = \frac{\pi}{2}$  处的留数  $\text{Res}\left[f(z), \frac{\pi}{2}\right] = \underline{\hspace{2cm}}$

解:  $z = \frac{\pi}{2}$  是  $f(z)$  的一级极点

$$\text{原式} = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \left( z - \frac{\pi}{2} \right) f(z) = \lim_{z \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin z}{z} = \frac{2}{\pi}$$

答案:  $\frac{2}{\pi}$

题 2. 用留数计算积分  $\oint_{|z|=2} \frac{5z-2}{z(z-1)^2} dz$

解:  $f(z) = \frac{5z-2}{z(z-1)^2}$ , 在  $|z|=2$  内有  $z=0$  和  $z=1$  两个极点

$$\text{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} z f(z) = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{5z-2}{(z-1)^2} = -2$$

$$\text{Res}[f(z), 1] = \lim_{z \rightarrow 1} \left[ (z-1)^2 f(z) \right]' = \lim_{z \rightarrow 1} \left( \frac{5z-2}{z} \right)' = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{2}{z^2} = 2$$

$$\text{原式} = 2\pi i \{ \text{Res}[f(z), 0] + \text{Res}[f(z), 1] \} = 8\pi i$$

#### 4. 求留数规则 III、IV

##### 1. 规则 III:

$$\text{若 } f(z) = \frac{P(z)}{Q(z)}, \quad z_0 \text{ 是 } f(z) \text{ 的一级极点, } \text{Res}[f(z), z_0] = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}$$

$$2. \text{规则 IV: } \text{Res}[f(z), \infty] = -\text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right]$$

$$3. \sum_{i=1}^n \text{Res}[f(z), z_i] = 0$$

题 1. 函数  $f(z) = \frac{1}{z^n - 1}$  在  $z_0 = 1$  的留数为 ( )

A.  $n$                       B.  $\frac{1}{n+1}$                       C.  $\frac{1}{n}$

$$\text{解: } \text{Res}[f(z), 1] = \left. \frac{1}{(z^n - 1)'} \right|_{z=1} = \left. \frac{1}{nz^{n-1}} \right|_{z=1} = \frac{1}{n}$$

答案：C

题 2.  $\text{Res}\left[\frac{2z}{3+z^2}, \infty\right] = \underline{\hspace{2cm}}$

$$\text{解：原式} = -\text{Res}\left[\frac{2\frac{1}{z}}{3+\left(\frac{1}{z}\right)^2} \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right] = -\text{Res}\left[\frac{2}{3z^3+z}, 0\right] = -2$$

答案：-2

题 3. 函数  $f(z) = \frac{z^{15}}{(z^2+1)^2(z^4+2)^3}$  在复平面内的所有有限孤立奇点处的留数和是\_\_\_\_\_

$$\begin{aligned} \text{解：} \sum_{i=1} \text{Res}[f(z), z_i] &= -\text{Res}[f(z), \infty] = \text{Res}\left[f\left(\frac{1}{z}\right) \cdot \frac{1}{z^2}, 0\right] \\ &= \text{Res}\left[\frac{1}{z(1+z^2)^2(1+2z^4)^3}, 0\right] = \lim_{z \rightarrow 0} z \frac{1}{z(1+z^2)^2(1+2z^4)^3} = 1 \end{aligned}$$

## 课时六 练习题

1. 点  $z=0$  是  $f(z)=1-\cos z$  的 ( ) 级零点。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

2. 已知  $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$  在圆环域  $|z-1|>1$  上的洛朗级数为

$f(z) = \frac{1}{(z-1)^3} - \frac{1}{(z-1)^4} + \frac{1}{(z-1)^5} - \dots$ , 则  $z=1$  是  $f(z)$  的\_\_\_\_\_。

3.  $z=0$  为函数  $f(z) = \frac{\sin z}{z(z+1)^2}$  ( )

A. 可去奇点

B. 本性奇点

C. 极点

D. 解析点

4.  $z=0$  为函数  $f(z) = \frac{(e^z-1)\sin z}{z^5}$  的\_\_\_\_\_ (奇点类型)

5. 设函数  $f(z) = z \cos \frac{1}{z}$ , 则  $\text{Res}[f(z), 0] =$  \_\_\_\_\_

6. 设函数  $f(z) = \frac{e^{2z} - 1}{z}$ , 则  $\text{Res}[f(z), 0] =$  \_\_\_\_\_

7.  $\oint_{|z|=5} \frac{e^z}{z^3 - 2z^2 - 3z} dz$

8. 函数  $f(z) = \frac{e^z}{(z-1)^2}$ , 则  $\text{Res}[f(z), 1] =$  \_\_\_\_\_

9. 用留数定理计算  $\oint_C \frac{e^z}{z(z-1)^2} dz$  的值, 其中  $C$  为  $|z|=5$  的正向圆周

10. 设函数  $f(z) = \frac{1}{(z^4 - 1)(z - 3)}$ , 判断  $f(z)$  的所有有限奇点的类型, 并利用留数定理计算

$\oint_C f(z) dz$ , 其中  $C$  为正向圆周:  $|z| = 2.5$

## 课时七 利用留数求积分

考点	重要程度	占分	题型
1. 利用留数求积分	★★★	6~12	计算题
2. 求积分方法总结	★★★★★		

## 1. 利用留数求积分

题 1. 计算积分  $I = \int_0^{2\pi} \frac{\cos 2\theta}{1-2p\cos\theta+p^2} d\theta, (0 < p < 1)$

解:  $\cos 2\theta = \frac{1}{2}(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}) = \frac{1}{2}(z^2 + z^{-2})$

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{1}{2}(z^2 + z^{-2}) \cdot \frac{1}{1-2p \cdot \frac{z+z^{-1}}{2} + p^2} \cdot \frac{dz}{iz}$$

$$= \oint_{|z|=1} \frac{1+z^4}{2iz^2(1-pz)(z-p)} dz$$

$$\text{令 } f(z) = \frac{1+z^4}{2iz^2(1-pz)(z-p)}$$

在  $|z|=1$  内有  $z=0, z=p$  两个极点

$$\text{Res}[f(z), 0] = \lim_{z \rightarrow 0} \frac{d}{dz} \left[ z^2 \cdot \frac{1+z^4}{2iz^2(1-pz)(z-p)} \right] = -\frac{1+p}{2ip^2}$$

$$\text{Res}[f(z), p] = \lim_{z \rightarrow p} \left[ (z-p) \cdot \frac{1+z^4}{2iz^2(1-pz)(z-p)} \right] = \frac{1+p^4}{2ip^2(1-p^2)}$$

$$I = 2\pi i \left[ -\frac{1+p}{2ip^2} + \frac{1+p^4}{2ip^2(1-p^2)} \right] = \frac{2\pi p^2}{1-p^2}$$

题 2. 利用留数理论计算实反常积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x^2}{(x^2+4)^2} dx$

$$\text{解: 令 } f(z) = \frac{z^2}{(z^2+4)^2} = \frac{z^2}{(z+2i)^2(z-2i)^2}$$

在上半平面内有  $z=2i$  一个 2 级极点

$$\text{Res}[f(z), 2i] = \lim_{z \rightarrow 2i} \frac{d}{dz} \left[ (z-2i)^2 \frac{z^2}{(z+2i)^2(z-2i)^2} \right] = -\frac{i}{8}$$

$$\therefore \text{原式} = 2\pi i \times \left( -\frac{i}{8} \right) = \frac{\pi}{4}$$

$$1. \int_0^{2\pi} R(\cos\theta, \sin\theta) d\theta, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}$$

$$\text{令 } \begin{cases} \sin\theta = \frac{z-z^{-1}}{2i} \\ \cos\theta = \frac{z+z^{-1}}{2} \end{cases} \Rightarrow \oint_{|z|=1} f(z) dz$$

$$2. \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx = 2\pi i \sum \text{Res}[R(z), z_k]$$

$z_k$  为  $R(z)$  在上半平面内的奇点

$$3. \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{aix} dx$$

$$= 2\pi i \sum \text{Res}[R(z) e^{ aiz }, z_k]$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \cos ax dx + i \int_{-\infty}^{+\infty} R(x) \sin ax dx$$

### 题 3. 用留数计算积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+1} dx$

解：令  $f(z) = \frac{e^{iz}}{z^2+1} = \frac{e^{iz}}{(z+i)(z-i)}$ ，则  $f(z)$  在上半平面内有  $z=i$  一个极点

$$\text{Res}[f(z), i] = \lim_{z \rightarrow i} (z-i) \frac{e^{iz}}{(z+i)(z-i)} = \lim_{z \rightarrow i} \frac{e^{iz}}{z+i} = \frac{-i}{2e}$$

$$\therefore \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{ix}}{x^2+1} dx = 2\pi i \text{Res}[f(z), i] = 2\pi i \cdot \frac{-i}{2e} = \frac{\pi}{e}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{e}$$

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos x}{x^2+1} dx = \frac{\pi}{2e}$$

## 2. 求积分方法总结

方法	特点
柯西古萨基本定理： $\oint_C f(z) dz = 0$	$f(z)$ 在 $C$ 内解析
柯西积分公式： $\oint_C \frac{f(z)}{z-z_0} dz = 2\pi i f(z_0)$	$z_0$ 是 $\frac{f(z)}{z-z_0}$ 的一级极点， $z_0$ 在 $C$ 内
求留数的规则 I： $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \text{Res}[f(z), z_0]$ $= 2\pi i \left[ \lim_{z \rightarrow z_0} (z-z_0) f(z) \right]$	$z_0$ 是 $f(z)$ 的一级极点， $z_0$ 在 $C$ 内
$n$ 阶导数公式： $\oint_C \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(z_0)$	$z_0$ 是 $\frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}}$ 的 $n+1$ 级极点， $z_0$ 在 $C$ 内
求留数规则 II： $\oint_C f(z) dz = 2\pi i \text{Res}[f(z), z_0]$ $= \frac{2\pi i}{n!} \lim_{z \rightarrow z_0} \frac{d^n}{dz^n} \left\{ (z-z_0)^{n+1} f(z) \right\}$	$z_0$ 是 $f(z)$ 的 $n+1$ 级极点， $z_0$ 在 $C$ 内
$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum \text{Res}[f(z), z_k]$	$z_k$ 是 $f(z)$ 在 $C$ 内的奇点
$\oint_C f(z) dz = -2\pi i \sum \text{Res}[f(z), z_i]$	$z_i$ 是 $f(z)$ 在 $C$ 外的奇点（包括 $\infty$ ）

$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \cdot C_{-1}$	$C_{-1}$ 是 $f(z)$ 在 $z_0$ 点洛朗展开的系数 $z_0$ 是 $f(z)$ 在 $C$ 内的奇点
利用留数求积分： ① $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ ② $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) dx$ ③ $\int_{-\infty}^{+\infty} R(x) e^{aix} dx$	只能用留数的规则求

## 课时七 练习题

1. 计算积分  $\int_0^{2\pi} \frac{1}{a + \cos \theta} d\theta$ ,  $a > 1$

2. 利用留数求积分的值  $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{x^4 + 5x^2 + 4} dx$

3. 利用留数定理, 计算积分  $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 4)(x^2 + 16)}$

4. 利用留数计算积分  $\int_0^{+\infty} \frac{x \sin x}{1 + x^2} dx$

5.  $\oint_{|z|=2} \frac{z}{z^4 - 1} dz$

6. 计算积分  $\oint_{|z|=4} \frac{z^{15}}{(1 + z^2)^2 (1 + z^4)^3} dz$  (曲线为正向)



课时八 *Fourier* 傅里叶变换

考点	重要程度	占分	题型
1. $\delta(t)$ 函数	★	3 ~ 6	选择、填空
2. <i>Fourier</i> 傅里叶变换	★★★	3 ~ 10	选择、填空、大题

1.  $\delta(t)$  函数

题 1.  $\delta(t) \cdot \cos t = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解：原式 =  $\cos 0 \cdot \delta(t) = \delta(t)$

题 2.  $\delta(t)$  是单位脉冲函数，则  $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta\left(t - \frac{\pi}{2}\right) \sin t \, dt = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解：原式 =  $\sin \frac{\pi}{2} = 1$

$\delta(t)$  单位脉冲函数

$$1. \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t) \, dt = 1$$

$$2. f(t) \delta(t - t_0) = f(t_0) \delta(t - t_0)$$

$$3. \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \delta(t - t_0) \, dt = f(t_0)$$

2. *Fourier* 傅里叶变换

$$1. F(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} \, dt = \mathcal{F}[f(t)]$$

$$2. f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} \, d\omega = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)]$$

题 1. 求函数  $f(t) = \begin{cases} 2e^{-3t}, & t \geq 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$  的 *Fourier* 变换，并证明下式：

$$\int_0^{+\infty} \frac{3 \cos \omega t + \omega \sin \omega t}{9 + \omega^2} \, d\omega = \pi e^{-3t}, (t > 0)$$

解：  $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} \, dt = \int_0^{+\infty} 2e^{-3t} e^{-j\omega t} \, dt = \int_0^{+\infty} 2e^{-(3+j\omega)t} \, dt$

$$= \frac{2}{3 + j\omega} = \frac{2(3 - j\omega)}{9 + \omega^2}$$

对  $F(\omega)$  求逆变换

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(\omega)] = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(\omega) e^{j\omega t} \, d\omega$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{2(3 - j\omega)}{9 + \omega^2} e^{j\omega t} \, d\omega$$

$$e^{j\omega t} = \cos \omega t + j \sin \omega t$$

$$= \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{3 \cos \omega t + \omega \sin \omega t}{9 + \omega^2} \, d\omega$$

$$= \frac{2}{\pi} \int_0^{+\infty} \frac{3 \cos \omega t + \omega \sin \omega t}{9 + \omega^2} \, d\omega = 2e^{-3t} (t > 0)$$

$$\Rightarrow \int_0^{+\infty} \frac{3 \cos \omega t + \omega \sin \omega t}{9 + \omega^2} \, d\omega = \pi e^{-3t} (t > 0)$$

题 2. 求函数  $f(t) = \begin{cases} E, & -\tau \leq t \leq \tau \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$  的傅里叶变换。

$$\begin{aligned} \text{解: } F(\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\tau}^{\tau} Ee^{-j\omega t} dt = \int_{-\tau}^{\tau} E(\cos \omega t - j \sin \omega t) dt \\ &= 2E \int_0^{\tau} \cos \omega t dt = \frac{2E}{\omega} \sin \tau \omega \end{aligned}$$

题 3. 函数  $f(t) = \sin t$  的傅里叶变换\_\_\_\_\_。

$$\begin{aligned} \text{解: } F(\omega) &= \mathcal{F}[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \sin t e^{-j\omega t} dt \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j} e^{-j\omega t} dt = \frac{1}{2j} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{jt} e^{-j\omega t} - e^{-jt} e^{-j\omega t} dt \\ &= \frac{1}{2j} [2\pi\delta(\omega-1) - 2\pi\delta(\omega+1)] = j\pi [\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)] \end{aligned}$$

$$\sin t = \frac{e^{jt} - e^{-jt}}{2j}$$

$$e^{-jat} \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\delta(\omega+a)$$

$$\delta(t+a) \xrightarrow{\mathcal{F}} e^{-ja\omega}$$

### 常见 Fourier 傅里叶变换对

$$e^{-\beta t} (t \geq 0, \beta > 0) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{1}{\beta + j\omega}$$

$$E(|t| \leq \tau) \xrightarrow{\mathcal{F}} \frac{2E}{\omega} \sin \tau \omega$$

$$\delta(t) \xrightarrow{\mathcal{F}} 1$$

$$\sin \omega_0 t \xrightarrow{\mathcal{F}} j\pi [\delta(\omega + \omega_0) - \delta(\omega - \omega_0)]$$

$$1 \xrightarrow{\mathcal{F}} 2\pi\delta(\omega)$$

$$\cos \omega_0 t \xrightarrow{\mathcal{F}} \pi [\delta(\omega + \omega_0) + \delta(\omega - \omega_0)]$$

### 常用 Fourier 傅里叶变换的性质

$$1. \mathcal{F}[f(t+t_0)] = e^{j\omega t_0} \mathcal{F}[f(t)];$$

$$\mathcal{F}[e^{j\omega_0 t} f(t)] = F(\omega - \omega_0)$$

$$2. \mathcal{F}[f'(t)] = j\omega \mathcal{F}[f(t)];$$

$$\mathcal{F}[tf(t)] = j \frac{d}{d\omega} \mathcal{F}[f(t)] = jF'(\omega)$$

$$3. \mathcal{F}\left[\int_{-\infty}^t f(t) dt\right] = \frac{1}{j\omega} \mathcal{F}[f(t)]$$

$$4. \mathcal{F}[f(at)] = \frac{1}{|a|} F\left(\frac{\omega}{a}\right)$$

$$5. \mathcal{F}[f(t)*g(t)] = \mathcal{F}[f(t)] \cdot \mathcal{F}[g(t)] \quad * \text{ 表示卷积}$$

题 4. 已知  $\mathcal{F}[\sin kt] = j\pi[\delta(\omega+k) - \delta(\omega-k)]$ , 利用傅里叶变换计算  $\mathcal{F}[\sin(t+2)]$ 。

解：利用性质 1：

$$\mathcal{F}[\sin(t+2)] = e^{j2\omega} \mathcal{F}(\sin t) = e^{j2\omega} \cdot j\pi[\delta(\omega+1) - \delta(\omega-1)]$$

题 5. 设  $f(t) = \cos^2 t$ , 则  $\mathcal{F}[f(t)] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解：  $f(t) = \cos^2 t = \frac{1}{2}(\cos 2t + 1)$

$$\mathcal{F}(\cos 2t) = \pi[\delta(\omega+2) + \delta(\omega-2)]$$

$$\mathcal{F}(1) = 2\pi\delta(\omega)$$

$$\mathcal{F}[f(t)] = \frac{1}{2}[\mathcal{F}(\cos 2t) - \mathcal{F}(1)] = \frac{\pi}{2}\delta(\omega+2) + \frac{\pi}{2}\delta(\omega-2) - \pi\delta(\omega)$$

题 6. 设函数  $f(t)$  的 Fourier 变换为  $F(\omega) = \frac{1}{1+\omega^2}$ , 利用 Fourier 变换的性质, 求下列函数的

Fourier 变换：(1)  $2f'(t) - e^{3jt}f(t)$ ; (2)  $[f(t-2)*f(t)]$

解：(1) 利用性质 2：  $\mathcal{F}[f'(t)] = j\omega\mathcal{F}[f(t)] = j\omega \frac{1}{1+\omega^2}$

$$\text{利用性质 1: } \mathcal{F}[e^{3jt}f(t)] = F(\omega-3) = \frac{1}{1+(\omega-3)^2}$$

$$\therefore \mathcal{F}[2f'(t) - e^{3jt}f(t)] = 2j\omega \frac{1}{1+\omega^2} - \frac{1}{1+(\omega-3)^2}$$

$$(2) \text{ 利用性质 1: } \mathcal{F}[f(t-2)] = e^{-2j\omega}\mathcal{F}[f(t)] = e^{-2j\omega} \frac{1}{1+\omega^2}$$

$$\text{利用性质 5: } \mathcal{F}[f(t-2)*f(t)] = \mathcal{F}[f(t-2)] \cdot \mathcal{F}[f(t)]$$

$$= e^{-2j\omega} \frac{1}{1+\omega^2} \cdot \frac{1}{1+\omega^2} = \frac{e^{-2j\omega}}{(1+\omega^2)^2}$$

题 7. 设函数  $f(t)$  的傅里叶变换为  $F(\omega)$ , 求函数  $g(t) = t^2 f'(t)$  的傅里叶变换。

解：利用性质 2：

$$\mathcal{F}[f'(t)] = j\omega\mathcal{F}[f(t)] = j\omega F(\omega)$$

$$\mathcal{F}[tf'(t)] = j \frac{d}{d\omega} \mathcal{F}[f'(t)] = j \frac{d}{d\omega} [j\omega F(\omega)] = -F(\omega) - \omega F'(\omega)$$

$$\mathcal{F}[t^2 f'(t)] = j \frac{d}{d\omega} \mathcal{F}[tf'(t)] = j \frac{d}{d\omega} [-F(\omega) - \omega F'(\omega)] = -2jF'(\omega) - j\omega F''(\omega)$$

## 课时八 练习题

1.  $\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t-3)e^{-t} dt = \underline{\hspace{2cm}}。$

2.  $\int_{-\infty}^{+\infty} 3\delta(t) dt = \underline{\hspace{2cm}}。$

3. 求指数衰减函数  $f(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ e^{-\beta t} & t \geq 0 \end{cases} (\beta > 0)$  的傅氏变换。

4. 函数  $f(t) = \begin{cases} e^{-2t}, & t > 0 \\ 0, & t \leq 0 \end{cases}$  的傅氏变换  $F(\omega) = \underline{\hspace{2cm}}。$

5. 求矩形函数  $f(t) = \begin{cases} 2, & 0 < t < \tau \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$  的傅里叶变换。

6.  $f(t) = \sin t \cos t$  的 Fourier 变换是 ( )

A.  $\frac{\pi}{4} j [\delta(\omega+2) - \delta(\omega-2)]$

B.  $\frac{\pi}{2} j [\delta(\omega+2) - \delta(\omega-2)]$

C.  $\pi j [\delta(\omega+2) - \delta(\omega-2)]$

D.  $2\pi j [\delta(\omega+2) - \delta(\omega-2)]$

7. 求函数  $f(t) = \delta'(t-2)$  的频谱。(Fourier 变换)

8. 已知函数  $f(t)$  的 Fourier 变换为  $F(\omega)$ , 求函数  $g(t) = f(2t-5)$  的 Fourier 变换。

9. 已知函数  $f(t)$  的傅里叶变换为  $F(\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$ , 则  $\mathcal{F}[tf(t)] = \underline{\hspace{2cm}}。$

10. 已知  $f(t) = e^{-t^2}$  的傅里叶变换为  $F(\omega) = \sqrt{\pi} e^{-\frac{\omega^2}{4}}$ , 求函数  $g(t) = te^{-t^2}$  和  $h(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}$  的傅里叶变换。

## 课时九 Laplace 拉普拉斯变换

考点	重要程度	占分	题型
1. 定义和性质	★★★	3 ~ 8	选择、填空
2. 应用	★★★★★	6 ~ 10	大题

### 1. 定义和性质

题 1. 求  $f = e^{kt}$  的 Laplace 变换 ( $k$  为实数)

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} f(t)e^{-st} dt$$

$$f(t) = \mathcal{L}^{-1}[F(s)]$$

$$\text{解: } F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} e^{kt} e^{-st} dt = \int_0^{+\infty} e^{-(s-k)t} dt = -\frac{1}{s-k} e^{-(s-k)t} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{s-k}$$

题 2. 求  $f(t) = \sin kt$  的 Laplace 变换 ( $k$  为实数)

$$\text{解: } F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{+\infty} \sin kte^{-st} dt = \frac{e^{-st}}{s^2 + k^2} (-s \sin kt - k \cos kt) \Big|_0^{+\infty} = \frac{k}{s^2 + k^2}$$

常见 Laplace 拉普拉斯变换对

$$1 \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s}$$

$$\sin at \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{a}{s^2 + a^2}$$

$$e^{at} \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{1}{s-a}$$

$$t^n, (n > -1) \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{n!}{s^{n+1}}$$

$$\cos at \xrightarrow{\mathcal{L}} \frac{s}{s^2 + a^2}$$

常用 Laplace 拉普拉斯变换的性质  $\mathcal{L}[f(t)] = F(s)$

$$1. \mathcal{L}[f(t-a)] = e^{-as} F(s); \quad \mathcal{L}[e^{at} f(t)] = F(s-a)$$

$$2. \mathcal{L}[f'(t)] = sF(s) - f(0); \quad \mathcal{L}[f''(t)] = s^2 F(s) - sf'(0) - f''(0)$$

$$3. \mathcal{L}[tf(t)] = -F'(s)$$

$$4. \mathcal{L}\left[\int_0^t f(t) dt\right] = \frac{1}{s} F(s); \quad \mathcal{L}\left[\frac{1}{t} f(t)\right] = \int_s^{+\infty} F(s) ds$$

$$5. \mathcal{L}[f(t) * g(t)] = \mathcal{L}[f(t)] \cdot \mathcal{L}[g(t)]$$

题 3. 求  $t^3 + te^{-t} + e^{2t} \cos 5t$  的拉普拉斯变换。

解:  $\mathcal{L}(t^3) = \frac{3!}{s^{3+1}} = \frac{6}{s^4}$

$$\mathcal{L}(t) = \frac{1}{s^{1+1}} = \frac{1}{s^2} \quad \mathcal{L}(te^{-t}) = \frac{1}{[s - (-1)]^2} = \frac{1}{(s+1)^2}$$

$$\mathcal{L}(\cos 5t) = \frac{s}{s^2 + 5^2} \quad \mathcal{L}(e^{2t} \cos 5t) = \frac{s-2}{(s-2)^2 + 5^2}$$

$$F(s) = \mathcal{L}(t^3 + te^{-t} + e^{2t} \cos 5t) = \frac{6}{s^4} + \frac{1}{(s+1)^2} + \frac{s-2}{(s-2)^2 + 5^2}$$

题 4. 利用拉普拉斯变换求积分  $\int_0^{+\infty} \frac{1 - \cos 2t}{t} e^{-2t} dt$

解: 求  $\frac{1 - \cos 2t}{t}$  的 Laplace 变换  $F(s)$

$$\mathcal{L}(1) = \frac{1}{s} \quad \mathcal{L}(\cos 2t) = \frac{s}{s^2 + 4}$$

$$F(s) = \int_0^{+\infty} f(t) e^{-st} dt$$

利用性质 4  $\mathcal{L}\left(\frac{1 - \cos 2t}{t}\right) = \int_s^{+\infty} \left(\frac{1}{s} - \frac{s}{s^2 + 4}\right) ds = \left[ \ln s - \frac{1}{2} \ln(s^2 + 4) \right] \Big|_s^{+\infty}$

$$= \ln \frac{s}{\sqrt{s^2 + 4}} \Big|_s^{+\infty} = -\ln \frac{s}{\sqrt{s^2 + 4}}$$

$$\text{原式} = F(2) = -\ln \frac{2}{\sqrt{2^2 + 4}} = -\ln \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2} \ln 2$$

题 5. 已知  $f(t)$  的 Laplace 变换  $F(s) = \frac{1}{(s-1)^4}$ , 则  $f(t) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解:  $\because \mathcal{L}(t^3) = \frac{3!}{s^4} = \frac{6}{s^4} \quad \therefore \frac{1}{6} \mathcal{L}(t^3) = \frac{1}{s^4} \quad \mathcal{L}\left(\frac{t^3}{6}\right) = \frac{1}{s^4}$

利用性质 1:  $\mathcal{L}\left(e^t \frac{t^3}{6}\right) = \frac{1}{(s-1)^4}$

$$\therefore f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-1)^4}\right] = \frac{t^3}{6} e^t$$

## 题 6. 求下列函数的拉普拉斯逆变换

$$(1) \frac{1}{s(s-1)} \quad (2) \frac{2s+5}{s^2+4s+13}$$

解：(1)  $\frac{1}{s(s-1)} = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}$

$$\therefore \mathcal{L}(e^t) = \frac{1}{s-1} \quad \mathcal{L}(1) = \frac{1}{s}$$

$$\therefore f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}\right) = e^t - 1$$

$$(2) \frac{2s+5}{s^2+4s+13} = \frac{2(s+2)+1}{(s+2)^2+9} = \frac{2(s+2)}{(s+2)^2+9} + \frac{1}{(s+2)^2+9}$$

利用性质 1

$$\therefore \mathcal{L}(\cos 3t) = \frac{s}{s^2+9}$$

$$\mathcal{L}(\sin 3t) = \frac{3}{s^2+9}$$

$$\therefore \mathcal{L}(e^{-2t} \cos 3t) = \frac{s+2}{(s+2)^2+9}$$

$$\mathcal{L}(e^{-2t} \sin 3t) = \frac{3}{(s+2)^2+9}$$

$$\therefore \mathcal{L}(2e^{-2t} \cos 3t) = \frac{2(s+2)}{(s+2)^2+9}$$

$$\mathcal{L}\left(\frac{1}{3}e^{-2t} \sin 3t\right) = \frac{1}{(s+2)^2+9}$$

$$\therefore f(t) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2s+5}{s^2+4s+13}\right) = 2e^{-2t} \cos 3t + \frac{1}{3}e^{-2t} \sin 3t$$

## 2. 应用

题 1. 用拉普拉斯变换求初值问题  $\begin{cases} y'' - 2y' + y = 1 \\ y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \end{cases}$

解：对两边取 Laplace 变换，利用性质 2

$$s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) - 2[sY(s) - y(0)] + Y(s) = \frac{1}{s}$$

代入  $y(0) = 0, y'(0) = 1$  得  $s^2 Y(s) - 1 - 2sY(s) + Y(s) = \frac{1}{s}$

整理得  $(s^2 - 2s + 1)Y(s) = \frac{1}{s} + 1$   $Y(s) = \frac{1+s}{(s-1)^2 s}$

设  $Y(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{(s-1)^2} + \frac{C}{s}$

$$A = \text{Res}[Y(s), 1] = \lim_{s \rightarrow 1} \left[ (s-1)^2 \frac{1+s}{(s-1)^2 s} \right]' = \lim_{s \rightarrow 1} -\frac{1}{s^2} = -1$$

$$B = \text{Res}[Y(s) \cdot (s-1), 1] = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{1+s}{(s-1)^2 s} (s-1)^2 = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{1+s}{s} = 2$$

$$C = \text{Res}[Y(s), 0] = \lim_{s \rightarrow 0} s \frac{1+s}{(s-1)^2 s} = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{1+s}{(s-1)^2} = 1$$

$$\therefore Y(s) = \frac{-1}{s-1} + \frac{2}{(s-1)^2} + \frac{1}{s} \quad \text{求 Laplace 逆变换 } y(t) = -e^t + 2te^t + 1$$

题 2. 用拉氏变换解方程  $y(t) = e^t - \int_0^t y(t)dt$

解：两边取 Laplace 变换，利用性质 4  $Y(s) = \frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}Y(s)$

整理得  $Y(s) = \frac{s}{(s-1)(s+1)}$  设  $Y(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+1}$

$$A = \text{Res}[Y(s), 1] = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1) \frac{s}{(s-1)(s+1)} = \frac{1}{2}$$

$$B = \text{Res}[Y(s), -1] = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1) \frac{s}{(s-1)(s+1)} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore Y(s) = \frac{\frac{1}{2}}{s-1} + \frac{\frac{1}{2}}{s+1} \quad \text{求 Laplace 逆变换 } y(t) = \frac{1}{2}e^t + \frac{1}{2}e^{-t}$$



题 3. 利用 Laplace 变换求解方程  $y(t) = \sin t - 2 \int_0^t y(\tau) \cos(t-\tau) d\tau$

解：方程化简为  $y(t) = \sin t - 2y(t) * \cos t$

两边取 Laplace 变换得： $Y(s) = \frac{1}{s^2+1} - 2Y(s) \cdot \frac{s}{s^2+1}$

整理得  $Y(s) = \frac{1}{s^2+1+2s} = \frac{1}{(s+1)^2}$

求 Laplace 逆变换得  $y(t) = te^{-t}$

卷积：

$$\begin{aligned} f(t) * g(t) &= \int_0^t f(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau \\ &= \int_0^t f(t-\tau) \cdot g(\tau) d\tau \end{aligned}$$

## 课时九 练习题

1. 利用拉普拉斯变换的定义求函数  $f(t) = \cos(3t)$  的拉普拉斯变换  $F(s)$ 。

2. 已知  $f(t) = t^2$ ，则  $f(t)$  的 Laplace 变换为 ( )。

A.  $\frac{3}{s^3}$       B.  $\frac{2}{s^3}$       C.  $\frac{6}{s^3}$       D.  $\frac{6}{s^4}$

3. 求函数  $f(t) = e^{-3t} \cos 4t$  的拉普拉斯变换。

4. 求函数  $f(t) = t \sin 3t$  的 Laplace 变换，并由此计算积分  $\int_0^{+\infty} te^{-3t} \sin 3t dt$ 。

5. 积分  $\int_0^{+\infty} te^{-2t} dt$  的值为\_\_\_\_\_。

6. 求  $F(s) = \frac{1}{s^2(s-1)}$  的拉氏逆变换。

8. 用 Laplace 变换求解微分方程初值问题  $\begin{cases} y'' + 2y' - 3y = e^{-t} \\ y(0) = 0 \quad y'(0) = 1 \end{cases}$ 。

9. 用拉普拉斯变换解常微分初值问题： $y'' - 4y' + 3y = e^{-t}$ ， $y(0) = y'(0) = 1$ 。

10. 用 Laplace 变换求方程  $y'' - y = \cos t + \sin t$  满足初始条件  $y|_{t=0} = 0$ ， $y'|_{t=0} = 0$  的特解。

11. 用拉普拉斯变换求解微分方程  $f(t) = at + \int_0^t \sin(t-\tau) f(\tau) d\tau$ 。

12. 求积分方程的解： $y(t) + \int_0^t y(t-\tau) e^{\tau} d\tau = 2t - 3$ 。

## 课时十 映射

考点	重要程度	占分	题型
1. 映射	★	3~5	选择、填空
2. 分式线性映射	★★★	3~10	选择、填空、大题

## 1. 映射

题 1. 曲线  $x^2 + y^2 = 4$  在映射  $\omega = \frac{1}{z}$  下所形成的图形为 ( )

A. 圆      B. 直线      C. 射线      D. 圆弧

解：令  $z = x + iy$ ,  $\omega = u + iv$ , 则  $\omega = \frac{1}{z}$  相当于

$$u + iv = \frac{1}{x + iy} = \frac{x}{x^2 + y^2} - \frac{iy}{x^2 + y^2}$$

$$\begin{cases} u = \frac{x}{x^2 + y^2} = \frac{x}{4} \\ v = \frac{-y}{x^2 + y^2} = \frac{-y}{4} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 4u \\ y = -4v \end{cases}$$

$$\text{当 } x^2 + y^2 = 4 \text{ 时, } (4u)^2 + (-4v)^2 = 4 \quad \text{即 } u^2 + v^2 = \frac{1}{4}$$

答案：A

题 2. 映射  $\omega = z^2 + z$  在  $z_0 = -\frac{1}{2} + i$  处的伸缩率为\_\_\_\_\_，转动角为\_\_\_\_\_。

解： $\omega'(z_0) = (2z + 1)\Big|_{z_0 = -\frac{1}{2} + i} = 2i$

$$\text{伸缩率: } |\omega'(z_0)| = |2i| = 2$$

$$\text{转动角: } \arg \omega'(z_0) = \frac{\pi}{2}$$

$$\text{伸缩率: } |\omega'(z_0)|$$

$$\text{转动角: } \arg \omega'(z_0)$$

## 2. 分式线性映射


1. 分式线性映射  $\omega = \frac{az + b}{cz + d}$ ,  $ad - bc \neq 0$

2. 唯一分式线性映射  $\omega$


给定  $\omega$  平面 3 个点  $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ ,  $z$  平面 3 个点  $z_1, z_2, z_3$ , 则  $\frac{\omega - \omega_1}{\omega - \omega_2} \cdot \frac{\omega_3 - \omega_2}{\omega_3 - \omega_1} = \frac{z - z_1}{z - z_2} \cdot \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1}$

## 3. 四个常见的映射


上半平面映射到单位圆  $\omega = e^{i\theta} \left( \frac{z-\lambda}{z\bar{\lambda}} \right) \quad (\text{Im}(\lambda) > 0)$




单位圆映射到单位圆  $\omega = e^{i\theta} \left( \frac{z-a}{1-\bar{\alpha}z} \right) \quad (|\alpha| < 1)$



角形域映射到角形域  $\omega = z^n$



带形域映射到角形域  $\omega = e^z$



题 1. 求将上半平面变换到单位圆的分式线性映射  $\omega = f(z)$ , 且满足  $f(i) = 0, \arg f'(i) = \frac{\pi}{2}$ 。

解: 设  $\omega = f(z) = e^{i\theta} \frac{z-i}{z+i}$

$$\text{则 } f'(i) = e^{i\theta} \frac{(z+i) - (z-i)}{(z+i)^2} \Big|_{z=i} = -\frac{1}{2} i e^{i\theta} = \frac{1}{2} e^{-\frac{\pi}{2}i} e^{i\theta} = \frac{1}{2} e^{i(\theta - \frac{\pi}{2})}$$

$$\arg f'(i) = \theta - \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \theta = \pi \quad \omega = f(z) = -\frac{z-i}{z+i}$$

题 2. 求把单位圆映射成单位圆的分式线性映射, 并满足条件:  $f\left(\frac{1}{2}\right)=0, \arg f'\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{\pi}{2}$ 。


解: 设  $\omega = f(z) = e^{i\theta} \frac{z - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z}$ ,

$$\text{则 } f'\left(\frac{1}{2}\right) = e^{i\theta} \left[ \left(1 - \frac{1}{2}z\right) + \frac{1}{2}\left(z - \frac{1}{2}\right) \right] / \left(1 - \frac{1}{2}z\right)^2 = \frac{4}{3}e^{i\theta}$$

$$\arg f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \text{ 故 } \omega = e^{i\frac{\pi}{2}} \frac{z - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{2}z} = i \frac{2z - 1}{2 - z}$$

题 3. 求把平面的角形域  $0 < \arg z < \frac{\pi}{4}$  映射成单位圆域  $|\omega| < 1$  的一个映射  $\omega = f(z)$ , 如下图

所示, 并满足  $f\left(e^{i\frac{\pi}{8}}\right)=0, f(0)=i$ 。



解: 首先将  $0 < \arg z < \frac{\pi}{4}$  的角形域映射为上半平面, 设  $\zeta = z^4$


然后将上半平面映射为单位圆内, 设  $\omega = e^{i\theta} \frac{\zeta - \lambda}{\zeta - \bar{\lambda}}$

$$\text{则 } \omega = e^{i\theta} \frac{z^4 - \lambda}{z^4 - \bar{\lambda}}$$

$$\text{当 } z = e^{i\frac{\pi}{8}} \text{ 时, } f(z) = f\left(e^{i\frac{\pi}{8}}\right) = e^{i\theta} \frac{i - \lambda}{i - \bar{\lambda}} = 0, \text{ 可得 } \lambda = i, \omega = e^{i\theta} \frac{z^4 - i}{z^4 + i}$$

$$\text{当 } z = 0 \text{ 时 } f(z) = f(0) = e^{i\theta} \frac{0 - i}{0 + i} = -e^{i\theta} = i, \text{ 可得 } e^{i\theta} = -i, \omega = -i \frac{z^4 - i}{z^4 + i}$$

题 4. 求一个将带形域  $\frac{\pi}{6} < \operatorname{Re}(z) < \frac{\pi}{3}$  映射成上半平面  $\operatorname{Im}(\omega) > 0$  的共形映射。



解：首先将带形域  $\frac{\pi}{6} < \operatorname{Re}(z) < \frac{\pi}{3}$  映射为带形域  $0 < \operatorname{Im}(\zeta) < \pi$  设  $\zeta = \frac{\pi i}{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}}(z - \frac{\pi}{6})$ ,

然后将带形域映射成上半平面，设  $\omega = e^\zeta$

$$\text{则 } \omega = e^{\frac{\pi i}{\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{6}}(z - \frac{\pi}{6})} = e^{i(6z - \pi)}$$

## 课时十 练习题

1.  $\omega = \frac{i}{z}$  将  $z$  平面上的直线  $x=2$  映射成  $\omega$  平面上的曲线为 ( )

A.  $2(u^2 + v^2) = v$

B.  $v^2 = 2(1-u)$

C.  $u^2 = 2(1-v)$

D.  $u^2 + v^2 = \frac{1}{3}u$

2. 映射  $\omega = 3z^2$  在  $z_0 = i$  处的伸缩率为\_\_\_\_\_。

3. 在映射  $\omega = 2z^2 + 4z$  下，曲线  $C$  在点  $z_0 = i$  处的伸缩率是\_\_\_\_\_，旋转角是\_\_\_\_\_。

4. 称\_\_\_\_\_构成的映射为分式线性映射。

5. 求把上半平面  $\operatorname{Im}(z) > 0$  映射成单位圆  $|\omega| < 1$ ，且满足  $\omega(2i) = 0$ ， $\arg \omega'(2i) = -\frac{\pi}{2}$  的分式线性映射。

6. 求将单位圆映射成单位圆且满足条件  $\omega\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ ， $\omega'\left(\frac{1}{2}\right) > 0$  的分式线性映射。

7. 求在带型域  $1 < \operatorname{Re}(z) < 2$  的一个映射，映射为单位圆  $|\omega| < 1$ 。