

addr

NOMBRE:

INDICIO

VESÍCULA BILIAR DISTENDIDA CON LEVES CAMBIOS INFLAMATORIOS DE LA GRASA

ADYACENTE DE FORMA ASOCIADA Y DOS (2) LITOS EN SU INTERIOR, MIDEN 20 MM Y 19 MM, CONSIDERAR COLECISTITIS AGUDA LITIASICA.

- ALTERACIÓN DE LA DENSIDAD DE LA GRASA PERIRRENAL DE FORMA BILATERAL, CORRELACIONAR CON PRUEBAS DE FUNCIÓN RENAL/EGO.

- ENFERMEDAD ATEROESCLERÓTICA LEVE Y CAMBIOS OSTEODEGENERATIVOS. TAMBIEN SE IDENTIFICAN PLACAS ATEROMATOSAS CALCIFICADAS A NIVEL DE ARTERIAS CORONARIAS.

- ADENOMA DE GLÁNDULAS SUPRARRENAL DERECHA.

HALLAZGOS

Descripción - se evalúa tomografía abdominal fase simple y con medio de contraste endovenoso, donde observamos:

Estructuras gastrointestinales: porción esofágica inferior y unión gastroesofágica de morfología normal. Cámaras gástrica no distendida, de situación normal, sin alteraciones parietales evidentes. Intestino delgado y marco colónico sin hallazgos patológicos. Apéndice cecal de morfología normal, no presenta cambios inflamatorios.

No hay líquido libre en cavidad abdominal ni presencia de linfadenopatías.

Estructuras vasculares en fase simple se identifican placas ateromatosas calcificadas parietales periféricas, en leve cantidad a nivel de la aorta abdominal y ramas ilíacas comunes. Tras la administración de medio de contraste hay adecuada opacificación de estructuras arteriales y venosas. No se identifican defectos de llenado que sugieran trombosis.

HÃ-gado de forma, tamaÃ±o, situaciÃ³n y densidad normal, lÃ¡bulo hepÃ¡tico derecho mide 155 mm. No se identifican lesiones focales o difusas en su parÃ©nquima.

IMPRESION

Se detecto ejemplo descriptivo para colocar mÃ¡s contenido del transcriptor

RECOMENDACIONES

El medico receto ejemplo descriptivo para colocar mÃ¡s contenido del transcriptor



MILDRED JANET BU FIGUEROA

Médico radiólogo

