



Taki Academy
www.takiacademy.com

Mathématiques

Classe : 4^{ème} année

Chapitre : Equations différentielles

📍 Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina /
Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir /
Gabès / Djerba



Exercice 1

🕒 20 min

4 pt



On se propose de résoudre l'équation différentielle : $(E): y' + 3y = x^2 - 4x$

- 1°) Démontrer qu'il existe une fonction polynôme du second degré u solution de (E) .
- 2°) Montrer que la fonction f est solution de (E) si et seulement si la fonction $g = f - u$ est solution de l'équation différentielle $(E_1): y' + 3y = 0$.
- 3°) Résoudre l'équation (E_1) . En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E) .
- 4°) Déterminer la fonction f solution de (E) dont la courbe représentative dans un repère (O, \vec{i}, \vec{j}) passe par le point A de coordonnées $(-1, 2)$.

Exercice 2

🕒 20 min

4 pt



On se propose de résoudre l'équation différentielle : $(E): y' - 2y = \frac{2}{(1 + e^{-2x})^2}$

- 1°) Soit g une fonction dérivable sur \mathbb{R} et f la fonction définie par :

$$\text{Montrer que } f \text{ est solution de } (E) \text{ si et seulement si } g'(x) = \frac{2e^{-2x}}{(1 + e^{-2x})^2}.$$

- 2°) En déduire l'ensemble des solutions de (E) .
- 3°) Déterminer la fonction f solution de (E) qui prend la valeur 1 en 0.

Exercice 3

🕒 20 min

4 pt



- 1°) Résoudre l'équation différentielle $y'' + y = 0$.
- 2°) Soit E l'ensemble des fonctions définies et deux fois dérivables sur \mathbb{R} telles que
Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f'(x) + f\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = 0$, où f' désigne la fonction dérivée de f .
 - a) Soit g la fonction définie sur \mathbb{R} par $g(x) = \cos x$. Vérifier que g est un élément de E .
 - b) Soit f un élément de E . Vérifier que, pour tout réel x , $f''(x) = f'\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$.
 - c) En déduire que si f est un élément de E alors f est une solution de l'équation différentielle $y'' + y = 0$
 - d) Déterminer alors l'ensemble E .



73.832.000

Exercice 4

⌚ 20 min

4 pt



On considère les deux équations différentielles suivantes définies sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ par :

$$\begin{cases} (E): y' + (1 + \tan x) y = \cos x \\ (E_0): y' + y = 1 \end{cases}$$

1°) Donner l'ensemble des solutions de l'équation (E_0) .

2°) Soient f et g deux fonctions dérivables sur $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$ et celle que $f(x) = g(x) \cos x$

Démontrer que la fonction f est solution de (E) si et seulement si la fonction g est solution de (E_0) .

3°) Déterminer la solution f de (E) telle que $f(0) = 0$.


Exercice 5

⌚ 25 min

5 pt



On considère les équations différentielles : $(E_0): y' - 3y = 0$ et $(E): y' - 3y = e^{2x+1}$, et la courbe C_f de la fonction ci-contre solution de (E) définie sur \mathbb{R} .



1°) Résoudre l'équation (E_0) .

2°) Vérifier que la fonction g définie sur \mathbb{R} par :



73.832.000

$g(x) = -e^{2x+1}$ est une solution de l'équation (E) .

3°) Montrer que f est une solution de (E) si et

seulement si $(f - g)$ est une solution de (E_0) .

4°) En déduire les solutions de (E) .

5°) a) Expliciter alors $f(x)$.

b) Calculer l'aire A de la partie du plan hachurée sur la figure.



Taki Academy
www.takiacademy.com



Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina /
Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir /
Gabes / Djerba



www.takiacademy.com



73.832.000