



Taki Academy  
www.takiacademy.com

# SVT

Classe : 4<sup>ème</sup> Math

Série : La fonction reproductrice chez  
l'homme (Cours)

---

Nom du Prof : Skander

📍 Sousse (Khezama - Sahloul) Nabeul / Sfax / Bardo / Menzah El Aouina /  
Ezzahra / CUN / Bizerte / Gafsa / Kairouan / Medenine / Kébili / Monastir /  
Gabes / Djerba / Jendouba / Sidi Bouzid / Siliana / Béja / Zaghouan



www.takiacademy.com




73.832.000



## I. Rappel :

Qu'est-ce qu'une hormone ?  
et qu'est qu'une fonction endocrine ?




Une fonction endocrine est toute fonction assurée par une d'hormone, qui est une substance chimique élaborée par des cellules spécialisées, parfois regroupées à l'intérieur d'une **glande** (glande hormonale ou **endocrine**). Ce **messager chimique** déverse dans le **sang** agit sur des **cellules cibles** dont il modifie le fonctionnement.  
Chaque hormone reconnaît «sa» cellule cible grâce à des récepteurs spécifiques.  
Dans toute action hormonale, on retrouve les mêmes étapes

Qu'est-ce que la méiose ?


Quelles sont les différentes étapes de la méiose ?

.....




.....  
.....  
.....

.....






.....  
.....


.....




.....  
.....  
.....

.....






**Conclusion :**





## II- Organisation de l'appareil reproducteur de l'homme



L'appareil génital de l'homme comprend :

- **Les gonades mâles** : les testicules (8) se trouvent dans le scrotum ou bourse (12), qui produisent les spermatozoïdes ou gamètes mâles.
- **Les glandes annexes** : deux vésicules séminales (9), deux glandes de Cooper (10) et une prostate (2) dont les sécrétions entrent dans la composition du sperme et servent à la nutrition et au déplacement des spermatozoïdes. Le sperme est constitué de spermatozoïdes (20 à 200 millions/ml) baignant dans un liquide appelé le plasma séminal formé de substances produites par les glandes annexes, les épидидymes (11) et les spermiductes (1).
- **Les voies génitales** : deux épидидymes, deux spermiductes ou canaux déférents et un urètre (3).
- **Un organe de copulation** : Le Pénis formé de l'extérieur vers l'intérieur par un tissu caverneux (5) et un tissu spongieux (4) érectile parcouru ventralement par l'urètre (3) se terminant par le gland (6) et s'ouvrant à l'extérieur par l'orifice urogénital (7).


**NB** : chez le mâle l'urètre est une voie commune à l'appareil urinaire et à l'appareil génital d'où le nom d'uro-spermiducte.

## L'appareil génital de l'homme comprend :

Les organes	Noms	Fonctions
Les gonades	2 testicules	<p>Les testicules assurent deux fonctions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- La production des gamètes mâles : les spermatozoïdes (fonction exocrine)</li> <li>- L'apparition et le maintien des caractères sexuels masculins (fonction endocrine)</li> </ul>
Les voies génitales	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 épididymes,</li> <li>➤ 2 canaux déférents,</li> <li>➤ un urètre</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- transit et maturation des spz (deviennent mobiles capables de féconder un ovocyte),</li> <li>- Canaux déférents (spermiductes) : Transit des spz.</li> <li>- L'urètre : évacuation des spermatozoïdes à l'extérieur.</li> </ul>
Les organes annexes = les glandes annexes	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 2 vésicules séminales,</li> <li>➤ La prostate,</li> <li>➤ 2 glandes de Cowper</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- les vésicules séminales : secrètent un liquide nutritif riche en fructose (nutrition des spz).</li> <li>- la prostate : secrète un produit d'aspect laiteux riche en enzymes.</li> <li>- les glandes de Cowper : secrètent un liquide diluant le sperme.</li> </ul> <p><b>Sperme</b> = liquide séminal (sécrétions des vésicules séminales) et prostatique + spz</p>
Organe de copulation	Pénis	Le transfert du sperme dans les voies génitales de la femme.


## II- Les fonctions du testicule :

### 1) La structure des testicules :




Un testicule est formé de 200 à 300 lobules testiculaires (3) contenant chacun de 1 à 4 tubes séminifères (4) pelotonnés. Chaque tube, d'une longueur de plusieurs dizaines de centimètres est un cul-de-sac en continuité avec le canal déferent (1) en passant par l'épididyme (2).

Doc 2a : structure du testicule d'un mammifère



Document 3a : coupe transversale de tubes séminifères (MEB X 200)



Document 3b : coupe transversale d'un tube séminifère agrandi (MEB X 640)

Doc 3 : Coupe transversale de tubes séminifères

Une coupe transversale d'un tube séminifère (3) montre une paroi (1) développée qui présente plusieurs types cellulaires et une lumière réduite (2)

Une coupe transversale de testicule montre de nombreux tubes séminifères et un tissu interstitiel.






Schéma d'interprétation d'une coupe de testicule

Au niveau de la paroi du tube séminifère existe deux types de cellules :

- des **cellules somatiques** : ce sont les **cellules de sertoli (8)**. Elles s'étendent de la membrane basale ou enveloppe conjonctive (1) du tube séminifère jusqu'à sa lumière avec un noyau polygonal. Ce sont des grandes cellules ayant un rôle **sécréteur, de soutien et de nutrition** pour les cellules de la lignée germinale. Les spermatozoïdes se trouvent implantés dans les replis cytoplasmiques de leur membrane, près de la lumière du tube.

- des cellules germinales, en allant de l'enveloppe conjonctive vers la lumière du tube séminifère on rencontre :

- \* des spermatogonies (2)
- \* des spermatocytes I (3)
- \* des spermatocytes II (4)
- \* des spermatides (5)
- \* des spermatozoïdes (7)


♦ Au niveau du tissu interstitiel, existent des cellules interstitielles appelées encore cellules de Leydig (10) en contact étroit avec des capillaires sanguins (9).

### III- Fonctions des testicules

#### 1) Fonction exocrine des testicules

Le testicule est le lieu de la production des spermatozoïdes.

##### a- Structure et particularités des spermatozoïdes :



Les spermatozoïdes sont des cellules sexuelles mâles différenciées ayant les caractéristiques suivantes : une petite cellule, légère, mobile (pour transporter l'information génétique paternelle dans les voies génitales femelle jusqu'au gamète femelle), de forme effilée hydrodynamique formée de trois parties principales, tête (7), pièce intermédiaire (8) et queue (9).

La tête est formée d'un noyau haploïde (3) coiffé d'un acrosome (2), sous le noyau existe un centrosome (4), le tout est enveloppé par une membrane plasmique (1).

La pièce intermédiaire est formée par de nombreuses mitochondries (5) disposées en hélice autour du début du flagelle.

La queue est formée d'un long flagelle (6).


Le tableau suivant résume les différentes parties du spermatozoïde, leurs principaux constituants et leurs rôles :

Parties	constituants	Rôles
Tête	Noyau haploïde	Contient l'information génétique paternelle sous forme de $n = 23$ chromosomes simples.
	Acrosome	Coiffe le noyau, il assure la pénétration du spermatozoïde dans le gamète femelle lors de la fécondation.
	centrosome	à l'origine des asters lors de la mitose de la cellule œuf.
Pièce intermédiaire	Mitochondries	Disposées en spire autour du début du flagelle, elles fournissent l'énergie nécessaire aux activités métaboliques et aux mouvements du spermatozoïde
Queue	Long flagelle	Animé de mouvements ondulatoires, il propulse le spermatozoïde vers l'avant




### b- La spermatogenèse

Chez l'homme la spermatogenèse est un **phénomène continu**.

L'homme commence à produire les spermatozoïdes à partir de la puberté jusqu'à la mort sans interruption s'il est indemne de maladie qui empêche la spermatogenèse. Cette spermatogenèse se déroule dans les tubes séminifères en quatre phases successives : multiplication, accroissement, maturation et différenciation.



Le tableau suivant résume les différentes phases de la spermatogenèse :

Phases	Schéma d'interprétation
<p><b>La phase de multiplication :</b> La division des spermatogonies (cellules souches à <math>2n</math> chrs) situées à la périphérie des tubes séminifères, par mitose, permet leur multiplication.</p> <p>Chaque spermatogonie, se divisant par mitose, donne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• une spermatogonie qui reste en périphérie du tube séminifère pour assurer la conservation du stock de spermatogonies,</li> <li>• une autre spermatogonie qui subit d'autres mitoses permettant la multiplication du nombre de spermatogonies qui s'engagent dans la spermatogenèse.</li> </ul>	 <p>Mitose</p> <p>Spermatogonie</p> <p>Spermatogonies</p>
<p><b>La phase d'accroissement :</b> les spermatogonies subissent un léger accroissement et deviennent des spermatocytes I (toujours à <math>2n</math> chromosomes).</p>	 <p><math>2n = 46</math> chrs dupli- qués</p> <p>Spermatocyte I</p> <p><math>2n = 46</math> chrs dupli- qués</p>
<p><b>La phase de maturation :</b></p> <p>elle est assurée par la méiose qui comprend deux divisions : une division réductionnelle puis une division équationnelle.</p>	 <p>DR</p> <p>Méiose</p> <p>DE</p> <p>Spermatocyte II</p> <p><math>n = 23</math> chr dupli- qués</p> <p>Spermatides</p> <p><math>n = 23</math> chrs simples</p> <p>Spermatozoïdes</p> <p><math>n = 23</math> chrs simples</p>
<p><b>La phase de différenciation ou spermiogenèse :</b></p>	

## 2- Fonction endocrine des testicules

Pour mettre en évidence la fonction endocrine des testicules, on réalise une série d'expériences présentée dans le tableau suivant

Expériences	Résultats	Conclusions
1) Ablation des testicules d'un rat jeune impubère (castration).	L'animal reste toujours impubère.	Les testicules sont responsables de l'apparition des signes de la puberté.
2) Ablation des testicules d'un rat adulte (castration).	* Stérilité. * Atrophie du tractus génital. * Régression des caractères sexuels secondaires.	L'absence des testicules explique la stérilité. Les testicules contrôlent l'apparition, le développement et le maintien des caractères sexuels masculins primaires et secondaires.
3) Greffe d'un fragment du testicule au même rat sous la peau du cou.	* Stérilité. * Restauration des caractères sexuels secondaires.	Le fragment de testicule n'est pas à sa place ce qui explique la stérilité. Le contrôle testiculaire des caractères sexuels se fait à distance par voie sanguine.
4) Injections quotidiennes d'extraits testiculaires au rat castré (castrat).	* Stérilité. * Restauration des caractères sexuels secondaires.	L'absence des testicules explique la stérilité. Les extraits testiculaires contiennent une hormone mâle libérée par les testicules et qui est responsable de ce contrôle testiculaire des caractères sexuels à distance par voie sanguine.
5) On irradie les testicules d'un rat adulte aux rayons X : destruction des tubes séminifères, le tissu interstitiel reste intact.	* Stérilité. * Maintien des caractères sexuels secondaires et du tractus génital.	La destruction des tubes séminifères explique la stérilité. L'hormone mâle est sécrétée par le tissu interstitiel (cellules de Leydig).
6) On extrait à partir des testicules irradiés une hormone : La Testostérone. Puis on l'injecte à des rats castrés.	* Stérilité. * Restauration et maintien des caractères sexuels secondaires et du tractus génital.	L'absence des testicules explique la stérilité. La testostérone sécrétée par les cellules de Leydig ou cellules interstitielles, est responsable de l'apparition, maintien et développement des caractères sexuels masculins primaires et secondaires.


Les testicules assurent l'apparition, le développement et le maintien des caractères sexuels masculins (primaires et secondaires) ainsi que le déroulement de la spermatogenèse. Cette action se fait par la production de substances chimiques appelées **hormones**. Il s'agit de la **testostérone**, hormone masculinisante produite par les **cellules de Leydig**.



## IV- Régulation de la Fonction reproductrice masculine

### 1- L'hypophyse contrôle le fonctionnement des testicules

L'hypophyse est une petite glande reliée à l'hypothalamus par une tige pituitaire à la face inférieure de l'encéphale, elle comprend deux parties : l'hypophyse antérieure (antéhypophyse) et l'hypophyse postérieure.



Pour montrer le contrôle hypophysaire, on réalise les séries d'expériences

1 <sup>ère</sup> Série d'expérience	Résultats	Conclusion
Ablation de l'hypophyse (hypophysectomie) chez un rat pubère	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Atrophie des testicules</li> <li>- Régression des tubes séminifères et du tissu interstitiel</li> <li>- Arrêt de la production de spermatozoïdes et de testostérone</li> </ul>	L'hypophyse <b>contrôle</b> le développement et le fonctionnement des testicules qui assurent la fonction de production des spermatozoïdes et de la testostérone.
Injection d'extraits hypophysaires au même rat hypophysectomisé.	Reprise de la spermatogenèse et de la sécrétion de testostérone	L'hypophyse contrôle le développement et le fonctionnement des testicules en agissant <b>par voie sanguine</b> grâce à des <b>hormones hypophysaires</b> .

L'hypophyse contrôle le développement des testicules, le déroulement de la spermatogenèse et la sécrétion de la testostérone par les cellules interstitielles.

Ce contrôle se fait par l'intermédiaire d'hormones la **LH** et la **FSH**.

Ces hormones sont nommées **gonadostimulines, gonadotrophines ou hormones gonadotropes**.

2 <sup>ème</sup> Série d'expérience	Résultats	Conclusion
On injecte à des animaux hypophysectomisés des doses de <b>FSH</b>	Les tubes séminifères se développent de nouveau sans rétablissement de la spermatogenèse	<b>La FSH agit par voie sanguine, sur le développement des tubes séminifères indirectement et l'activation des cellules de Sertoli.</b>
On injecte à des animaux hypophysectomisés des doses de <b>LH</b>	Développement des cellules interstitielles avec sécrétion de testostérone	<b>La LH agit par voie sanguine, sur les cellules de Leydig ou interstitielles et y stimule la sécrétion de la testostérone.</b>
On injecte simultanément la <b>FSH</b> et la <b>LH</b>	Rétablissement de la spermatogenèse et de la production de la testostérone.	<b>L'hypophyse contrôle les fonctions des testicules par voie sanguine grâce aux gonadostimulines FSH et LH dont la sécrétion est synchronisée, et qui agissent en synergie.</b>


- La **LH** (Hormone lutéinisante) : est une hormone hypophysaire qui, agissant sur les cellules interstitielles ou cellule de Leydig, stimule la sécrétion de testostérone.
- La **FSH** (hormone folliculostimuline) : est une hormone hypophysaire qui active indirectement la spermatogenèse. En se liant aux récepteurs des cellules de Sertoli, la **FSH** stimule la synthèse, par ces cellules, d'une protéine : l'**ABP** (Androgen Binding Protein) indispensable à la fixation de la testostérone sur les cellules germinales, ce qui active la poursuite de la spermatogenèse. La sécrétion de FSH est celle de LH se font de manière **pulsatile** (un pulse par 90 mn) et **synchronisée**.

## 2- L'hypothalamus contrôle l'hypophyse

3ème Série d'expérience	Résultats	Conclusion
Lésion de certaines zones de l'hypothalamus chez des mammifères pubères.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Baisse notable du taux plasmatique de FSH et LH</li> <li>- Atrophie des testicules bien que l'hypophyse soit intacte</li> <li>- Arrêt de la spermatogénèse et de la sécrétion de testostérone.</li> </ul>	L'hypothalamus <b>contrôle</b> la fonction reproductrice <b>en contrôlant</b> les sécrétions hypophysaires de FSH et de LH.
Section ou ligature de la tige pituitaire ou greffe d'une hypophyse après son ablation à un endroit quelconque.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Arrêt de sécrétion des gonadostimulines.</li> <li>- Arrêt du fonctionnement testiculaire</li> </ul>	L'hypothalamus contrôle les sécrétions hypophysaires de FSH et de LH par voie sanguine à travers la tige pituitaire grâce à une <b>neurohormone</b> : la <b>GnRH</b> ou <b>gonadolibérine</b> .
Micro-injections <b>discontinues</b> d'extraits hypothalamiques contenant une substance appelée GnRH, dans la circulation sanguine de la tige pituitaire sectionnée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reprise de sécrétion des gonadostimulines.</li> <li>- Reprise du fonctionnement testiculaire</li> </ul>	L'hypothalamus contrôle la fonction reproductrice en contrôlant les sécrétions hypophysaires de FSH et de LH par voie sanguine à travers la tige pituitaire grâce à la <b>neurohormone</b> la GnRH libérée par les neurones hypothalamiques d'une façon <b>discontinue</b> et <b>pulsatile</b> .
Micro-injections <b>continues</b> d'extraits hypothalamiques dans la circulation sanguine de la tige pituitaire sectionnée.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La sécrétion des gonadostimulines demeure arrêtée.</li> <li>- Le fonctionnement testiculaire n'est pas rétabli.</li> </ul>	

Les trois graphes du document ci-contre correspondent à l'enregistrement, chez le bélier, des variations des taux sanguins de trois hormones : **Testostérone**, **LH** et **GnRH**.

Les prélèvements sanguins sont réalisés au niveau de la tige pituitaire pour la GnRH et dans la circulation sanguine générale pour la Testostérone et la LH.



L'hypothalamus contrôle l'activité de l'hypophyse par l'intermédiaire d'une neurohormone appelée **GnRH** (gonadotrophin relasing hormon) ou **gonadolibérine**. Il s'agit d'une **neurohormone** car elle est sécrétée par des cellules nerveuses hypothalamiques appelés aussi **neurones** ayant leurs corps cellulaires dans un noyau de l'hypothalamus et leurs axones dans la tige hypothalamo-hypophysaire au niveau des vaisseaux sanguins.

La GnRH se fixe sur des récepteurs des cellules de l'antéhypophyse et stimule la synthèse et la sécrétion, par ces cellules, des gonadostimulines : **LH** et **FSH**.

La sécrétion de GnRH est **pulsatile** à raison d'un pulse toutes les **90 minutes**.

Les sécrétions de LH et de testostérone sont également **pulsatiles** avec des pics de sécrétion qui sont légèrement décalés dans le temps par rapport aux pics de GnRH, ce qui montre une **relation de causalité** entre les trois sécrétions : les pulses de GnRH induisent les pulses de LH qui entraînent à leurs tours les pulses de testostérone.

### 3- Les testicules exercent un rétrocontrôle (feed back ou rétroaction) sur l'axe hypothalamo-hypophysaire

4 <sup>ème</sup> Série d'expérience	Résultats	Conclusion
1. Castration bilatérale d'un animal pubère.	Hypertrophie de l'hypophyse et sécrétion massive de gonadostimulines (FSH et LH).	Les testicules en place, <b>freinent</b> la sécrétion hypophysaire de FSH et de LH. Il s'agit de <b>rétrocontrôle négatif</b> . La castration bilatérale provoque la <b>levée de cette inhibition</b> .
2. Injection de testostérone chez l'animal castré.	- Baisse rapide du taux sanguin de LH. - Maintien du taux de FSH élevé.	Le <b>rétrocontrôle négatif</b> exercé par le testicule sur la sécrétion hypophysaire de LH se fait par l'hormone mâle : la <b>testostérone</b> .
3. Administration de testostérone dans l'hypothalamus d'un animal.	Baisse de la fréquence et de l'amplitude de sécrétion de GnRH	Par l'intermédiaire de la testostérone, les testicules exercent un <b>rétrocontrôle négatif</b> sur la sécrétion hypothalamique de GnRH.
4. Destruction, par irradiation des tubes séminifères.	- Augmentation du taux sanguin de FSH. - Maintien du taux normal de LH.	Les tubes séminifères renferment des cellules endocrines (cellules de Sertoli) qui inhibent la sécrétion de FSH mais n'ont pas d'action sur la sécrétion de LH.
5. Injection d' <b>Inhibine</b> , extraite des cellules de Sertoli, chez un animal normal.	- Baisse du taux sanguin de FSH. - Maintien du taux sanguin de LH.	L'inhibine, sécrétée par les cellules de Sertoli, agit par <b>rétrocontrôle négatif</b> sur la sécrétion de FSH et n'a pas d'action sur la LH.

La **testostérone** exerce en permanence un effet modérateur sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Ce mécanisme, désigné sous le nom de **feed-back négatif** ou **rétrocontrôle négatif** ou **rétroaction négative**, assure une certaine **stabilité** des sécrétions de la testostérone.


Toute **hausse** du taux de testostérone par rapport aux valeurs normales accentue le freinage sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il se produit alors une **baisse** de la production des gonadostimulines et par suite la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig.



En revanche la **baisse** du taux de testostérone par rapport aux valeurs normales provoque une **levée de l'inhibition** sur l'axe hypothalamo-hypophysaire. Il se produit alors, une augmentation de la production de gonadostimulines, ce qui stimule la sécrétion de testostérone par les cellules de Leydig.

L'**inhibine**, une hormone sécrétée par les cellules de Sertoli, exerce un **rétrocontrôle négatif** sur la synthèse et la sécrétion de **FSH** par les cellules à FSH du lobe antérieur de l'hypophyse. Cette rétroaction négative a pour but de maintenir la production des spermatozoïdes à une valeur normale.

## Bilan :



Bilan fonctionnel de la régulation hormonale de la fonction reproductrice chez l'homme.



