

تمرینات سری پنجم: انتگرال سطح و خم و کاربردها

۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳



سوال ۱

(آدامز بخش ۴ - ۱۵ سوال ۱۰) فرض کنید

$$F = (axy + z)\vec{i} + x^2\vec{j} + (bx + 2z)\vec{k}$$

میدان نیروی پایستار باشد.

الف) a, b و پتانسیلی برای F بیابید.

ب) کار انجام شده توسط میدان نیرو را بر خم C که فصل مشترک رویه های $2x + y + z = 3$ و $9x^2 + 9y^2 + 2z^2 = 18$ است و نقطه $(1, 1, 0)$ را به $(0, 0, 3)$ متصل می کند و در یک هشتم اول قرار دارد، محاسبه کنید.



پاسخ سوال ۱

الف) میدان F پایستار است پس کرل آن صفر است.

$$F = (axy + z)\vec{i} + x^2\vec{j} + (bx + 2z)\vec{k}$$

$$P(x, y, z) = axy + z$$

$$Q(x, y, z) = x^2$$

$$R(x, y, z) = bx + 2z$$

$$\text{curl}(\vec{F}) = \vec{0} \implies \begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \implies ax = 2x \\ \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} \implies 1 = b \\ \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y} \implies 0 = 0 \end{cases} \implies a = 2, b = 1$$

فرض کنیم φ تابع پتانسیل باشد، داریم:

$$F = \nabla \varphi \implies \begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = P \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} = Q \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} = R \end{cases}$$



$$\varphi = \int (2xy + z)dx \implies \varphi = x^2y + xz + g(y, z)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = Q \implies x^2 + \frac{\partial g}{\partial y} = x^2 \implies \frac{\partial g}{\partial y} = 0 \implies g(y, z) = h(z)$$

$$\varphi = x^2y + xz + h(z)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z} = R \implies x + h'(z) = x + 2z \implies h'(z) = 2z \implies h(z) = z^2 + c$$

$$\varphi(x, y, z) = x^2y + xz + z^2 + c$$

ب) کار میدان پایستار مستقل از مسیر حرکت است و فقط به نقاط ابتدا و انتهای خم بستگی دارد.



$$F \cdot dr = \varphi(\text{انتها}) - \varphi(\text{ابتدا}) = \varphi(0, 0, 3) - \varphi(1, 1, 0) = 9 - 1 = 8$$

سوال ۲

(آدامز بخش ۴ - ۱۵ سوال ۱۲) کار انجام شده به وسیله میدان نیروی

$$F = (y^2 \cos x + z^3) \vec{i} + (2y \sin x - 4) \vec{j} + (3xz^2 + 2) \vec{k}$$

در حرکت دادن ذره ای در امتداد خم
 $x = \sin^{-1}t, y = 1 - 2t, z = 3t - 1, (0 \leq t \leq 1)$ را بیابید.



پاسخ سوال ۲

ابتدا کرل میدان F را محاسبه می‌کنیم.

$$F = (y^2 \cos x + z^3) \vec{i} + (2y \sin x - 4) \vec{j} + (3xz^2 + 2) \vec{k}$$

$$P(x, y, z) = y^2 \cos x + z^3$$

$$Q(x, y, z) = 2y \sin x - 4$$

$$R(x, y, z) = 3xz^2 + 2$$

$$\begin{cases} \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = 2y \cos x \\ \frac{\partial P}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial x} = 3z^2 \\ \frac{\partial Q}{\partial z} = \frac{\partial R}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

پس $\text{curl}(\vec{F}) = \vec{0}$ در نتیجه میدان F پایستار است. فرض کنیم φ تابع پتانسیل باشد، داریم:

$$F = \nabla \varphi \implies \begin{cases} \frac{\partial \varphi}{\partial x} = P \\ \frac{\partial \varphi}{\partial y} = Q \\ \frac{\partial \varphi}{\partial z} = R \end{cases}$$



$$\varphi = \int (y^2 \cos x + z^3) dx \rightarrow \varphi = y^2 \sin x + xz^3 + g(y, z)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = Q \rightarrow 2y \sin x + \frac{\partial g}{\partial y} = 2y \sin x - 4 \implies \frac{\partial g}{\partial y} = -4$$

$$\rightarrow g(y, z) = -4y + h(z) \implies \varphi = y^2 \sin x + xz^3 - 4y + h(z)$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial z} = R \implies 3xz^2 + h'(z) = 3xz^2 + 2 \implies h'(z) = 2 \implies h(z) = 2z + c$$

$$\varphi(x, y, z) = y^2 \sin x + xz^3 - 4y + 2z + c$$

$$x(\circ) = \circ, y(\circ) = 1, z(\circ) = -1, x(1) = \frac{\pi}{2}, y(1) = -1, z(1) = 2$$



$$\int_C F \cdot dr = \varphi(\text{انتها}) - \varphi(\text{ابتدا}) = \varphi\left(\frac{\pi}{2}, -1, 2\right) - \varphi(\circ, 1, -1)$$



$$= 1 + 4\pi + 4 + 4 - 0 - 0 + 4 + 2 = 15 + 4\pi$$

سوال ۳

(آدامز بخش ۵ - ۱۵ سوال ۹) مساحت آن قسمت از مخروط $z^2 = x^2 + y^2$ را که درون استوانه $2ay = x^2 + y^2$ قرار دارد بیابید.



پاسخ سوال ۳



شکل:



ابتدا عنصر سطح را بدست می‌آوریم.

$$g(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2 = 0$$

$$\begin{aligned} dS &= \frac{|\vec{\nabla} g|}{|g_z|} dx dy = \frac{|(2x, 2y, -2z)|}{|-2z|} dx dy = \frac{\sqrt{4x^2 + 4y^2 + 4z^2}}{|-2z|} dx dy \\ &= \frac{2\sqrt{x^2 + y^2 + x^2 + y^2}}{2\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy = \sqrt{2} dx dy \end{aligned}$$

تصویر رویه مورد نظر روی صفحه XoY ناحیه D است که این ناحیه همان قاعده استوانه است. لذا مطابق شکل زیر برای محاسبه مساحت نیمه بالایی مخروط داریم:

$$x^2 + y^2 \leq 2ay \Rightarrow r^2 \leq 2ar \sin \theta \Rightarrow 0 \leq r \leq 2a \sin \theta$$



$$\begin{aligned}
 S &= \iint_S dS = \iint_D \sqrt{2} dx dy = \sqrt{2} \int_0^\pi \int_0^{a \sin \theta} r dr d\theta \\
 &= \sqrt{2} \int_0^\pi \left. \frac{r^2}{2} \right|_0^{a \sin \theta} d\theta \\
 &= \sqrt{2} \int_0^\pi \frac{a^2 \sin^2 \theta}{2} d\theta \\
 &= 2\sqrt{2} a^2 \int_0^\pi \sin^2 \theta d\theta \\
 &= 2\sqrt{2} a^2 \int_0^\pi \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta \\
 &= \sqrt{2} a^2 \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_0^\pi = \sqrt{2} \pi a^2
 \end{aligned}$$


پس مساحت کل برابر است با: $2\sqrt{2} \pi a^2$



سوال ۴

(آدامز بخش تمرینات دوره ای فصل 15 سوال ۱۲) شار گذرنده از میدان نیروی $F = (3xz^2, -x, -y)$ در عبور از S ، که قسمتی از استوانه $y^2 + z^2 = 16$ است که در یک هشتم اول و بین صفحات $x = 0$ و $x = 5$ قرار دارد را در جهتی که از محور x دور می شود، محاسبه کنید .





شکل:



$$F = (3xz^2, -x, -y) \quad (x, y, z) = y^2 + z^2 - 16 = 0$$

$$\vec{n} = \pm \frac{\vec{\nabla} g}{|\vec{\nabla} g|} \quad dS = \frac{|\vec{\nabla} g|}{|g_z|} dx dy$$

$$\vec{n} dS = \pm \frac{\vec{\nabla} g}{|\vec{\nabla} g|} \frac{|\vec{\nabla} g|}{|g_z|} dx dy = \pm \frac{\vec{\nabla} g}{|g_z|} dx dy$$

$$\vec{n} dS = \pm \frac{(0, 2y, 2z)}{|2z|} dx dy$$

علامت مثبت و منفی پشت ndS به این دلیل قرار می گیرد که وقتی جهت دور شوند

است یعنی قایم به سمت بیرون استوانه، علامت مثبت از n را در نظر می گیریم.

با توجه به شکل سمت چپ، ناحیه D یک هشتم استوانه روی صفحه xoy یک مستطیل

است که $0 \leq x \leq 5, 0 \leq y \leq 4$



$$\begin{aligned}
 \iint_S \mathbf{F} \cdot \vec{n} dS &= \iint_D (\sqrt{xz}, -x, -y) \cdot \frac{(0, \sqrt{y}, \sqrt{z})}{\sqrt{z}} dx dy \\
 &= \iint_D \left(\frac{-xy}{z} - y \right) dx dy = \int_0^5 \int_0^4 \left(\frac{-xy}{\sqrt{16-y^2}} - y \right) dy dx \\
 u &= 16 - y^2 \implies du = -2y dy \implies \\
 \int \frac{-xy dy}{\sqrt{16-y^2}} &= \int \frac{x du}{2\sqrt{u}} = x\sqrt{u} = x\sqrt{16-y^2} \\
 &= \int_0^5 x\sqrt{16-y^2} - \frac{y^2}{2} \Big|_0^4 dx \\
 &= \int_0^5 (-8 - 4x) dx = -8x - 2x^2 \Big|_0^5 = -40 - 50 = -90
 \end{aligned}$$



سوال ۵

(پایانترم ۹۸ - ۹۷) فرض کنید S رویه پارامتری

$$r(u, v) = (e^u \cos v, e^u \sin v, u), \quad 0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq \pi.$$

باشد. انتگرال $\iint_S \sqrt{1 + x^2 + y^2} dS$ را محاسبه کنید.



پاسخ سوال ۵

ابتدا عنصر سطح را به دست می آوریم.

$$r(u, v) = (e^u \cos v, e^u \sin v, u)$$

$$dS = \left| \frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \right| du dv$$

$$\frac{\partial r}{\partial u} = (e^u \cos v, e^u \sin v, 1)$$

$$\frac{\partial r}{\partial v} = (-e^u \sin v, e^u \cos v, 0)$$

$$\frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ e^u \cos v & e^u \sin v & 1 \\ -e^u \sin v & e^u \cos v & 0 \end{vmatrix} = (-e^u \cos v, -e^u \sin v, e^{2u})$$

$$\left| \frac{\partial r}{\partial u} \times \frac{\partial r}{\partial v} \right| = \sqrt{e^{2u} \cos^2 v + e^{2u} \sin^2 v + e^{4u}} = \sqrt{e^{2u} + e^{4u}} = e^u \sqrt{1 + e^{2u}}$$



$$\sqrt{1+x^2+y^2} = \sqrt{1+e^{2u}\cos^2 v + e^{2u}\sin^2 v} = \sqrt{1+e^{2u}}$$

$$\iint_S \sqrt{1+x^2+y^2} dS = \iint_D e^u \sqrt{1+e^{2u}} \sqrt{1+e^{2u}} du dv$$

$$= \int_0^\pi \int_0^1 e^u (1+e^{2u}) du dv = \int_0^\pi \int_0^1 (e^u + e^{3u}) du dv$$

$$= \int_0^\pi \left(e^u + \frac{1}{3} e^{3u} \right) \Big|_0^1 dv = \pi \left(e + \frac{1}{3} e^3 - \frac{4}{3} \right)$$



سوال ۶

(آدامز بخش ۵ - ۱۵ سوال ۱۴) مطلوبست محاسبه انتگرال $\iint_S x \, dS$ که در آن S آن قسمت از مخروط $z = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$ است که زیر صفحه $z = 1 + y$ قرار دارد.



$$\begin{cases} z = 1 + y \\ z = \sqrt{2(x^2 + y^2)} \end{cases} \rightarrow 1 + y = \sqrt{2(x^2 + y^2)}$$

$$\rightarrow (1 + y)^2 = 2x^2 + 2y^2 \rightarrow x^2 + \frac{(y - 1)^2}{2} = 1$$

یک بیضی به مرکز $(0, 1)$

اکنون ds را برای مخروط به دست می‌آوریم



$$\begin{aligned} ds &= \sqrt{\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy \\ &= \sqrt{1 + \frac{4x^2 + 4y^2}{4x^2 + 4y^2}} dx dy = \sqrt{3} dx dy \end{aligned}$$

$$\iint_S x \, dS = \sqrt{3} \int_{1-\sqrt{2}}^{1+\sqrt{2}} \int_{-\sqrt{1-\frac{(y-1)^2}{2}}}^{\sqrt{1-\frac{(y-1)^2}{2}}} x dx dy = 0$$



سوال ۷

(آدامز بخش ۳ - ۱۶ مثال ۳) فرض کنید C خم بسته ساده پادساعتگرد در صفحه xy باشد که ناحیه ای مانند R را احاطه کرده است و از مبدا نمی گذرد. نشان دهید

$$\oint_C -\frac{y}{x^2 + y^2} dx + \frac{x}{x^2 + y^2} dy = \begin{cases} 0 & \text{اگر مبدا بیرون } C \text{ باشد} \\ 2\pi & \text{اگر مبدا درون } C \text{ باشد} \end{cases}$$



$$P = -\frac{y}{x^2 + y^2} \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

ابتدا فرض می‌کنیم که مبدأ بیرون C است؛ در این صورت P و Q روی R پیوسته هستند و لذا بنابر قضیه‌ی گرین، انتگرال داده شده برابر است با:

$$\begin{aligned} & \iint_R \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_R \left(\underbrace{\frac{x^2 + y^2 - 2x^2}{x^2 + y^2} - \frac{-x^2 - y^2 + 2y^2}{x^2 + y^2}}_{\frac{y^2 - x^2 + x^2 - y^2}{x^2 + y^2} = 0} \right) dx dy = 0 \end{aligned}$$



حال فرض می‌کنیم که مبدأً داخل C است. اگر بخواهیم از قضیه‌ی گرین استفاده کنیم باید ناحیه‌ای که در آن مبدأ وجود دارد را جدا کنیم. پس $\varepsilon > 0$ موجود است که

$$B_\varepsilon(0) = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq \varepsilon^2\} \subseteq R$$

$$C_\varepsilon : \gamma(t) = (\varepsilon \cos t, \varepsilon \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi.$$

$$\int_C F \cdot dr - \int_{C_\varepsilon} F \cdot dr = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0.$$

که D مساحت بین دو منحنی C و C_ε است و انتگرال دوگانه بالا، روی D برابر با صفر است.

$$\begin{aligned} \Rightarrow \int_C F \cdot dr &= \int_{C_\varepsilon} F \cdot dr = \int_0^{2\pi} \left[\frac{-\varepsilon \sin t}{\varepsilon^2} (-\varepsilon \sin t dt) + \frac{\varepsilon \cos t}{\varepsilon^2} (\varepsilon \cos t dt) \right] \\ &= \int_0^{2\pi} dt = 2\pi. \end{aligned}$$



سوال ۸

(پایانترم ۹۷ - ۹۶) اگر $F = (y + z \cos(xz), x, x \cos(xz))$ باشد، مقدار انتگرال $\int_C F \cdot dr$ را محاسبه کنید که در آن C خم پارامتری زیر است:

$$\gamma(t) = \left(e^{\cos(\pi t^2)}, e^{\cos(\pi t) + \sin(\pi t)}, \cos(\pi t) \right), \quad 0 \leq t \leq 1$$



$$\begin{aligned}\nabla \times F &= \left(\frac{\partial F_3}{\partial y} - \frac{\partial F_2}{\partial z} \right) \hat{i} + \left(\frac{\partial F_1}{\partial z} - \frac{\partial F_3}{\partial x} \right) \hat{j} + \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) \hat{k} \\ &= (0 - 0) \hat{i} + (\cos xz - xz \sin xz - \cos xz + xz \sin xz) \hat{j} + (1 - 1) \hat{k} \\ &= 0\end{aligned}$$

پس میدان F پایستار است و داریم:

$$\int_C F \cdot dr = \int \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt$$



پاسخ سوال ۸

در اصل تابع f تابع پتانسیل F است. حال f را به دست می آوریم:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y + z \cos xz \Rightarrow f(x, y, z) = xy + \sin xz + g(y, z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x \Rightarrow x + \frac{\partial g}{\partial y} = x \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = x \cos xz \Rightarrow x \cos xz + \frac{\partial g}{\partial z} = x \cos xz \Rightarrow \frac{\partial g}{\partial z} = 0$$

$$f(x, y, z) = xy + \sin xz$$

$$\gamma(1) = (e^{-1}, e^{-1}, -1) \quad \gamma(0) = (e, e, 1)$$

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot dr &= \int_{t=0}^{t=1} \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) dt = f(\gamma(1)) - f(\gamma(0)) \\ &= e^{\cos \pi} \cdot e^{\cos \pi} + \sin(-1 \cdot e^{\cos \pi}) - (e^2 + \sin e) \\ &= \boxed{e^{-2} - \sin e^{-1} - e^2 - \sin e} \end{aligned}$$



سوال ۹

(آدامز بخش ۳ - ۱۶ سوال ۵) با استفاده از انتگرال خم، مساحت محصور به خم زیر را بیابید.

$$r = a \cos^3 t \vec{i} + b \sin^3 t \vec{j}, 0 \leq t \leq 2\pi$$



اگر D ناحیه‌ی محصورشده‌ای به وسیله‌ی خم C باشد و شرایط قضیه‌ی گرین برقرار باشد،
آن‌گاه داریم:

$$\int_C F \cdot dr = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

حال F را به صورت زیر در نظر گرفته تا از قضیه‌ی گرین استفاده کنیم:

$$F = -y\vec{i} + x\vec{j}$$

$$\int_C F \cdot dr = \iint_D \left(\frac{\partial x}{\partial x} - \frac{\partial(-y)}{\partial y} \right) dx dy = 2 \iint_D dx dy$$



$$\begin{aligned}
 \Rightarrow \iint_D dx dy &= \frac{1}{2} \int_C F \cdot dr = \frac{1}{2} \oint_C (-y, x) \cdot (dx, dy) = \frac{1}{2} \oint_C -y dx + x dy \\
 &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (-(b \sin^3 t)(-3a \cos^2 t)(\sin t) + (a \cos^3 t)(3b \sin^2 t)(\cos t)) dt \\
 &= \frac{3ab}{2} \int_0^{2\pi} \sin^2 t \cos^2 t dt = \frac{3ab}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt \\
 &= \frac{3ab}{8} \int_0^{2\pi} \left(\frac{1 - \cos 4t}{2} \right) dt \\
 &= \frac{3ab}{8} \left(\frac{t}{2} \Big|_0^{2\pi} \right) = \boxed{\frac{3ab\pi}{8}}
 \end{aligned}$$



هم چنین دقت شود که انتگرال‌های $\sin kt$ و $\cos kt$ از 0 تا 2π ، که k عددی صحیح است، صفر هستند.

(پایانترم ۹۸ - ۹۷)

الف) فرض کنید C خم $r(t) = (1-t)e^t \vec{i} + t\vec{j} + 2t\vec{k}$ باشد که در آن $0 \leq t \leq 1$. انتگرال زیر را محاسبه کنید:

$$\int_C (1+x)e^{x+y} dx + (xe^{x+y} + 2y) dy - 2z dz$$

ب) مطلوبست محاسبه $\oint_C x^2 y dx - xy^2 dy$ که در آن منحنی C متشکل از نیم دایره بالایی $x^2 + y^2 = 9$ و پاره خط واصل بین $(-3, 0)$ و $(3, 0)$ است که در جهت مثلثاتی پیموده می شود.



$$\nabla \times F = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ F_1 & F_2 & F_3 \end{vmatrix}$$

$$= (\circ - \circ)\vec{i} - (\circ - \circ)\vec{j} + (e^{x+y} + xe^{x+y} - (1+x)e^{x+y})\vec{k} = \circ$$

پس F پایستار است. حال تابع پتانسیل F که f باشد را به دست می آوریم:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = (1+x)e^{x+y} \implies f(x, y, z) = \int (1+x)e^{x+y} dx + g(y, z)$$

$$= e^y \int (1+x)e^x dx + g(y, z)$$

$$= e^y (e^x(1+x) - e^x) + g(y, z)$$

$$= xe^{x+y} + g(y, z)$$



که در این جا از روش انتگرال گیری جزء به جزء، به صورت زیر استفاده کرده ایم:

$$\begin{cases} u = 1 + x \\ dv = e^x dx \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = e^x \end{cases}$$

اکنون داریم


$$\frac{\partial f}{\partial y} = xe^{x+y} + 2y \Rightarrow xe^{x+y} + \frac{\partial g}{\partial y} = xe^{x+y} + 2y \Rightarrow g(y, z) = y^2 + h(z)$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = -2z \Rightarrow h'(z) = -2z \Rightarrow h(z) = -z^2$$

$$f(x, y, z) = xe^{x+y} + y^2 - z^2 + c$$



$$\begin{aligned}
 \int_C F \cdot dr &= \int \nabla f(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t) \cdot dt \\
 &= f(\gamma(1)) - f(\gamma(0)) = f((0, 1, 2)) - f((1, 0, 0)) \\
 &= 1 - 4 - e = -3 - e
 \end{aligned}$$



شکل:



حل ب:
شرایط قضیه‌ی گرین برقرار است، لذا داریم:

$$\begin{aligned}\oint_C F \cdot dr &= \iint_D \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy \quad dx dy = r dr d\theta \\ &= \iint_D (-y^2 - x^2) dx dy = \int_0^\pi \int_0^3 -r^2 r dr d\theta \\ &= - \int_0^\pi \int_0^3 r^3 dr d\theta = \left. \frac{-r^4}{4} \right|_0^3 \times \theta \Big|_0^\pi = \boxed{\frac{-81\pi}{4}}\end{aligned}$$



سوال ۱۱

(پایانترم ۹۶ - ۹۵) میدان برداری $F = (x - y^3, y^3 + x^3)$ را در نظر بگیرید. فرض کنید D ناحیه محدود به $x^2 + y^2 \leq a^2$ و $x \geq 0, y \geq 0$ و C مرز ناحیه D باشد و بطور مثبت جهت دهی شده است. انتگرال $\int_C F \cdot dr$ را با استفاده از

الف) قضیه گرین
ب) بطور مستقیم محاسبه کنید.




حل (الف) طبق قضیه گرین داریم

$$\begin{aligned}\int_C F \cdot dr &= \iint \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy = \iint (3x^2 + 3y^2) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \int_0^a 3r^2 dr d\theta = \frac{3\pi}{8} a^4.\end{aligned}$$



(ب) مسیره‌های زیر را جداگانه بررسی میکنیم



$$C_1 : r(t) = (0, a - t) \quad 0 \leq t \leq a,$$

$$\begin{aligned} \int_{C_1} F \cdot dr &= \int F(r(t)) \cdot r'(t) dt = \int_0^a (-(a - t)^2, (a - t)^2) \cdot (0, -1) dt \\ &= \int_0^a -(a - t)^2 dt = -\frac{a^3}{3}. \end{aligned}$$

$$C_2 : r(t) = (t, 0) \quad 0 \leq t \leq a,$$

$$\int_{C_2} F \cdot dr = \int F(r(t)) \cdot r'(t) dt = \int_0^a (t, t^2) \cdot (1, 0) dt = \int_0^a t dt = \frac{a^2}{2}.$$



$$C_{\gamma} : r(t) = (a \cos t, a \sin t) \quad 0 \leq t \leq \frac{\pi}{2},$$

$$\begin{aligned} \int_{C_{\gamma}} F \cdot dr &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} F(r(t)) \cdot r'(t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \cos t - a^2 \sin^2 t, a^2 \sin^2 t + a^2 \cos^2 t) \cdot (-a \sin t, a \cos t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (-a^2 \sin t \cos t + a^2 \sin^4 t + a^2 \cos^4 t + a^2 \sin^2 t \cos t) dt \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} -a^2 \sin t \cos t dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 (\sin^4 t + \cos^4 t) dt + \int_0^{\frac{\pi}{2}} a^2 \sin^2 t \cos t dt \\ &= -\frac{a^2}{2} + \frac{3\pi}{8} a^2 + \frac{a^2}{4} \end{aligned}$$



$$\int_C F.dr = \int_{C_1} F.dr + \int_{C_2} F.dr + \int_{C_3} F.dr = \frac{3\pi}{8} a^4.$$

$$u = \sin t \rightarrow du = \cos t dt \rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin t \cos t dt = \int_0^1 u du = \frac{1}{2}.$$

$$u = \sin t \rightarrow du = \cos t dt \rightarrow \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^3 t \cos t dt = \int_0^1 u^3 du = \frac{1}{4}.$$

$$\sin^2 t = \frac{1 - \cos 2t}{2}, \quad \cos^2 t = \frac{1 + \cos 2t}{2},$$

$$\sin^4 t = (\sin^2 t)^2 = \left(\frac{1 - \cos 2t}{2} \right)^2 = \frac{1 - 2\cos 2t + \cos^2 2t}{4}$$

$$= \frac{1 - 2\cos 2t + \left(\frac{1 + \cos 4t}{2} \right)}{4} = \frac{3 - 4\cos 2t + \cos 4t}{8}.$$




$$\begin{aligned}\cos^{\frac{3}{2}} t &= (\cos^{\frac{1}{2}} t)^{\frac{3}{2}} = \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right)^{\frac{3}{2}} = \frac{1 + 2 \cos 2t + \cos^2 2t}{4} \\ &= \frac{1 + 2 \cos 2t + \left(\frac{1 + \cos 4t}{2} \right)}{4} = \frac{3 + 4 \cos 2t + \cos 4t}{8}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} t + \cos^{\frac{3}{2}} t &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{3 + \cos 4t}{4} dt = \frac{3}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt + \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos 4t dt \\ &= \frac{3}{4} \pi + \frac{1}{16} (\sin 2\pi - \sin 0) = \frac{3}{4} \pi.\end{aligned}$$



در صورتی که C مرز ناحیه بین دو نیم دایره به شعاع های a و b و آن بخشی روی محور x است که این دو مرز را به هم متصل کند و بطور مثبت جهت دهی شده و مطابق شکل زیر باشد.



حاصل انتگرال زیر را بدست آورید

$$\oint_C (4x + \sin(x))dx + (e^{\cos(y)} + 3x^2)dy.$$



چون خم C قطعه قطعه هموار، ناحیه داخل آن بسته و میدان برداری $F = (x + \sin(x), +e^{\cos(y)} + x^2)$ هموار است، لذا بنابه قضیه گرین داریم

$$\begin{aligned}\oint_C F \cdot dr &= \iint \left(\frac{\partial F_2}{\partial x} - \frac{\partial F_1}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \iint_R (x) dA \\ &= \int_0^\pi \int_a^b x r^2 \cos \theta dr d\theta \\ &= x \int_0^\pi \cos \theta d\theta \int_a^b r^2 dr \\ &= 0\end{aligned}$$



سوال ۱۳


(آدامز بخش ۴ - ۱۶ سوالات ۸، ۴) با استفاده از قضیه دیورژانس، شار میدان برداری
 الف) $F = (x^3, 3yz^2, 3y^2z + x^2)$ را در خروج از کره S به معادله
 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ که در آن $a > 0$ ، محاسبه کنید.
 ب) $F = (x^2, y^2, z^2)$ را در خروج از مرز ناحیه محصور به استوانه $x^2 + y^2 \leq 2y$ و
 $0 \leq z \leq 4$ محاسبه کنید.



پاسخ سوال ۱۳

(الف) داریم $\text{div} F = 3x^2 + 3z^2 + 3y^2$ فرض کنیم D گویی به مرکز مبدا و شعاع a باشد، سپس بنابه قضیه دیورژانس شار میدان برداری را محاسبه میکنیم:

$$\begin{aligned} \oiint_S F \cdot \hat{N} dS &= \iiint_D \text{div} F dV = 3 \iiint_D (x^2 + y^2 + z^2) dV \\ &= 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \Phi \int_0^a \rho^4 d\rho = \frac{12}{5} \pi a^5. \end{aligned}$$



(ب) داریم $\text{div} F = 2x + 2y + 2z$ ، فرض کنیم D ناحیه داخل استوانه باشد، حال با قضیه دیورژانس شار میدان برداری را محاسبه میکنیم

$$\begin{aligned} \oint_S F \cdot \hat{n} dS &= \iiint_D \text{div} F dV = 2 \iiint_D (x + y + z) dV \\ &= 2 \iiint_D x dV + 2 \iiint_D y dV + 2 \iiint_D z dV, \end{aligned}$$

چون ناحیه D نسبت به x متقارن است و x تابعی فرد است پس

$$\iiint_D x dV = 0$$



و

$$\begin{aligned}
 \iiint_D y dV &= \int_0^4 \int_0^\pi \int_0^{2 \sin \theta} r^2 \sin \theta dr d\theta dz \\
 &= \int_0^4 \int_0^\pi \sin \theta \frac{(2 \sin \theta)^3}{3} d\theta dz \\
 &= \frac{8}{3} \int_0^4 dz \int_0^\pi \sin^4 \theta d\theta \\
 &= \frac{8}{3} \int_0^4 dz \int_0^\pi \frac{3 - 4 \cos 2\theta + \cos 4\theta}{8} d\theta \\
 &= 4\pi.
 \end{aligned}$$



و از طرف دیگر

$$\iiint_D z dV = \int_0^4 z dz \iint_R dA = \left(\frac{z^2}{2}\right)\Big|_0^4 \pi = 8\pi,$$

که R دایره $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ هست. در نتیجه

$$\oiint_S F \cdot \hat{N} dS = 24\pi.$$

یادآوری: مختصات استوانه ای

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$



سوال ۱۴

(آدامز بخش ۴ - ۱۶ سوال ۱۳) فرض کنیم D حجم محصور به $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4a^2$ و $x^2 + y^2 \geq a^2$ باشد. مرز D ، یعنی S ، از یک قسمت استوانه ای به نام S_1 و یک قسمت کروی به نام S_2 تشکیل شده است. شار $F = (x + yz, y - xz, z - e^x \sin y)$ را در خروج از D و عبور از رویه های زیر محاسبه کنید.

الف) کل رویه S ب) رویه S_1 ج) رویه S_2



حل (الف): $\text{div} F = 1 + 1 + 1 = 3$. شرایط قضیه دیورژانس برقرار است. لذا داریم:

$$\begin{aligned} \oiint_S F \cdot N dS &= \iiint_D \text{div} F dV = 3 \int_0^{2\pi} \int_a^{2a} \int_{-\sqrt{4a^2-r^2}}^{\sqrt{4a^2-r^2}} r dz dr d\theta \\ &= 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_a^{2a} r \sqrt{4a^2-r^2} dr = 12\sqrt{3}\pi a^3. \end{aligned}$$

(ب) در ابتدا فصل مشترک S_1 و S_2 را پیدا می کنیم. در مختصات استوانه ای داریم

$$x^2 + y^2 = r^2, \quad x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta, \quad z = z$$

لذا معادله استوانه $x^2 + y^2 = a^2$ و کره $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ در مختصات استوانه ای به ترتیب به فرم $r = a$ و $r^2 + z^2 = 4a^2$ می شود. اگر $\alpha = (r, \theta, z)$ یک نقطه بر فصل مشترک S_1 و S_2 باشد آنگاه $\alpha = (a, \theta, \pm\sqrt{3}a)$.



فرض کنیم

$$f(\theta, z) = (a \cos \theta, a \sin \theta, z).$$

ناحیه $T = \{(\theta, z); 0 \leq \theta \leq 2\pi, -\sqrt{3}a \leq z \leq \sqrt{3}a\} \subset \mathbb{R}^2$ را در نظر گرفته، واضح است که

$$S_1 = \{f(\theta, z); (\theta, z) \in T\}.$$

حال المان سطح S_1 را حساب میکنیم.

$$f_\theta = (-a \sin \theta, a \cos \theta, 0), \quad f_z = (0, 0, 1)$$

$$f_\theta \times f_z = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -a \sin \theta & a \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = a \cos \theta i + a \sin \theta j$$

$$|f_\theta \times f_z| = a,$$


$$dS = |f_\theta \times f_z| d\theta dz = a d\theta dz, \quad N_1 = -\frac{f_\theta \times f_z}{|f_\theta \times f_z|} = \frac{-1}{a}(x, y, 0).$$



پاسخ سوال ۱۴

(شار خروجی از سطح مورد نظر که محدود به کره و استوانه هست را محاسبه میکنیم. لذا بردار عمود و به سمت خارج به این سطح از طرف چپ به سمت داخل استوانه است.)

$$\begin{aligned}\iint_{S_1} F \cdot \mathbf{N}_1 dS &= \iint_T \frac{-x^2 - xyz - y^2 + xyz}{a} a d\theta dz \\ &= -a^2 \int_0^{2\pi} d\theta \int_{-\sqrt{3}a}^{\sqrt{3}a} dz = -4\sqrt{3}\pi a^3.\end{aligned}$$



(ج) حال شار خروجی از بخش کروی یعنی S_2 به صورت زیر است

$$\begin{aligned}\iint_{S_2} F.N dS &= \iint_S F.N dS - \iint_{S_1} F.N_1 dS \\ &= 12\sqrt{3}\pi a^3 + 4\sqrt{3}\pi a^3 \\ &= 16\sqrt{3}\pi a^3.\end{aligned}$$



(آدامز بخش ۵ - ۱۶ سوال ۴) انتگرال $\iint_S (\text{curl} F) \cdot N \, dS$ را محاسبه کنید که در آن S قسمتی از رویه $x^2 + y^2 + 2(z - 1)^2 = 6$ است که بالای صفحه xy قرار دارد و N قائم یکه بر S و به سمت خارج S است و

$$F = (xz - y^3 \cos z, x^3 e^z, xyze^{x^2+y^2+z^2})$$



بیضیگون $6 = x^2 + y^2 + 2(z - 1)^2$ را در نظر میگیریم. رویه S بخشی از بیضیگون D است که بالای صفحه $z = 0$ قرار دارد. فرض کنیم C خم حاصل از فصل مشترک بیضیگون D و صفحه $z = 0$ باشد. واضح است که خم C مرز رویه S هست.

$$z = 0 \Rightarrow x^2 + y^2 + 2 = 6 \Rightarrow C : \begin{cases} x^2 + y^2 = 4, \\ z = 0. \end{cases}$$

واضح است که رویه S جهت دار است و خم C که یک دایره است هموار است. از طرفی میدان برداری F نیز به وضوح هموار است. لذا شرایط قضیه استوکس برقرار است و داریم:

$$\iint_S (\text{curl} F) \cdot N \, dS = \oint_C F \cdot dr$$




از طرفی خم C مرز قرص T به مرکز مبدا و شعاع ۲ در صفحه $z = 0$ نیز هست.

$$T : \begin{cases} x^2 + y^2 \leq 4, \\ z = 0. \end{cases}$$

که T سطحی جهت پذیر و ساده تر از S هست زیرا میدان برداری قائم آن N_T ثابت $k = (0, 0, 1)$ است. حال با استفاده دوباره از قضیه استوکس داریم:

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_T (\text{curl} F) \cdot k \, dA$$





قرار دهید

$$F = \left(xz - y^3 \cos z, x^3 e^z, xyze^{x^2+y^2+z^2} \right) = (P, Q, R)$$

سپس

$$\text{curl} F = \left(h, g, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = (h, g, 3x^2 e^z + 3y^2 \cos z.)$$

بر سطح T داریم:

$$\text{curl} F \cdot k = (3x^2 e^z)|_{z=0} + (3y^2 \cos z)|_{z=0} = 3(x^2 + y^2)$$

$$\oint_C F \cdot dr = \iint_T 3(x^2 + y^2) dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 3r^2 r dr d\theta = 24\pi.$$



سوال ۱۶

(پایانترم ۹۶ - ۹۵) فرض کنید

$$f(x, y, z) = a_1 x^4 + a_2 y^4 + a_3 z^4 + 3a_4 x^2 y^2 + 3a_5 y^2 z^2 + 3a_6 x^2 z^2$$

$\rho = 1$ است. اگر N بردار قائم یکه روبه بیرون بر S باشد. در اینصورت

الف) میدان برداری $F(x, y, z)$ را چنان بیابید که داشته باشیم $F \cdot N = f(x, y, z)$.

ب) با استفاده از قضیه دیورژانس نشان دهید:

$$\int \int_S f \, dS = \frac{4\pi}{5} \sum_{i=1}^6 a_i$$



الف) برای کره $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ داریم: $N = (x, y, z)$
اگر فرض کنیم

$$F = (a_1x^3 + 3a_4xy^2, a_2y^3 + 3a_5yz^2, a_3z^3 + 3a_6zx^2)$$

داریم

$$F \cdot N = f(x, y, z)$$



(ب)

$$\begin{aligned}\iint_S f dS &= \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{N} dS = \iiint_V \operatorname{div} \mathbf{F} dV \\ &= \iiint_V (3(a_1 + a_6)x^2 + 3(a_4 + a_2)y^2 + 3(a_3 + a_5)z^2) dV\end{aligned}$$

با توجه به تقارن نسبت به x و y و z داریم:

$$\begin{aligned}\iiint_V x^2 dV &= \iiint_V y^2 dV = \iiint_V z^2 dV \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \int_0^1 \rho^2 \cos^2(\varphi) \rho^2 \sin(\varphi) d\rho d\varphi d\theta \\ &= 2\pi \left(\int_0^1 \rho^4 d\rho \right) \left(\int_0^\pi \cos^2(\varphi) \sin(\varphi) d\varphi \right) \\ &= 2\pi \times \frac{1}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{4\pi}{15}\end{aligned}$$



بنابراین داریم:

$$\begin{aligned} \int \int_S f dS &= (3(a_1 + a_6) \int \int \int_V x^2 dV + \\ &+ 3(a_4 + a_2) \int \int \int_V y^2 dV + 3(a_3 + a_5) \int \int \int_V z^2 dV \\ &= \frac{4\pi}{5} (a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 + a_6) \end{aligned}$$



(آدامز بخش ۵ - ۱۶ سوال ۸) فرض کنید $F = ye^x \vec{i} + (x^2 + e^x) \vec{j} + z^2 e^z \vec{k}$

مطلوبست محاسبه $\oint_C F \cdot d\vec{r}$ که C خم

$$r(t) = (1 + \cos t) \vec{i} + (1 + \sin t) \vec{j} + (1 - \cos t - \sin t) \vec{k}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$


است. راهنمایی: قضیه استوکس را بکار ببرید و توجه داشته باشید که C بر صفحه معینی قرار دارد و تصویر آن بر صفحه xy یک دایره است.



حل: از اینکه $r(0) = r(2\pi)$ یک منحنی بسته است، و همچنین از

$x(t) + y(t) + z(t) = 3$ نتیجه می‌شود که خم C روی صفحه

$x(t) + y(t) + z(t) = 3$ قرار دارد. با توجه به این که $0 \leq t \leq 2\pi$ است می‌توان دید که منحنی در جهت مثلثاتی پیموده می‌شود.



D : تصویر S در صفحه xy

تغییر متغیر: $x = u$ و $y = v$

$$D^+ : u^2 + v^2 \leq 1$$



$$x(t) + y(t) + z(t) = 3 \Rightarrow f(x, y, z) = x + y + z - 3 = 0$$

$$ds = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy = \sqrt{3} dxdy$$

$$n = \frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$$

$$\text{curl} F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \partial/\partial x & \partial/\partial y & \partial/\partial z \\ ye^x & x^2 + e^x & z^2 e^z \end{vmatrix} = (0, 0, 2x + e^x - e^x) = (0, 0, 2x)$$

$$\text{curl} F \cdot n = \frac{2x}{\sqrt{3}}$$



$$\begin{aligned}
 \oint_C F \cdot dr &= \int \int_S \text{curl} F \cdot n ds = \int \int_D \frac{2x}{\sqrt{3}} (\sqrt{3} dx dy) \\
 &= \int \int_D 2x dx dy = \int \int_{D^+} 2(u+1) du dv \\
 &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 2(r^2 \cos \theta + r) dr d\theta = 2\pi
 \end{aligned}$$



(پایانترم ۹۸ - ۹۷)

الف) $\int \int_S (\text{curl} F) \cdot N \, dS$ را محاسبه کنید که در آن S قسمتی از رویه

$x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 17$ است که بالای صفحه xy قرار دارد و N قائم یک بر S و به سمت خارج S است و $F = (x^2 - y^2, y^2 - z^2, z^2 - x^2)$.

ب) فرض کنید D ناحیه خارج استوانه $x^2 + y^2 = a^2$ و داخل کره

$x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ باشد و S مرز ناحیه D باشد. مطلوبست $\int \int_S F \cdot N \, dS$ که در آن

$$F = (x + yz, y - xz, z - e^x \sin y)$$

و N قائم یک بر S و روبه خارج S است.



حل: الف) با دو بار استفاده از قضیه‌ی استوکس، داریم:

$$\int \int_S \text{curl} F \cdot N dS = \int_C F \cdot dr = \int \int_D \text{curl} F \cdot N dS$$

S رویه داده شده، C مرز S و D رویه $x^2 + y^2 \leq 1$ می‌باشند.
 N روی D برابر است با $(0, 0, 1)$.

$$\text{curl} F = (2z, 2x, 2y)$$

محاسبه انتگرال:

$$\int \int_{x^2+y^2 \leq 1} 2y dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^1 2r^2 \sin \theta dr d\theta = 0$$



پاسخ سوال ۱۸

ب) فرض کنید D ناحیه خارج استوانه $x^2 + y^2 = a^2$ و داخل کره $x^2 + y^2 + z^2 = 4a^2$ باشد و S مرز ناحیه D باشد. مطلوبست $\int_S F \cdot NdS$ که در آن

$$F = (x + yz, y - xz, z - e^x \sin y)$$

و N قائم یکه بر S و روبه خارج S است.

$$\operatorname{div} F = 3$$

$$\begin{aligned} \int \int_S F \cdot NdS &= \int \int \int_D \operatorname{div} F dV = 3 \int \int \int_D dV \\ &= 3 \int_a^{2a} r \int_0^{2\pi} \int_{-\sqrt{4a^2-r^2}}^{\sqrt{4a^2-r^2}} dz d\theta dr \\ &= -4\pi(4a^2 - r^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_a^{2a} \\ &= 4\pi(3a^2)^{\frac{3}{2}} \end{aligned}$$



(پایانترم ۹۷ - ۹۶) فرض کنید $F = (x^2 + y + 2 + z^2, e^{x^2} + y^2, 3 + x)$ اگر $a > 0$ و S آن قسمت از رویه کروی $x^2 + y^2 + z^2 = 2az + 3a^2$ باشد که بالای صفحه xy قرار دارد و اگر N قائم یکه رو به بالا بر S ، (روبه خارج کره شامل S) باشد، شار میدان برداری F را که از S در جهت N می گذرد حساب کنید.



حل: سطح S قسمتی از کره $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = 4a^2$ است که بالای صفحه xy قرار دارد. برای استفاده از قضیه دیورژانس سطح S_1 ، قسمتی از صفحه $z = 0$ که به کره محدود شده است، را اضافه می‌کنیم. از طرفی برای استفاده از قضیه دیورژانس قائم یکه باید رو به خارج سطح بسته‌ی مورد نظر باشد. بردار N روی S که طبق فرض این گونه است. بنابراین بردار N_1 را روی سطح S_1 رو به پایین می‌گیریم، در واقع داریم: $N_1 = -k$ به علاوه ناحیه مشخص شده توسط S_1 عبارت است از تمام نقاط صفحه‌ی xy در \mathcal{R}^2 که $x^2 + y^2 \leq 3a^2$ (در واقع قرار می‌دهیم $z = 0$ و از رابطه $x^2 + y^2 + (z - a)^2 = 4a^2$ استفاده می‌کنیم).
حال برای میدان برداری F روی ناحیه D (محدود شده به سطح $S \cup S_1$) از قضیه دیورژانس استفاده می‌کنیم:

$$\int \int_S F \cdot N ds + \int \int_{S_1} F \cdot N ds = \int \int \int_D \operatorname{div}(F) dV$$



داریم:

$$F = (x^2 + y + 2 + z^2, e^{x^2} + y^2, 3 + x) = (F_1, F_2, F_3)$$

$$\Rightarrow \operatorname{div}(F) = \frac{\partial F_1}{\partial x} + \frac{\partial F_2}{\partial y} + \frac{\partial F_3}{\partial z} = 2x + 2y$$

$$\begin{aligned} \int \int \int_D \operatorname{div}(F) dV &= \int \int \int_D (2x + 2y) dV \\ &= 2 \int \int \int_D x dV + \int \int \int_D y dV = 0 \end{aligned}$$

زیرا هر دو انتگرال هایی از توابع فرد روی دامنه متقارن هستند.



$$\begin{aligned}
\int \int_S F \cdot N ds &= - \int \int_{S_1} F \cdot N ds \\
&= - \int \int_{x^2+y^2 \leq 3a^2} F \cdot (-k) ds \\
&= \int \int_{x^2+y^2 \leq 3a^2} (3 + x) dx dy \\
&= 3 \int \int_{x^2+y^2 \leq 3a^2} dx dy + \int \int_{x^2+y^2 \leq 3a^2} x dx dy \\
&= 3(3\pi a^2) = 9\pi a^2
\end{aligned}$$

زیرا انتگرال اول سه برابر مساحت دایره $x^2 + y^2 = 3a^2$ و دومی انتگرال یک تابع فرد روی دامنه متقارن است.



(آدامز بخش ۵ - ۱۶ سوال ۵) با استفاده از قضیه استوکس نشان دهید

$$\oint_C ydx + zdy + xdz = \sqrt{3}\pi a^2$$

که در آن C خم فصل مشترک رویه های $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ و $x + y + z = 0$ جهت دهی مناسب است.



S را قسمتی از صفحه $x + y + z = 0$ در نظر می‌گیریم که به منحنی فصل مشترک محدود شده است. با فرض اینکه معادله این رویه را g بنامیم می‌توان قائم یکه بر S را $\vec{n} = -\frac{\vec{\nabla}g}{|\vec{\nabla}g|} = -\frac{(1, 1, 1)}{\sqrt{3}}$ در نظر گرفت. (توجه داشته باشید بردار مثبت هم میتوان در نظر گرفت اما با انتخاب جهت مثبت برای خم و انتخاب بردار مثبت تساوی آخر منفی خواهد شد.) اگر از معادله صفحه z را بیاییم و در معادله کره قرار دهیم، تصویر محل تلاقی در صفحه xy به معادله $x^2 + y^2 + xy = a^2/2$ است.

$$dS = \frac{|\vec{\nabla}g|}{|g_z|} dx dy = \sqrt{3} dx dy$$



$$F = (y, z, x) \Rightarrow \text{Curl}(F) = \nabla \times F = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = (-1, -1, -1)$$

$$\oint_C F \cdot dr = \int \int_S \text{curl}(F) \cdot n ds = \frac{3}{\sqrt{3}} \int \int_S ds = 3 \int \int_{x^2+y^2+xy \leq a^2/2} dx dy$$

تغییر متغیر زیر را در نظر می‌گیریم:

$$x = \frac{\sqrt{2}}{2}(u-v), y = \frac{\sqrt{2}}{2}(u+v) \Rightarrow \frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \end{vmatrix}$$

با این تغییر متغیر محل تلاقی بیضی ۱ $\frac{v^2}{a^2/3} + \frac{u^2}{a^2} = 1$ است. بنابراین

$$\oint_C F \cdot dr = 3 \int \int_{\frac{v^2}{a^2/3} + \frac{u^2}{a^2} \leq 1} dudv = 3\pi \left(\frac{a}{\sqrt{3}} \right) = \sqrt{3}\pi a^2$$

نکته: مساحت بیضی به معادله $\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 = 1$ برابر πab است.



متشکر از توجه شما

