MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES DE ENTEROS CORRECTAS

$(-12) \times (-5) = 60$	$(-13) \times (-3) = 39$	$(-90) \div (-15) = 6$
$(-6) \times 4 = -24$	$(-144) \div (-12) = 12$	$(-72) \div (-9) = 8$
$48 \div (-6) = -8$	$84 \div (-7) = -12$	$25 \times (-4) = -100$
$(-11) \times 6 = -66$	$(-96) \div 8 = -12$	$(-56) \div 7 = -8$
$9 \times (-3) = -27$	$(-7) \times (-8) = 56$	$15 \times (-4) = -60$

Adaptación a 1.º ESO del juego original de Victoria Cañada Carrasco (@_educarte_)

MULTIPLICACIONES Y DIVISIONES DE ENTEROS INCORRECTAS

$(-9) \times (-9) = -18$	$(-14) \times (-3) = -42$	$(-7) \times (-7) = -49$
$(-54) \div (-6) = -9$	$4 \times (-9) = 36$	$64 \div (-8) = -7$
$(-8) \times (-6) = -48$	$(-63) \div 9 = 7$	$(-81) \div (-9) = -9$
$(-75) \div (-15) = -5$	$(-5) \times 7 = 35$	$(-16) \times 5 = -90$
$42 \div (-7) = 6$	$12 \times (-6) = 72$	$32 \times (-3) = -86$

Adaptación a 1.º ESO del juego original de Victoria Cañada Carrasco (@_educarte_)

DIVISIBILIDAD, M.C.D. Y M.C.M. CORRECTAS

$90 = 2 \cdot 3^2 \cdot 5$	234 es divisible por 3	m.c.d.(12, 18) = 6
31 es un número primo	847 es divisible por 11	$150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$
m.c.d.(24, 36) = 12	m.c.m.(6, 9) = 18	$72 = 2^3 \cdot 3^2$
m.c.d.(45, 60) = 15	m.c.m.(8, 12) = 24	m.c.m.(10, 15) = 30
m.c.d.(28, 42) = 14	m.c.m.(4, 6) = 12	1.350 es divisible por 5

Adaptación a 1.º ESO del juego original de Victoria Cañada Carrasco (@_educarte_)

DIVISIBILIDAD, M.C.D. Y M.C.M. INCORRECTAS

m.c.d.(20, 50) = 100	$180 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$	m.c.d.(30, 45) = 5
91 es un número primo	m.c.d.(16, 24) = 4	m.c.m.(15, 20) = 300
$120 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5$	m.c.m.(9, 12) = 3	412 es divisible por 3
$84 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 7$	1.254 es divisible por 5	738 es divisible por 4
m.c.d.(18, 27) = 3	m.c.m.(6, 8) = 48	m.c.m.(14, 21) = 294

Adaptación a 1.º ESO del juego original de Victoria Cañada Carrasco (@_educarte_)

OPERACIONES CON FRACCIONES CORRECTAS

$-\frac{1}{2} + \frac{3}{4} = \frac{1}{4}$	$\frac{4}{5} \div 2 = \frac{2}{5}$	$\frac{5}{9} \div \frac{5}{3} = \frac{1}{3}$
$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{5}{6}$	$\frac{5}{6} - \frac{1}{3} = \frac{1}{2}$	$\frac{3}{4} + \frac{1}{6} = \frac{11}{12}$
$\frac{3}{4} \times \frac{2}{7} = \frac{3}{14}$	$3 \times \frac{2}{7} = \frac{6}{7}$	$\frac{2}{5} \div \frac{4}{3} = \frac{3}{10}$
$\frac{2}{3} - \frac{1}{5} = \frac{7}{15}$	$\frac{7}{8} - \frac{1}{4} = \frac{5}{8}$	$\frac{2}{3} \times \frac{3}{5} = \frac{2}{5}$
$\frac{5}{6} \times \frac{3}{10} = \frac{1}{4}$	$\frac{1}{2} \div \frac{3}{4} = \frac{2}{3}$	$\frac{2}{5} + \frac{1}{4} = \frac{13}{20}$

Adaptación a 1.º ESO del juego original de Victoria Cañada Carrasco (@_educarte_)

OPERACIONES CON FRACCIONES INCORRECTAS

$\frac{3}{7} \times \frac{2}{5} = \frac{15}{14}$	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2} = \frac{2}{2}$	$\frac{4}{5} - \frac{1}{3} = \frac{3}{2}$
$\frac{1}{3} \div \frac{2}{5} = \frac{2}{15}$	$\frac{5}{6} - \frac{1}{2} = \frac{4}{4}$	$\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{2}{7}$
$2 \times \frac{3}{5} = \frac{6}{10}$	$\frac{2}{5} \times \frac{5}{6} = \frac{7}{11}$	$-\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$
$\frac{3}{4} \div 3 = \frac{9}{4}$	$\frac{5}{8} \div \frac{1}{2} = \frac{5}{16}$	$\frac{2}{3} \times \frac{4}{5} = \frac{6}{8}$
$\frac{3}{5} + \frac{1}{2} = \frac{4}{7}$	$\frac{3}{4} \div \frac{2}{3} = \frac{6}{12}$	$\frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{3}{8}$

Adaptación a 1.º ESO del juego original de Victoria Cañada Carrasco (@_educarte_)

ECUACIONES DE PRIMER GRADO CORRECTAS

$5x - 2 = 18$ $x = 4$	$3x = 21$ $x = 7$	$2(x + 1) = 10$ $x = 4$
$x + 9 = 2$ $x = -7$	$3x + 5 = x + 11$ $x = 3$	$2x + 3 = 11$ $x = 4$
$x + 7 = 12$ $x = 5$	$6x - 4 = 2x + 8$ $x = 3$	$-2x = 14$ $x = -7$
$10 - 3x = 1$ $x = 3$	$\frac{x}{5} = 6$ $x = 30$	$7 - x = 3$ $x = 4$
$4x + 1 = -7$ $x = -2$	$\frac{x}{2} + 1 = 4$ $x = 6$	$x - 4 = 9$ $x = 13$

Adaptación a 1.º ESO del juego original de Victoria Cañada Carrasco (@_educarte_)

ECUACIONES DE PRIMER GRADO INCORRECTAS

$\frac{x}{3} = 5$ $x = 2$	$\frac{x}{4} + 2 = 5$ $x = 28$	$x + 6 = 1$ $x = 7$
$2x + 5 = 13$ $x = 9$	$2(x + 3) = 14$ $x = 7$	$12 - 2x = 2$ $x = -5$
$-3x = 12$ $x = 4$	$7x - 3 = 3x + 5$ $x = 1$	$4x = 28$ $x = 24$
$4x + 3 = 2x + 9$ $x = 2$	$3x - 1 = 14$ $x = 6$	$5x + 2 = -8$ $x = 2$
$9 - x = 4$ $x = -5$	$x + 8 = 15$ $x = 23$	$x - 6 = 10$ $x = 4$

Adaptación a 1.º ESO del juego original de Victoria Cañada Carrasco (@_educarte_)

PERÍMETROS, ÁREAS Y FIGURAS CORRECTAS

Círculo r = 10 cm Área ≈ 314 cm^2	Los ángulos de un cuadrilátero suman 360°	Los ángulos de un triángulo suman 180°
Un cuadrado es también un rombo	Trapecio: bases 10 y 6, h = 5 cm Área = 40 cm^2	Un triángulo equilátero tiene 3 ángulos de 60°
Hexágono regular de lado 5 cm Perímetro = 30 cm	Rombo: diagonales 8 y 6 cm Área = 24 cm^2	Cuadrado de lado 7 cm Perímetro = 28 cm
Circunferencia r = 5 cm Longitud ≈ 31,4 cm	Rectángulo 8 × 5 cm Área = 40 cm^2	Triángulo b = 10, h = 7 cm Área = 35 cm^2
Cuadrado de lado 6 cm Área = 36 cm^2	Rectángulo 9 × 4 cm Perímetro = 26 cm	Triángulo b = 6, h = 4 cm Área = 12 cm^2

Adaptación a 1.º ESO del juego original de Victoria Cañada Carrasco (@_educarte_)

PERÍMETROS, ÁREAS Y FIGURAS INCORRECTAS

Trapecio: bases 8 y 4, h = 3 cm Área = 36 cm^2	Existe un triángulo de lados 2, 3 y 7 cm	Los ángulos de un triángulo suman 360°
Cuadrado de lado 8 cm Perímetro = 64 cm	Rombo: diagonales 10 y 4 cm Área = 40 cm^2	Rectángulo 6 × 5 cm Perímetro = 30 cm
Pentágono regular de lado 6 cm Perímetro = 36 cm	Círculo r = 4 cm Área ≈ 25,12 cm^2	Triángulo b = 8, h = 5 cm Área = 40 cm^2
Un triángulo puede tener dos ángulos rectos	Triángulo b = 12, h = 3 cm Área = 36 cm^2	Rectángulo 7 × 3 cm Área = 20 cm^2
Todo rombo es también un cuadrado	Circunferencia r = 3 cm Longitud ≈ 9,42 cm	Cuadrado de lado 5 cm Área = 20 cm^2

Adaptación a 1.º ESO del juego original de Victoria Cañada Carrasco (@_educarte_)