

Apuntes · Geometría · Sesión 1 — El espacio afín: puntos, vectores, rectas y planos

Todo el material de la sesión con la formalización completa: la axiomática del espacio afín y sus consecuencias, las tres formas de la ecuación con su equivalencia demostrada, y el teorema que identifica subespacios afines con conjuntos de soluciones. Ejercicios y ampliación al final.

1.1 El espacio afín

Los espacios vectoriales tienen un punto privilegiado: el 0. El plano de la geometría clásica, no — ningún punto es especial. Lo que sí hay entre dos puntos es el **desplazamiento** que los conecta. La estructura que captura esto:

Definición 5.1.1 (espacio afín). Un **espacio afín** sobre un espacio vectorial V (sobre K) es un conjunto no vacío $\mathbb{A}$ de **puntos** junto con una operación

$$\mathbb{A} \times V \rightarrow \mathbb{A}, \quad (P, v) \mapsto P + v,$$

que cumple: 1. $P + 0 = P$ para todo punto P ; 2. $(P + v) + w = P + (v + w)$ (trasladar dos veces es trasladar por la suma); 3. para cada par de puntos (P, Q) existe **un único** vector, denotado $\vec{PQ}$, con $P + \vec{PQ} = Q$.

La **dimensión** de $\mathbb{A}$ es la de V . **Modelo:** $\mathbb{A}^n$ = los puntos de K^n , con $V = K^n$ actuando por suma de tuplas; los axiomas son inmediatos.

Proposición 5.1.2 (consecuencias). En todo espacio afín: 1. $\vec{PP} = 0$, y $P + v = P \Rightarrow v = 0$. 2. (**Chasles**) $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$. 3. $\vec{QP} = -\vec{PQ}$. 4. (**regla del paralelogramo**) $\vec{PQ} = \vec{P'Q'} \iff \vec{PP'} = \vec{QQ'}$.

Demostración. (1) $P + 0 = P$ por el axioma 1, y el vector que lleva P a P es único (axioma 3): $\vec{PP} = 0$; la segunda afirmación es la misma unicidad. (2) $P + (\vec{PQ} + \vec{QR}) = (P + \vec{PQ}) + \vec{QR} = Q + \vec{QR} = R$ (axioma 2), y por unicidad ese vector es $\vec{PR}$. (3) Chasles con $R = P$: $\vec{PQ} + \vec{QP} = \vec{PP} = 0$. (4) Por Chasles dos veces: $\vec{PQ'} = \vec{PP'} + \vec{P'Q'} = \vec{PQ} + \vec{QQ'}$; igualar $\vec{P'Q'} = \vec{PQ}$ equivale a igualar $\vec{PP'} = \vec{QQ'}$ (cancelando en V). ■




Figura 1: Relación de Chasles: $\vec{PQ} + \vec{QR} = \vec{PR}$ (vectores encadenados), y $\vec{QP} = -\vec{PQ}$.

Afin = lineal + punto de referencia

Proposición 5.1.3. Fijado un punto $O \in \mathbb{A}$ (un **origen**), la asignación $P \mapsto \vec{OP}$ es una **biyección** entre los puntos de $\mathbb{A}$ y los vectores de V .

Demostración. Inyectiva: si $\vec{OP} = \vec{OQ}$, entonces $P = O + \vec{OP} = O + \vec{OQ} = Q$.
Sobreyectiva: $v = O(\vec{O} + v)$ por el axioma 3. ■

La identificación **depende de la elección de O** : con otro origen O' , el vector asociado a P cambia ($\vec{O'}P} = \vec{O'}O} + \vec{OP}$, Chasles). Por eso *punto* y *vector* son conceptos distintos: identificarlos exige una elección. Este es el contenido preciso del eslogan “**afin = lineal + punto de referencia**”.




Figura 2: Arrastra el origen O (en la versión interactiva): el punto P no se mueve, pero su vector $\vec{OP}$ —y por tanto sus coordenadas— cambia con la elección de O .
[ver versión interactiva]

Definición 5.1.4 (sistema de referencia y coordenadas). Un **sistema de referencia** de $\mathbb{A}$ (dimensión n) es un par (origen O , base $\{b_1, \dots, b_n\}$ de V). Las **coordenadas** del punto P son las coordenadas del vector $\vec{OP}$ en esa base —únicas, por la Proposición 5.3.18 de Álgebra Lineal.




Figura 3: El punto base no es intrínseco: el mismo P tiene vectores $\vec{OP}$ y $\vec{O'P}$ distintos según el origen, y por tanto coordenadas distintas.

1.2 Subespacios afines; rectas y planos

Definición 5.1.5. Un **subespacio afín** de $\mathbb{A}$ es un conjunto de la forma

$$P + W = \{ P + w : w \in W \},$$

con P un punto y $W \subseteq V$ un subespacio vectorial, llamado el **espacio de direcciones**. Su **dimensión** es $\dim W$: **puntos** ($\dim 0$), **rectas** ($\dim 1$), **planos** ($\dim 2$), **hiperplanos** ($\dim n - 1$).

Proposición 5.1.6 (el espacio de direcciones es intrínseco; el punto base no). Si $P + W = P' + W'$, entonces $W = W'$ y $P' \in P + W$. Recíprocamente, $P + W = P' + W$ para **cualquier** $P' \in P + W$.

Demostración. Si $P' \in P + W$, entonces $\vec{PP'} \in W$ y $P' + W = P + (\vec{PP'} + W) = P + W$ (porque $\vec{PP'} + W = W$: trasladar un subespacio por un vector suyo lo

deja igual — cerradura). Para la primera parte: $W = \{\vec{XY} : X, Y \in P + W\}$ (diferencias de puntos del conjunto, vía Chasles), que solo depende del conjunto. ■

Definición 5.1.7 (recta y plano, forma vectorial). La **recta** por P con **vector director** $v \neq 0$: $r = P + \text{span}(v) = \{P + tv : t \in K\}$. El **plano** por P con directores u, v **independientes**: $\pi = P + \text{span}(u, v) = \{P + su + tv : s, t \in K\}$.





Figura 4: La recta $P + tv$: al variar t se recorre toda la recta en la dirección del vector director v (aquí $t = -1, 0, 1, 2$).



mismo punto P : al cambiar el director, toda la recta se reorienta

Figura 5: Versión interactiva: arrastra el extremo del vector director para ver cómo, al cambiar v , se reorienta toda la recta.

[ver versión interactiva]

Las tres formas y su equivalencia

En coordenadas (fijado un sistema de referencia en $\mathbb{A}^n$):

1. **Vectorial**: $X = P + t_1 v_1 + \dots + t_k v_k$.
2. **Paramétricas**: la anterior, coordenada a coordenada (n ecuaciones con k parámetros).
3. **Implícitas**: el conjunto como soluciones de un sistema lineal $Ax = b$.

Teorema 5.1.8 (subespacios afines = conjuntos de soluciones). En $\mathbb{A}^n$:

1. El conjunto de soluciones de **cualquier** sistema compatible $Ax = b$ es un

subespacio afín, con espacio de direcciones el núcleo de A (y dimensión $n - \text{rg} A$).
 2. Recíprocamente, **todo** subespacio afín $P + W$ es el conjunto de soluciones de algún sistema lineal compatible.

Demostración. (1) Es el Teorema “general = particular + núcleo” (Álgebra Lineal, Teorema 4.4.7) releído con la Definición 5.1.5: soluciones = $x_p + \ker A$; la dimensión es el Teorema 4.4.6 de Álgebra Lineal.

- (2) Basta encontrar un sistema **homogéneo** cuyas soluciones sean exactamente W (de dimensión k); después se ajusta el término independiente con $b := A \cdot P$ para trasladar a $P + W$ (las soluciones de $Ax = AP$ son $P + \ker A$ por el apartado 1). Sea $\{w_1, \dots, w_k\}$ una base de W y M la matriz $k \times n$ con filas w_i . El núcleo de M tiene dimensión $n - k$ (el rango de M es k : filas independientes); sea $\{z_1, \dots, z_{n-k}\}$ una base suya y A la matriz con filas z_j . Entonces:
- cada w_i es solución de $Ax = 0$: la condición $Aw_i = 0$ dice $\sum_l (z_j)_l (w_i)_l = 0$ para cada j , que es exactamente $Mz_j = 0$ leído al revés (la expresión es **simétrica** en w_i y z_j). Luego $W \subseteq \ker A$.
 - $\dim(\ker A) = n - \text{rg} A = n - (n - k) = k = \dim W$. Y un subespacio contenido en otro de la misma dimensión finita coincide con él. *En efecto*: una base de W es una familia independiente de k elementos dentro de $\ker A$; por el Lema 5.3.18b(1) de Álgebra Lineal se extiende a una base de $\ker A$ — pero esa base también tiene k elementos ($\dim \ker A = k$), luego la extensión no añade nada: la base de W ya era base de $\ker A$, y $W = \text{span} = \ker A$. ■

Método 5.1.9 (paso entre formas).

- *Paramétricas* $\rightarrow$ *implícitas*: **eliminar los parámetros** — tratar las paramétricas como sistema en los parámetros y expresar la condición de compatibilidad en x (en la práctica: despejar y sustituir, o escalar).
- *Implícitas* $\rightarrow$ *paramétricas*: **resolver el sistema** y parametrizar — literalmente el Método 5.4.4 de Álgebra Lineal.

Ejemplo 5.1.10. La recta de $\mathbb{R}^3$ por $P = (1, 0, 2)$ con director $v = (1, 1, -1)$:

- *Vectorial*: $(x, y, z) = (1, 0, 2) + t(1, 1, -1)$.
- *Paramétricas*: $x = 1 + t$, $y = t$, $z = 2 - t$.
- *Implícitas*: despejando $t = y$ y sustituyendo: $x - y = 1$, $y + z = 2$ (sistema de rango 2; dimensión de soluciones $3 - 2 = 1$ ✓).

Hiperplanos. Una sola ecuación lineal no degenerada $a_1x_1 + \dots + a_nx_n = b$ define un subespacio afín de dimensión $n - 1$ (rango 1): un **hiperplano**. Las rectas del plano y los planos del espacio son los casos $n = 2, 3$; la lectura “cada ecuación de un sistema recorta un hiperplano, y resolver es intersecarlos” (Sesión 1 de Álgebra Lineal) queda ahora completamente formalizada.

Ejercicios

1. ★ Para la recta de $\mathbb{R}^3$ por $P = (0, 1, 1)$ y $Q = (2, 1, 3)$: halla un director, escribe las tres formas y comprueba que Q las satisface.
2. ★ Pasa a paramétricas (resolviendo) el plano $x - 2y + z = 4$ de $\mathbb{R}^3$, y a implícitas (eliminando parámetros) el plano $(x, y, z) = (1, 0, 0) + s(1, 1, 0) + t(0, 1, 1)$.
3. ★ El sistema $\{x + y - z = 1; 2x - y = 0\}$ es compatible. Describe su conjunto de soluciones como subespacio afín: punto base, espacio de direcciones (base) y dimensión.
4. ★ **(Punto vs. vector / afín vs. vectorial.)** La recta $y = x + 1$ de $\mathbb{R}^2$: ¿es subespacio vectorial? ¿es subespacio afín? Da su espacio de direcciones y exhibe dos elecciones distintas de punto base (Proposición 5.1.6).
5. Demuestra con Chasles: el punto medio M de P y Q (definido por $\vec{PM} = \frac{1}{2}\vec{PQ}$, con $K = \mathbb{R}$) cumple $\vec{MP} + \vec{MQ} = 0$.
6. Comprueba en el modelo $\mathbb{A}^n$ los tres axiomas de la Definición 5.1.1.
7. Sea r la recta por P con director v . Demuestra que $Q \in r \iff \vec{PQ}$ es proporcional a v , y deduce un criterio para que **tres puntos estén alineados**.
8. En el Teorema 5.1.8.2, sigue la construcción con $W = \text{span}((1, 1, 0), (0, 1, 1)) \subseteq \mathbb{R}^3$ y obtén unas implícitas del plano $(1, 2, 3) + W$.

Ampliación y referencias

Ampliación (combinaciones afines y baricentros). Aunque “sumar puntos” no tiene sentido, las combinaciones $\sum \lambda_i P_i$ con $\sum \lambda_i = 1$ sí lo tienen (el resultado no depende del origen usado para calcularlas): son las **combinaciones afines**, y con ellas los baricentros, los segmentos y la convexidad. Véase de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*, o Audin, *Geometry*, cap. I.

Referencias. Espacio afín axiomático: de Burgos; Audin, cap. I. Rectas, planos y formas de la ecuación: de Burgos; Hernández, *Álgebra y geometría*. Subespacios afines como soluciones: Hefferon, One.I (implícito), y los apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 4.

Apuntes · Geometría · Sesión 2 — Posiciones relativas

El método general (intersecar = resolver, clasificado por Rouché–Frobenius), el paralelismo por direcciones, las tablas del plano y del espacio **deducidas** caso a caso, el criterio del determinante para rectas cruzadas y un ejemplo con parámetro completo. Ejercicios y ampliación al final.

2.1 El método general

Principio 2.1 (intersecar = resolver). Si dos subespacios afines de $\mathbb{A}^n$ vienen dados en implícitas, $\mathcal{F} = \{x : Ax = b\}$ y $\mathcal{G} = \{x : Cx = d\}$, su **intersección** es el conjunto de soluciones del **sistema conjunto**

$$\begin{bmatrix} A \\ C \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} b \\ d \end{bmatrix},$$

que se discute con **Rouché–Frobenius** (Álgebra Lineal, Teorema 4.4.3): la intersección es vacía si los rangos difieren; si coinciden ($= r$), es un subespacio afín de dimensión $n - r$ (Teorema 5.1.8). *Si un objeto viene en paramétricas, se sustituyen en las implícitas del otro (suele ser lo más corto), o se pasa todo a implícitas (Método 5.1.9).*

Definición 5.2.2 (paralelismo). Dos subespacios afines son **paralelos** si el espacio de direcciones de uno contiene al del otro ($W \subseteq W'$ o $W' \subseteq W$). (Para dos rectas: directores proporcionales; recta y plano: el director de la recta pertenece al plano de direcciones.)

Proposición 5.2.3. Dos subespacios afines paralelos, o son disjuntos, o uno contiene al otro.

Demostración. Sea $W \subseteq W'$ y supongamos que $\mathcal{F} = P + W$ y $\mathcal{G} = Q + W'$ comparten un punto R . Por la Proposición 5.1.6 podemos tomar R como punto base de ambos: $\mathcal{F} = R + W \subseteq R + W' = \mathcal{G}$. ■

El paralelismo se decide **sin resolver nada**: es una condición de **rango entre los directores** (¿es $\text{rg}(\text{directores juntos})$ igual al máximo de los rangos por separado?).

2.2 Las tablas, deducidas

Cada caso **se deduce** con tres pasos: (i) montar el sistema conjunto; (ii) acotar los rangos posibles; (iii) leer cada combinación con Rouché–Frobenius y el recuento de dimensión $n - r$. Las tablas de abajo son el registro de esa deducción.

Dos rectas en el plano ($n = 2$)

Sistema de 2 ecuaciones (una por recta), 2 incógnitas; $1 \leq \text{rg}A \leq 2$.

$\text{rg}A$	$\text{rg}[A b]$	Lectura	Posición
2	2	compatible, $\dim = 0$	secantes (un punto)
1	1	compatible, $\dim = 1$	coincidentes
1	2	incompatible	paralelas distintas

(No hay más casos: $\text{rg}[A|b] \leq 2$ y nunca es menor que $\text{rg}A$.)




Figura 6: Posiciones relativas de dos rectas en el plano (versión interactiva: arrastra los puntos de r_2): se cortan en un punto (secantes), no se cortan (paralelas) o coinciden.

[ver versión interactiva]

En el espacio ($n = 3$)

Dos planos (2 ecuaciones): $\text{rg}A \leq 2 < 3$, luego si hay intersección su dimensión es ≥ 1 :

Proposición 5.2.4. Dos planos de $\mathbb{R}^3$ **nunca** se cortan en exactamente un punto.

Demostración. El sistema conjunto tiene 2 ecuaciones y 3 incógnitas: $\text{rg}A \leq 2$, y si es compatible la dimensión de la intersección es $3 - \text{rg}A \geq 1$. ■

$\text{rg}A$	$\text{rg}[A b]$	Posición
2	2	se cortan en una recta
1	1	coincidentes
1	2	paralelos distintos




Figura 7: Posiciones relativas de dos planos en el espacio: se cortan en una recta (secantes), son paralelos o coinciden — con un deslizador que recorre los casos.

[ver versión interactiva]

Recta y plano ($2+1 = 3$ ecuaciones): casos (3,3) un **punto**; (2,2) la recta **contenida** en el plano; (2,3) **paralelos** (sin contacto). (El caso $\text{rg}A = 3$ incompatible es imposible: con rango máximo el sistema siempre es compatible — $\text{rg}[A|b] \leq 3$.)

Dos rectas ($2+2 = 4$ ecuaciones, 3 incógnitas): (3,3) **secantes** en un punto; (2,2) **coincidentes**; (2,3) **paralelas distintas**; y la novedad,

(3,4) : **cruzadas** — no se cortan *sin* ser paralelas.



Figura 8: El reflejo del plano que el espacio desmonta: en $\mathbb{R}^2$, “no se cortan” fuerza “paralelas”; en $\mathbb{R}^3$ aparece el caso nuevo — **cruzadas** —, y la pregunta del personaje es exactamente el error. La existencia de cruzadas es un fenómeno dimensional (véase la nota tras la Proposición 5.2.5).

Proposición 5.2.5 (criterio del determinante para rectas cruzadas). Sean $r = P + \text{span}(v)$ y $s = Q + \text{span}(w)$ rectas de $\mathbb{R}^3$. Entonces

$$r \text{ y } s \text{ son cruzadas} \iff \det(\vec{PQ}, v, w) \neq 0,$$

(las tres columnas: el vector que conecta las rectas y los dos directores).

Demostración. ($\Leftarrow$) Si el determinante es no nulo, $\{\vec{PQ}, v, w\}$ es independiente (Álgebra Lineal, Teorema 4.6.11). En particular v, w no son proporcionales (no paralelas) y las rectas no se cortan: si compartieran un punto R , entonces $\vec{PQ} = \vec{PR} + \vec{RQ}$ sería combinación de v y w (pues $\vec{PR} \parallel v$, $\vec{RQ} \parallel w$), contra la independencia. ($\Rightarrow$) Contrarrecíproco: si el determinante es 0, la familia es dependiente. Si v, w son proporcionales, las rectas son paralelas (no cruzadas). Si no, $\{v, w\}$ es independiente y entonces $\vec{PQ} \in \text{span}(v, w)$ (en una dependencia no trivial, el coeficiente de $\vec{PQ}$ no puede ser 0, y se despeja — cuerpo). Escribiendo $\vec{PQ} = \alpha v + \beta w$, el punto $P + \alpha v = Q + \beta w$ está en ambas rectas: se cortan (no cruzadas). ■

Por qué en el plano no hay cruzadas: el criterio exigiría tres vectores independientes en K^2 , imposible (Álgebra Lineal, ejercicio 8 de la Sesión 3: la dimensión lo prohíbe). La existencia de cruzadas es un fenómeno **dimensional**: hace falta sitio.

Ejemplo 5.2.6 (un par cruzado). $r : (0, 0, 0) + t(1, 0, 0)$ (el eje x) y $s : (0, 0, 1) + t(0, 1, 0)$. Con $\vec{PQ} = (0, 0, 1)$: $\det \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 1 \neq 0$ — cruzadas. (*Intuición: dos pasillos en plantas distintas con direcciones perpendiculares.*)

2.3 Ejemplo con parámetro (completo)

Ejemplo 5.2.7 (los tres regímenes). Posición de $r : (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(1, a^2 - 2, 0)$ y $\pi : x + y = a - 1$, según $a \in \mathbb{R}$.

Sustituyendo los puntos de la recta, $(t, (a^2 - 2)t, 1)$, en la implícita:

$$t + (a^2 - 2)t = a - 1 \iff (a^2 - 1)t = a - 1.$$

Una sola ecuación en t , y su discusión es la tricotomía de la Sesión 1 de Álgebra Lineal en versión geométrica:

- $a \neq \pm 1$: coeficiente no nulo $\rightarrow$ solución única $t = \frac{a-1}{a^2-1} = \frac{1}{a+1}$: la recta **corta** al plano en un punto.
- $a = 1$: queda $0 \cdot t = 0$, que se cumple **siempre**: la recta está **contenida** en el plano. (*Comprobación: dirección $(1, -1, 0)$ y plano $x + y = 0$; los puntos $(t, -t, 1)$ lo satisfacen todos.*)
- $a = -1$: queda $0 \cdot t = -2$, que no se cumple **nunca**: recta y plano **paralelos** (sin contacto).

Obsérvese la mecánica: el régimen lo deciden **dos cosas distintas** — que se anule el coeficiente (paralelismo de dirección) y, en ese caso, que se anule o no el término independiente (contenida vs. paralela estricta). Por eso hizo falta que el parámetro apareciera en ambos lados con ceros en valores distintos de a .

Ejercicios

- ★ Discute la posición relativa, montando el sistema y comparando rangos:
 - las rectas de $\mathbb{R}^2$: $x + y = 1$ y $2x + 2y = 3$;
 - los planos $x - y + z = 0$ y $2x - 2y + 2z = 5$;
 - las rectas de $\mathbb{R}^3$: $r : (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$ y $s : (0, 1, 0) + t(0, 1, 1)$ — aplica también el criterio del determinante (Proposición 5.2.5).
- ★ Halla la intersección de $\pi_1 : x + y + z = 3$ y $\pi_2 : x - y = 1$, parametrizada, y comprueba que su dimensión coincide con $3 - \text{rg}$.
- ★ Discute según a : la recta $r : (x, y, z) = (0, 0, 1) + t(1, a, 0)$ y el plano $\pi : x + y = 2$. **Solo aparecen dos** de los tres regímenes posibles —

identifícalos, da el valor crítico de a , y **explica por qué el caso “recta contenida” es imposible para todo a** (*pista: ¿qué dos cosas tendrían que anularse a la vez, y pueden?*).

4. ★ Demuestra que las rectas $r : (0, 0, 0) + t(1, 1, 0)$ y $s : (1, 0, 1) + t(1, 1, 1)$ son cruzadas, y da unas implícitas de cada una.
5. Deduce la tabla recta-plano en $\mathbb{R}^3$: enumera los pares de rangos posibles del sistema conjunto y justifica por qué (3, incompatible) no aparece.
6. Demuestra: si dos rectas de $\mathbb{R}^3$ se cortan en **dos** puntos distintos, son coincidentes. (*Pista: dos puntos determinan la dirección.*)
7. (**Conceptual.**) Explica por qué la Definición 5.2.2 de paralelismo incluye el caso “uno contenido en el otro”, y por qué eso es coherente con la Proposición 5.2.3.

Ampliación y referencias

Ampliación (haces de planos). Los planos que contienen a una recta dada $r = \pi_1 \cap \pi_2$ son exactamente los de ecuación $\lambda(\text{ec. de } \pi_1) + \mu(\text{ec. de } \pi_2) = 0$ con $(\lambda, \mu) \neq (0, 0)$: el **haz de planos** de arista r . Útil para imponer “plano que contiene a r y cumple X” sin parametrizar. Véase de Burgos.

Referencias. Posiciones relativas con rangos: de Burgos, *Álgebra lineal y geometría cartesiana*; Hernández, *Álgebra y geometría*. Rectas cruzadas y el criterio del determinante: de Burgos. La discusión de sistemas subyacente: apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 4.

Apuntes · Geometría · Sesión 3 — El espacio euclídeo: producto escalar, distancias y ángulos

La métrica completa: producto escalar y sus propiedades demostradas, Cauchy–Schwarz con prueba (y de ahí el ángulo bien definido y la desigualdad triangular), Pitágoras, la proyección ortogonal deducida y las fórmulas de distancia desarrolladas. El contrafactual de por qué esta estructura exige $\mathbb{R}$, resuelto con detalle. Ejercicios y ampliación al final.

3.1 El producto escalar

Hasta ahora la geometría era **afín**: incidencia, paralelismo, dimensiones. Para hablar de longitudes y ángulos hace falta una estructura adicional, y la trae una sola operación.

Definición 5.3.1. El **producto escalar** (estándar) de $u, v \in \mathbb{R}^n$:

$$u \cdot v = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n.$$

Proposición 5.3.2 (propiedades). Para $u, v, w \in \mathbb{R}^n$ y $a, b \in \mathbb{R}$: 1. **Simetría:** $u \cdot v = v \cdot u$. 2. **Bilinealidad:** $(au + bw) \cdot v = a(u \cdot v) + b(w \cdot v)$ (y, por simetría, igual en el segundo argumento). 3. **Positividad:** $u \cdot u \geq 0$, con igualdad **si y solo si** $u = 0$.

Demostración. (1) y (2): directas de la definición (conmutatividad y distributiva de $\mathbb{R}$, término a término). (3) $u \cdot u = u_1^2 + \dots + u_n^2$ es suma de cuadrados reales, ≥ 0 ; y una suma de cuadrados reales es 0 solo si **cada** sumando es 0, es decir, $u = 0$. ■

Observación 5.3.3 (dónde se usa $\mathbb{R}$ — el hilo de cuerpos, último giro). La propiedad (3) es la que **no sobrevive** en un cuerpo arbitrario:

- En $K = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, con $u = (1, 2)$: $u \cdot u = 1 + 4 = 5 = 0$, con $u \neq 0$. La “positividad” ni siquiera puede enunciarse ($\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ no está ordenado) y su consecuencia falla de plano.
- En $\mathbb{C}$ con la misma fórmula: $u = (1, i)$ da $u \cdot u = 1 + i^2 = 0$. (Por eso en $\mathbb{C}$ se usa otra operación, con conjugados — ampliación.)
- Además, la **norma** (abajo) necesita raíces cuadradas de números no negativos, que $\mathbb{R}$ garantiza.

Conclusión: la geometría **afín** funciona sobre cualquier cuerpo K (Sesiones 1–2); la **euclídea** —esta sesión— vive sobre $\mathbb{R}$.

3.2 Norma, distancia y la desigualdad clave

Definición 5.3.4. La **norma** de u : $\|u\| = \sqrt{u \cdot u}$ (bien definida por 5.3.2.3). La **distancia** entre dos puntos: $d(P, Q) = \|\vec{PQ}\|$. (En el plano, $\|(a, b)\| = \sqrt{a^2 + b^2}$: el teorema de Pitágoras convertido en definición.)




Figura 9: Distancia en el plano por Pitágoras: $d(P, Q) = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$, hipotenusa del triángulo de catetos $\Delta x, \Delta y$.

Propiedades inmediatas: $\|u\| \geq 0$ con igualdad solo en $u = 0$; $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$ (sale un λ^2 de la bilinealidad y la raíz lo devuelve como $|\lambda|$).

Teorema 5.3.5 (desigualdad de Cauchy–Schwarz). Para todos $u, v \in \mathbb{R}^n$:

$$|u \cdot v| \leq \|u\| \|v\|,$$

con igualdad **si y solo si** u y v son proporcionales.

Demostración. Si $v = 0$, ambos miembros son 0 (y $0 = 0 \cdot u$: proporcionales). Sea $v \neq 0$. Para todo $t \in \mathbb{R}$, la positividad da

$$0 \leq \|u - tv\|^2 = (u - tv) \cdot (u - tv) = \|u\|^2 - 2t(u \cdot v) + t^2\|v\|^2,$$

(usando bilinealidad y simetría). El miembro derecho es un polinomio cuadrático en t con coeficiente principal $\|v\|^2 > 0$ que nunca es negativo: su **discriminante** es ≤ 0 :

$$4(u \cdot v)^2 - 4\|v\|^2\|u\|^2 \leq 0 \iff |u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|.$$

Igualdad: el discriminante es 0 exactamente cuando el polinomio tiene una raíz t_0 , es decir, $\|u - t_0v\| = 0$, es decir (3.2.3), $u = t_0v$: proporcionales. Recíprocamente, si $u = t_0v$ la igualdad se comprueba directamente. ■




Figura 10: Cauchy–Schwarz, visto: $f(t) = \|u - tv\|^2$ es una parábola que nunca baja del eje; que su discriminante sea ≤ 0 es la desigualdad, y toca el eje (igualdad) solo si u, v son proporcionales.

[ver versión interactiva]

Corolario 5.3.6 (desigualdad triangular). $\|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Demostración. Desarrollando y acotando el término cruzado,

$$\begin{aligned} \|u + v\|^2 &= \|u\|^2 + 2(u \cdot v) + \|v\|^2 \\ &\leq \|u\|^2 + 2\|u\|\|v\| + \|v\|^2 = (\|u\| + \|v\|)^2, \end{aligned}$$

usando $u \cdot v \leq |u \cdot v| \leq \|u\|\|v\|$ (Cauchy–Schwarz); se concluye tomando raíces (ambos miembros son ≥ 0). ■

3.3 Ángulo y ortogonalidad

El objetivo es **medir el ángulo** entre dos vectores. En el plano se cumple $u \cdot v = \|u\|\|v\| \cos \theta$, de modo que el coseno es la **vía** para recuperar el ángulo; lo tomamos como definición en $\mathbb{R}^n$, y Cauchy–Schwarz garantiza que tiene sentido.

Definición 5.3.7. Para $u, v \neq 0$, el **ángulo** $\theta \in [0, \pi]$ entre ellos es el único con

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{\|u\| \|v\|}.$$

Por qué está bien definida (el punto que suele omitirse): por Cauchy–Schwarz, el cociente está en $[-1, 1]$, que es exactamente el rango del coseno en $[0, \pi]$, donde el coseno es inyectivo. Sin el Teorema 5.3.5, la definición ni siquiera tendría sentido. Reescrita: $u \cdot v = \|u\|\|v\| \cos \theta$ — el producto escalar mide “cuánto apunta u en la dirección de v ” (positivo: agudo; cero: recto; negativo: obtuso).




Figura 11: El producto escalar como proyección: $u \cdot v = \|u\| \|v\| \cos \theta$, con $\|u\| \cos \theta$ la sombra de u sobre v .

Definición 5.3.8. $u \perp v$ (ortogonales) si $u \cdot v = 0$.




Figura 12: El signo de $u \cdot v$ según el ángulo: agudo (> 0), recto ($= 0$, ortogonales), obtuso (< 0).

Proposición 5.3.9. 1. (Pitágoras) Si $u \perp v$, entonces $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.
2. Para $v \neq 0$ fijo, el conjunto $\{v\}^\perp = \{u : u \cdot v = 0\}$ es un **subespacio** de $\mathbb{R}^n$, de dimensión $n - 1$ (un hiperplano vectorial).

Demostración. (1) Desarrollando con bilinealidad y simetría, $\|u + v\|^2 = (u + v) \cdot (u + v) = \|u\|^2 + 2(u \cdot v) + \|v\|^2$; si $u \perp v$ el término cruzado $2(u \cdot v)$ es 0.
(2) Es el núcleo de la matriz fila v^T (la condición $u \cdot v = 0$ es una ecuación lineal homogénea): subespacio de dimensión $n - \text{rg}(v^T) = n - 1$ (Álgebra Lineal, Teorema 4.4.6). ■

El ortogonal a v es un plano por el origen




Figura 13: El ortogonal a un vector no nulo v es un plano por el origen: $\{v\}^\perp = \{u : u \cdot v = 0\}$. Es la base de la idea de “normal” de un plano.

[ver versión interactiva]

3.4 Proyección ortogonal y distancias

Proposición 5.3.10 (proyección ortogonal, deducida). Dados u y $v \neq 0$, existe un único múltiplo de v , llamado **proyección ortogonal de u sobre v** , tal que el resto es perpendicular a v ; y vale

$$\text{proy}_v(u) = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2} v.$$

Demostración. Buscamos t con $(u - tv) \perp v$:

$$(u - tv) \cdot v = 0 \iff u \cdot v - t\|v\|^2 = 0 \iff t = \frac{u \cdot v}{\|v\|^2},$$

(despejable porque $\|v\|^2 \neq 0$). La condición determina t unívocamente, luego la proyección es única. ■

La fórmula **sale de la condición geométrica en una línea**. La descomposición resultante $u = \text{proy}_v(u) + (u - \text{proy}_v(u))$ separa u en “parte paralela a v ” + “parte perpendicular”.




Figura 14: Descomposición ortogonal: $u = u_{\parallel} + u_{\perp}$, con $u_{\parallel} = \text{proj}_v u$ la componente sobre v y $u_{\perp}$ la perpendicular.

Método 5.3.11 (distancia de un punto a una recta). Para Q y la recta $r = P + \text{span}(v)$: descomponer $\vec{PQ}$ con la proyección sobre v ; la distancia es la norma de la **parte perpendicular**:

$$d(Q, r) = \|\vec{PQ} - \text{proj}_v(\vec{PQ})\|.$$

(Que esto es realmente el mínimo de $d(Q, X)$ sobre $X \in r$ se sigue de Pitágoras: para cualquier otro punto de la recta, la distancia al cuadrado suma la parte perpendicular —fija— más una parte paralela no nula. Detalle: ejercicio 6.)




Figura 15: Distancia de Q a la recta r : la longitud de la componente de $\vec{PQ}$ perpendicular a la dirección v .

Proposición 5.3.12 (la normal de un plano, demostrada). En $\mathbb{R}^3$, el vector $n = (a, b, c)$ es **ortogonal a todas las direcciones** del plano $\pi : ax + by + cz = d$.

Demostración. La ecuación dice exactamente $n \cdot X = d$ para los puntos X del plano (producto escalar contra el vector de coordenadas). Si $X, Y \in \pi$, restando: $n \cdot \vec{XY} = n \cdot Y - n \cdot X = d - d = 0$. Toda dirección del plano es de la forma $\vec{XY}$: ortogonal a n . ■

Método 5.3.13 (distancia de un punto a un plano). Para Q y $\pi : ax + by + cz = d$ con normal n : tomar cualquier $P \in \pi$ y proyectar $\vec{PQ}$ sobre n — la parte paralela a la normal es la que separa a Q del plano:

$$d(Q, \pi) = \|\text{proy}_n(\vec{PQ})\| = \frac{|n \cdot \vec{PQ}|}{\|n\|} = \frac{|a q_1 + b q_2 + c q_3 - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}},$$

donde la última igualdad usa $n \cdot \vec{PQ} = n \cdot Q - n \cdot P = (a q_1 + b q_2 + c q_3) - d$ (Proposición 5.3.12). La fórmula de la distancia punto-plano queda así **deducida** en dos líneas: proyección + la lectura de la ecuación del plano.




Figura 16: Distancia de un punto Q a un plano: la longitud del segmento perpendicular de Q al plano (su proyección sobre la normal n).

[ver versión interactiva]

Definición 5.3.13b (ángulo entre planos). El **ángulo entre dos planos** secantes es el ángulo **agudo** entre sus normales:

$$\cos \theta = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{\|n_1\| \|n_2\|}, \quad \theta \in [0, \frac{\pi}{2}].$$

El valor absoluto no es un adorno: la normal de un plano está definida salvo signo (n y $-n$ describen el mismo plano), y el ángulo entre los planos no puede depender de esa elección — el valor absoluto la hace irrelevante. (Que el ángulo “entre las paredes” coincida con el de las normales es girar un cuarto de vuelta la escena: cada normal es perpendicular a su plano.)

Ejercicios

1. ★ Para $u = (1, 2, 2)$ y $v = (2, -1, 0)$: calcula $u \cdot v$, $\|u\|$, $\|v\|$, el ángulo entre ambos y decide si son ortogonales. Verifica Cauchy–Schwarz numéricamente.
2. ★ Proyecta $u = (3, 1)$ sobre $v = (1, 1)$, dibuja la descomposición (paralela + perpendicular) y calcula la distancia del punto $(3, 1)$ a la recta $\text{span}((1, 1))$.
3. ★ Calcula la distancia del punto $Q = (1, 1, 1)$ al plano $2x - y + 2z = 1$ siguiendo el Método 5.3.13 paso a paso (elige tú el punto P del plano), y comprueba con la fórmula final.

4. ★ **(Contrafactual estructural.)** En $K = \mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$, comprueba que $u = (1, 2)$ cumple $u \cdot u = 0$ con $u \neq 0$. Explica: (a) qué propiedad de la Proposición 5.3.2 falla; (b) por qué ni siquiera puede *enunciarse* en $\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ (¿qué le falta al cuerpo?); (c) qué noción geométrica se vuelve imposible.
5. Demuestra que $\{v\}^\perp$ es un subespacio usando solo la bilinealidad (sin matrices), y compara con la prueba de 5.3.9.2.
6. Completa el detalle del Método 5.3.11: si $X = P + sv \in r$, demuestra con Pitágoras que $d(Q, X)^2 = d(Q, r)^2 + \|t_0 v - sv\|^2$ para cierto t_0 , y concluye que el mínimo se alcanza en la proyección.
7. Demuestra el **teorema del coseno**: $\|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\|u\|\|v\|\cos\theta$. (*Expande y usa la Definición 5.3.7.*)
8. ¿Verdadero o falso? “Si $u \cdot v = u \cdot w$ con $u \neq 0$, entonces $v = w$.” Justifica o da contraejemplo (¡en $\mathbb{R}^3$!).

Ampliación y referencias

Ampliación (productos internos generales). Las tres propiedades de la Proposición 5.3.2 se toman como **axiomas** y definen los *espacios con producto interno*, donde toda esta sección se reproduce palabra por palabra (Cauchy–Schwarz incluida: la prueba de 5.3.5 solo usó los axiomas, compruébalo). En $\mathbb{C}^n$ el producto correcto es $\sum u_i \overline{v_i}$ (con conjugados, para salvar la positividad). Véase Axler, *Linear Algebra Done Right*, cap. 6.

Ampliación (mínimos cuadrados). La proyección ortogonal sobre un subespacio (no solo una recta) resuelve el problema de “la mejor solución aproximada” de un sistema incompatible — la regresión por **mínimos cuadrados** de la ciencia de datos. Strang, §4.2–4.3.

Ampliación opcional (distancias en general — espacios métricos). La distancia euclídea es un caso de un concepto más amplio. Una **distancia** (o *métrica*) en un conjunto X es una función $d : X \times X \rightarrow \mathbb{R}_{\geq 0}$ con: (i) $d(x, y) = 0 \iff x = y$; (ii) **simetría**, $d(x, y) = d(y, x)$; (iii) **desigualdad triangular**, $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$. La euclídea las cumple (la triangular es el Corolario 5.3.6). Hay otras útiles: la del taxista $\sum_i |x_i - y_i|$ o la del máximo $\max_i |x_i - y_i|$. Para leer más: **W. A. Sutherland, *Introduction to Metric and Topological Spaces* (Oxford University Press)**, cap. 2; reaparecerá en cursos posteriores de Análisis/Topología. No evaluable.

Referencias. Producto escalar y geometría euclídea: Hernández, *Álgebra y geometría*; de Burgos. Cauchy–Schwarz y productos internos: Axler, cap. 6.A. Proyecciones: Strang, §4.2.

Apuntes · Geometría · Sesión 4 — Producto vectorial, áreas y volúmenes

El cierre del módulo, con todo demostrado: las propiedades del producto vectorial (incluida la identidad de Lagrange y de ahí la interpretación como área), el producto mixto identificado con el determinante, los tests de coplanariedad, y la distancia entre rectas cruzadas deducida. La mnemotecnica del “determinante simbólico” justificada. Ejercicios y ampliación al final.

4.1 El producto vectorial en $\mathbb{R}^3$

La geometría del espacio pide constantemente un vector **perpendicular a otros dos** (normales de planos, sobre todo). El producto vectorial lo construye explícitamente.

Definición 5.4.1. Para $u = (u_1, u_2, u_3)$, $v = (v_1, v_2, v_3) \in \mathbb{R}^3$:

$$u \times v = (u_2v_3 - u_3v_2, \quad u_3v_1 - u_1v_3, \quad u_1v_2 - u_2v_1) \in \mathbb{R}^3.$$

Observación 5.4.2 (la mnemotecnica, justificada). La regla del “determinante simbólico”

$$u \times v = \text{”det”} \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{pmatrix}$$

no es una definición (mezcla vectores y escalares en una matriz), pero funciona como regla de cálculo: desarrollando formalmente por la primera fila (cofactores, regla de Sarrus por bloques), los tres “coeficientes” de e_1, e_2, e_3 que salen son exactamente las tres componentes de la Definición 5.4.1 — compruébese (ejercicio 7). Su mérito real aparece en la Proposición 5.4.6.

Proposición 5.4.3 (propiedades algebraicas). 1. **Antisimetría:** $v \times u = -(u \times v)$; en particular $u \times u = 0$. 2. **Bilinealidad:** lineal en cada argumento. 3. $u \times v = 0 \iff u, v$ linealmente dependientes (proporcionales).

Demostración. (1) y (2): comprobación directa componente a componente (cada componente es una expresión bilineal antisimétrica en los pares de coordenadas). (3) ($\Leftarrow$) Si $v = \lambda u$, cada componente es del tipo $u_i(\lambda u_j) - u_j(\lambda u_i) = 0$ (o $u = 0$, trivial). ($\Rightarrow$) Sea M la matriz 2×3 con filas u, v . Si son independientes, $\text{rg} M = 2$: al escalonar quedan **dos pivotes**, en ciertas columnas $j < k$. Considérese la submatriz 2×2 de las columnas j, k — un **menor**. Las operaciones de filas sobre M actúan **fila a fila completa**, luego inducen exactamente operaciones de filas sobre esa submatriz; en la forma escalonada, la submatriz de las columnas pivote es triangular con diagonal no nula, es decir, invertible — y como las operaciones de filas preservan la invertibilidad (son multiplicar por elementales, Álgebra

Lineal 4.2.15.2 y 4.3.24), la submatriz **original** es invertible: su determinante, no nulo (Álgebra Lineal, Teorema 4.6.8). Pero los tres menores 2×2 de M son, salvo signo, **las tres componentes de $u \times v$** (compárese con la Definición 5.4.1): alguna componente es no nula y $u \times v \neq 0$. ■

Proposición 5.4.4 (perpendicularidad). $(u \times v) \perp u$ y $(u \times v) \perp v$.

Demostración. Directa:

$$(u \times v) \cdot u = (u_2v_3 - u_3v_2)u_1 + (u_3v_1 - u_1v_3)u_2 + (u_1v_2 - u_2v_1)u_3 = 0,$$

porque los seis términos se cancelan por parejas ($u_1u_2v_3$ con $-u_2u_1v_3$, etc.). Igual con v . ■

Teorema 5.4.5 (identidad de Lagrange y el área).

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2,$$

y por tanto

$$\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin\theta,$$

que es el **área del paralelogramo** de lados u y v .

Demostración. La identidad es un cálculo: desarrollando $\|u \times v\|^2$ (suma de los cuadrados de las tres componentes) y $\|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2$ (productos de sumas), ambos miembros resultan ser la misma suma de términos $u_i^2v_j^2$ ($i \neq j$) menos términos cruzados $2u_iu_jv_iv_j$ ($i < j$) — la verificación término a término es mecánica y se deja indicada (ejercicio 9, con guía). De ahí, usando $u \cdot v = \|u\|\|v\|\cos\theta$ (Sesión 3):

$$\|u \times v\|^2 = \|u\|^2\|v\|^2(1 - \cos^2\theta) = \|u\|^2\|v\|^2\sin^2\theta,$$

y como $\theta \in [0, \pi]$, $\sin\theta \geq 0$ y se toman raíces sin pérdida. La interpretación: base $\|u\|$ por altura $\|v\|\sin\theta$. ■




Figura 17: Paralelogramo de lados u, v : base $\|u\|$ y altura $\|v\|\sin\theta$ (la componente de v perpendicular a u); su área es $\|u \times v\|$.

El “ $u \times v = 0$ ” es un caso límite, no una propiedad aparte. La Proposición 5.4.3.3 es exactamente el Teorema 5.4.5 en el límite: $\|u \times v\| = \|u\| \|v\| \sin\theta = 0 \iff \sin\theta = 0 \iff u \parallel v$ — el paralelogramo se aplasta y el área cae a cero ($u \times u = 0$ es el extremo $\theta = 0$). La prueba algebraica de 5.4.3.3 con menores sigue siendo útil (no usa trigonometría), pero conceptualmente *es* el área valiendo cero.




Figura 18: El área $\|u \times v\|$ se anula cuando v se vuelve paralelo a u : el paralelogramo se aplasta y $u \times v \rightarrow 0$.

[ver versión interactiva]

Orientación: de las dos direcciones perpendiculares posibles, $u \times v$ apunta según la **regla de la mano derecha** — el producto vectorial ve la orientación, en coherencia con el signo del determinante (Álgebra Lineal, Sesión 6). La antisimetría ($v \times u = -u \times v$) es esa sensibilidad hecha álgebra.

4.2 Producto mixto y volúmenes

Definición y Proposición 5.4.6 (producto mixto = determinante). El **producto mixto** de $u, v, w \in \mathbb{R}^3$ es $[u, v, w] = u \cdot (v \times w)$, y coincide con el determinante:

$$[u, v, w] = \det \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{pmatrix}.$$

Demostración. Desarrollando el determinante **por la primera fila** (cofactores):

$$\det = u_1(v_2w_3 - v_3w_2) - u_2(v_1w_3 - v_3w_1) + u_3(v_1w_2 - v_2w_1),$$

que es exactamente $u_1(v \times w)_1 + u_2(v \times w)_2 + u_3(v \times w)_3 = u \cdot (v \times w)$ (Definición 5.4.1). (Aquí la mnemotecnía de 5.4.2 muestra su verdad: el “determinante simbólico” es este desarrollo con e_i en lugar de u_i .) ■

Teorema 5.4.7 (volúmenes). $|[u, v, w]|$ es el **volumen del paralelepípedo** de aristas u, v, w . En consecuencia (Álgebra Lineal, Teorema 4.6.11):

$$u, v, w \text{ coplanarios (dependientes)} \iff [u, v, w] = 0.$$

Demostración (volumen). **Caso degenerado primero:** si v, w son dependientes, entonces $v \times w = 0$ (Proposición 5.4.3.3), la “base” tiene área 0, el paralelepípedo está aplastado (volumen 0) y el producto mixto vale $u \cdot 0 = 0$: la igualdad se cumple trivialmente. **Caso v, w independientes:** entonces $n = v \times w \neq 0$ y se puede proceder. Base: el paralelogramo de v, w , de área $\|n\|$ (Teorema 5.4.5). Altura: la componente de u perpendicular a la base, que es la proyección de u sobre la normal n (Proposición 5.4.4): altura $= \|\text{proy}_n u\| = \frac{|u \cdot n|}{\|n\|}$ (Sesión 3 — la división es legítima: $\|n\| \neq 0$). Volumen = base $\times$ altura $= \|n\| \cdot \frac{|u \cdot n|}{\|n\|} = |u \cdot (v \times w)|$. (Coherencia total con “el determinante mide volúmenes” de Álgebra Lineal S6 — aquí lo hemos reconstruido desde la geometría métrica.) ■





Figura 19: Paralelepípedo de aristas u, v, w desde un vértice común: base el paralelogramo de v, w (área $\|v \times w\|$) y altura $\|\text{proy}_n u\|$ con $n = v \times w$; coplanario, se aplasta a un plano (volumen 0).

[ver versión interactiva]

$$\alpha = 1: |[u,v,w]| = 8$$



$$\alpha = 0 \text{ (coplanarios): } |[u,v,w]| = 0$$




Figura 20: Coplanariedad $\iff$ volumen 0: cuando el tercer vector se acerca al plano de los otros dos, el paralelepípedo se aplasta y $|[u, v, w]| \rightarrow 0$.
[ver versión interactiva]

Aplicaciones de cálculo inmediatas: área de un triángulo ($\frac{1}{2}\|u \times v\|$), volumen de un tetraedro ($\frac{1}{6}|[u, v, w]|$ — referencia), tests de alineación y coplanariedad de puntos (formar los vectores diferencia y mirar el rango/determinante).

4.3 Aplicaciones

Método 5.4.8 (la normal y la implícita del plano, en una línea). Plano por P con directores u, v : su **normal** es $n = u \times v$ (perpendicular a ambos, 5.4.4, y no nula por 5.4.3.3 al ser independientes). La ecuación implícita es entonces

$$n \cdot \vec{PX} = 0 \quad \text{es decir} \quad n_1x + n_2y + n_3z = n \cdot P,$$

(un punto X está en el plano exactamente cuando $\vec{PX}$ es dirección, es decir, perpendicular a la normal — Proposición 5.3.12 al revés).




Figura 21: Plano por P con directores u, v y la normal $n = u \times v$ saliendo del plano; un punto genérico X con $\vec{PX}$ contenido en el plano (perpendicular a n).
[ver versión interactiva]

Teorema 5.4.9 (distancia entre rectas cruzadas). Sean $r = P + \text{span}(v)$ y $s = Q + \text{span}(w)$ cruzadas. Entonces

$$d(r, s) = \frac{|[\vec{PQ}, v, w]|}{\|v \times w\|}.$$

Demostración. Como r, s son cruzadas, v, w son independientes y $n = v \times w \neq 0$ es **perpendicular a ambas direcciones**. Para cualesquiera puntos $X = P + \alpha v \in r$ e $Y = Q + \beta w \in s$:

$$\vec{XY} = \vec{PQ} - \alpha v + \beta w \implies \vec{XY} \cdot n = \vec{PQ} \cdot n$$

(los términos en v y w mueren contra n). Es decir: **la componente a lo largo de la normal común es la misma para todo par de puntos**, y vale $\frac{|\vec{PQ} \cdot n|}{\|n\|}$ al normalizar. Ninguna distancia $\|\vec{XY}\|$ puede ser menor que su componente sobre n (proyección, Sesión 3), luego $d(r, s) \geq \frac{|\vec{PQ} \cdot n|}{\|n\|}$; y esa cota **se alcanza** eligiendo α, β que anulen las componentes de $\vec{XY}$ perpendiculares a n (posible: $\{v, w, n\}$ es base de $\mathbb{R}^3$, y las coordenadas de $\vec{PQ}$ en v, w se compensan con α, β). Finalmente $\vec{PQ} \cdot n = \vec{PQ} \cdot (v \times w) = [\vec{PQ}, v, w]$ (Definición 5.4.6). ■

Nótese la pieza por pieza: rectas cruzadas (S2, criterio del determinante), normal (producto vectorial), proyección (S3), producto mixto (5.4.6). **La fórmula es el módulo entero condensado.**

Rectas cruzadas y su normal común (distancia mínima)




Figura 22: Dos rectas cruzadas r, s y el segmento de la normal común que realiza la distancia mínima; al girar la vista se ve que no se cortan.

[ver versión interactiva]

Ejercicios

1. ★ Con $u = (1, 0, 1)$ y $v = (0, 1, 1)$: calcula $u \times v$, comprueba la perpendicularidad con el producto escalar, y halla el **área** del paralelogramo y del triángulo que determinan.
2. ★ Halla la ecuación implícita del plano por $P = (1, 1, 0)$ con directores $u = (1, 0, 1)$, $v = (0, 1, 1)$, vía la normal (Método 5.4.8). Comprueba con un segundo punto del plano.
3. ★ Calcula el volumen del paralelepípedo de aristas $(1, 0, 0)$, $(1, 1, 0)$, $(1, 1, 1)$. Después decide: (a) si los **vectores** $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 4)$, $(3, 4, 5)$ —con origen común— son coplanarios (test del producto mixto); (b) si los **cuatro puntos** $(0, 0, 0)$, $(1, 2, 3)$, $(2, 3, 4)$, $(3, 4, 5)$ son coplanarios (*forma los vectores diferencia desde el primero — y observa que tres puntos siempre son coplanarios: por eso el test de puntos necesita cuatro*).
4. ★ Calcula la **distancia entre las rectas cruzadas** del Ejemplo 5.2.6 (r : eje x ; s : $(0, 0, 1) + t(0, 1, 0)$) con el Teorema 5.4.9, y comprueba que el resultado coincide con la intuición del dibujo (“pasillos en plantas distintas”).
5. Verifica la antisimetría $v \times u = -(u \times v)$ con la Definición 5.4.1 y conéctala con la propiedad del determinante “intercambiar filas cambia el signo” (vía 4.6).

6. Demuestra que $u \times v$ **no es asociativo**: encuentra u, v, w con $(u \times v) \times w \neq u \times (v \times w)$. (*Pista: prueba con vectores de la base canónica.*)
7. Comprueba que el desarrollo formal del “determinante simbólico” (Observación 5.4.2) por la primera fila reproduce la Definición 5.4.1.
8. Sigue el argumento de menores de la prueba de 5.4.3.3 con $u = (1, 2, 4)$ y $v = (2, 4, 9)$: comprueba que son independientes, calcula los **tres** menores 2×2 y observa que el primero (columnas 1,2) **se anula** y aun así $u \times v \neq 0$ — el argumento garantiza *algún* menor no nulo, no el primero.
9. (**Lagrange, guiado.**) Desarrolla $\|u \times v\|^2$ y $\|u\|^2\|v\|^2 - (u \cdot v)^2$ y comprueba que ambos valen $\sum_{i < j} (u_i v_j - u_j v_i)^2$.
10. (**Síntesis del módulo.**) Para $r : (1, 0, 0) + t(1, 1, 0)$ y $s : (0, 1, 1) + t(1, -1, 1)$: decide su posición (S2), y si son cruzadas calcula su distancia (5.4.9); si no, la distancia que corresponda (S3).

Ampliación y referencias

Ampliación (¿por qué solo en $\mathbb{R}^3$?). Un producto bilineal anti-simétrico que devuelva un *vector del mismo espacio* perpendicular a los factores y con la norma del área solo existe en dimensión 3 (y, sorprendentemente, en dimensión 7, vía los octoniones). En dimensión general, el objeto natural no es un vector sino el determinante/las formas alternadas — el producto vectorial es un accidente feliz de $\mathbb{R}^3$. Referencia introductoria: Stillwell, *Naive Lie Theory*, cap. 1, o el survey clásico de Massey, *Cross products of vectors in higher dimensional Euclidean spaces*.

Ampliación (isometrías — el material adicional del módulo). Las **isometrías** son las transformaciones que conservan distancias: traslaciones, giros, reflexiones y sus composiciones. Las lineales tienen matrices con columnas ortonormales, y su determinante es ± 1 : $+1$ conserva la orientación (giros), -1 la invierte (reflexiones) — el broche con la Sesión 6 de Álgebra Lineal. Véase Audin, *Geometry*, cap. II–III, o de Burgos.

Referencias. Producto vectorial y mixto: Hernández, *Álgebra y geometría*; de Burgos. Volúmenes y determinantes: Strang, §5.3; apuntes de Álgebra Lineal, Sesión 6. Distancia entre rectas cruzadas: de Burgos.