

# MATEMÁTICAS

## Reglas de Derivación

Prof. Dr. Jorge Crespo Álvarez

## Aprender a derivar funciones reales de una variable mediante Reglas de Derivación



- Reglas de derivación. Tabla de Derivadas
- Derivación implícita
- Aproximaciones lineales
- Teoremas
- Formas indeterminadas y Regla de L'Hôpital

# Reglas de Derivación

Aunque se pueden calcular derivadas mediante la definición, este procedimiento resulta muy tedioso. Es por eso que en la presente clase se presentarán reglas de derivación que nos permitirán calcular derivadas sin necesidad de aplicar directamente la definición.

**4 Definición** La derivada de una función  $f$  en un número  $a$ , denotada por  $f'(a)$ , es

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}$$

si este límite existe.

# Reglas de Derivación

## Derivada de una función constante

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

**Regla de la potencia (versión general)** Si  $n$  es cualquier número real, entonces

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

**Regla del múltiplo constante** Si  $c$  es una constante y  $f$  es una función derivable, entonces

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = c \frac{d}{dx}f(x)$$

# Reglas de Derivación

[www.uneatlantico.es](http://www.uneatlantico.es)

**Regla de la suma** Si  $f$  y  $g$  son derivables, entonces

$$\frac{d}{dx} [f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx} f(x) + \frac{d}{dx} g(x)$$

**Regla de la diferencia** Si tanto  $f$  como  $g$  son derivables, entonces

$$\frac{d}{dx} [f(x) - g(x)] = \frac{d}{dx} f(x) - \frac{d}{dx} g(x)$$

**Regla del producto** Si  $f$  y  $g$  son derivables, entonces

$$\frac{d}{dx} [f(x)g(x)] = f(x) \frac{d}{dx} [g(x)] + g(x) \frac{d}{dx} [f(x)]$$

# Reglas de Derivación

**Regla del cociente** Si  $f$  y  $g$  son derivables, entonces

$$\frac{d}{dx} \left[ \frac{f(x)}{g(x)} \right] = \frac{g(x) \frac{d}{dx} [f(x)] - f(x) \frac{d}{dx} [g(x)]}{[g(x)]^2}$$

**Regla de la cadena** Si  $g$  es derivable en  $x$  y  $f$  es derivable en  $g(x)$ , entonces la función compuesta  $F = f \circ g$  definida mediante  $F(x) = f(g(x))$  es derivable en  $x$ , y  $F'$  está dada por el producto

$$F'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

En la notación de Leibniz, si  $y = f(u)$  y  $u = g(x)$  son funciones derivables, entonces

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

# Reglas de Derivación

## Ejemplo:

Encuentre la derivada de las siguientes funciones:

a)  $f(x) = 3$

b)  $f(x) = x^2$

c)  $f(x) = 3x^2$

d)  $f(x) = x^2 + 1$

e)  $f(x) = x^2(x^2 - 1)$

f)  $f(x) = \frac{x^2}{x^2+1}$

g)  $f(x) = \sqrt{x^2 - 1}$

# Tablas de Derivadas

## FÓRMULAS GENERALES

$$1. \frac{d}{dx}(c) = 0$$

$$3. \frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = f'(x) + g'(x)$$

$$5. \frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x)g'(x) + g(x)f'(x) \quad (\text{Regla del producto})$$

$$7. \frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x) \quad (\text{Regla de la cadena})$$

$$2. \frac{d}{dx}[cf(x)] = cf'(x)$$

$$4. \frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = f'(x) - g'(x)$$

$$6. \frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)f'(x) - f(x)g'(x)}{[g(x)]^2} \quad (\text{Regla del cociente})$$

$$8. \frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1} \quad (\text{Regla de potencias})$$

## FUNCIONES EXPONENCIALES Y LOGARÍTMICAS

$$9. \frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

$$11. \frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{1}{x}$$

$$10. \frac{d}{dx}(a^x) = a^x \ln a$$

$$12. \frac{d}{dx}(\log_a x) = \frac{1}{x \ln a}$$

## FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

$$13. \frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$$

$$14. \frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$$

$$15. \frac{d}{dx}(\tan x) = \sec^2 x$$

$$16. \frac{d}{dx}(\csc x) = -\csc x \cot x$$

$$17. \frac{d}{dx}(\sec x) = \sec x \tan x$$

$$18. \frac{d}{dx}(\cot x) = -\csc^2 x$$



# Derivación Implícita


Las funciones que se han encontrado hasta ahora se pueden describir expresando una variable explícitamente en términos de la otra variable, por ejemplo,

$$y = \sqrt{x^3 + 1} \quad \text{o} \quad y = x \sin x$$


o, en general,  $y = f(x)$ . Sin embargo, algunas funciones se definen implícitamente por medio de una relación entre  $x$  y  $y$  como

1


$$x^2 + y^2 = 25$$



(a)  $x^2 + y^2 = 25$



(b)  $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$



(c)  $g(x) = -\sqrt{25 - x^2}$

Por fortuna, no es necesario resolver una ecuación para  $y$  en términos de  $x$  para determinar la derivada de  $y$ . En lugar de ello, se aplica el **método de derivación implícita**.

# Derivación Implícita

## Ejemplo:

a) Si  $x^2 + y^2 = 25$ , encuentre  $\frac{dy}{dx}$ .

b) Encuentre  $\frac{dy}{dx}$  si  $x^3 + y^3 = 6xy$

# Aproximaciones Lineales

1


$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

se conoce con el nombre de **aproximación lineal** o **aproximación de la recta tangente** de  $f$  en  $a$ . A la función lineal cuya gráfica es esta recta tangente, es decir,

2

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

se le llama **linealización** de  $f$  en  $a$ .



# Aproximaciones Lineales

1


$$f(x) \approx f(a) + f'(a)(x - a)$$

se conoce con el nombre de **aproximación lineal** o **aproximación de la recta tangente** de  $f$  en  $a$ . A la función lineal cuya gráfica es esta recta tangente, es decir,

2

$$L(x) = f(a) + f'(a)(x - a)$$

se le llama **linealización** de  $f$  en  $a$ .



# Aproximaciones Lineales

[www.uneatlantico.es](http://www.uneatlantico.es)

## Ejemplo:

Encuentre la linealización de la función  $f(x) = \sqrt{x+3}$ , en  $a = 1$  y úsela para obtener una aproximación de los números  $\sqrt{3,98}$  y  $\sqrt{4,05}$ .


# Teoremas

**1 Definición** Sea  $c$  un número en el dominio  $D$  de una función  $f$ . Entonces  $f(c)$  es el

- valor **máximo absoluto** de  $f$  sobre  $D$  si  $f(c) \geq f(x)$  para toda  $x$  en  $D$ .
- valor **mínimo absoluto** de  $f$  sobre  $D$  si  $f(c) \leq f(x)$  para toda  $x$  en  $D$ .




**2 Definición** El número  $f(c)$  es un

- valor **máximo local** de  $f$  si  $f(c) \geq f(x)$  cuando  $x$  está cerca de  $c$ .
- valor **mínimo local** de  $f$  si  $f(c) \leq f(x)$  cuando  $x$  está cerca de  $c$ .




# Teoremas

**3 Teorema del valor extremo** Si  $f$  es continua sobre un intervalo cerrado  $[a, b]$ , entonces  $f$  alcanza un valor máximo absoluto  $f(c)$  y un valor mínimo absoluto  $f(d)$  en algunos números  $c$  y  $d$  en  $[a, b]$ .



**4 Teorema de Fermat** Si  $f$  tiene un máximo o un mínimo local en  $c$ , y si  $f'(c)$  existe, entonces  $f'(c) = 0$ .




# Teoremas


**Teorema de Rolle** Sea  $f$  una función que satisface las tres hipótesis siguientes:

1.  $f$  es continua sobre el intervalo cerrado  $[a, b]$ .
2.  $f$  es derivable sobre el intervalo abierto  $(a, b)$ .
3.  $f(a) = f(b)$ .


Entonces hay un número  $c$  en  $(a, b)$  tal que  $f'(c) = 0$ .



(b)



(c)



(d)



# Teoremas

**Teorema del valor medio** Si  $f$  es una función que satisface las hipótesis siguientes:



1.  $f$  es continua sobre el intervalo cerrado  $[a, b]$ .
2.  $f$  es derivable sobre el intervalo abierto  $(a, b)$ .

Entonces existe un número  $c$  en  $(a, b)$  tal que

**1** 
$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

o en forma equivalente

**2** 
$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$



# Teoremas

## Ejemplo:

- a) Investigue si se puede aplicar el Teorema de Rolle a la siguiente función  $f(x) = \sqrt{1 - x^2}$  en el intervalo  $[-1, 1]$ .
- b) Aplique el Teorema del valor medio de Lagrange a la función en el intervalo  $[0, 1]$ .

# Formas Indeterminadas. Regla de L'Hôpital

[www.uneatlantico.es](http://www.uneatlantico.es)

**Regla de L'Hôpital** Suponga que  $f$  y  $g$  son derivables y  $g'(x) \neq 0$  sobre un intervalo abierto  $I$  que contiene  $a$  (excepto posiblemente en  $a$ ). Suponga que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

o que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty$$

(En otras palabras, se tiene una forma indeterminada de tipo  $\frac{0}{0}$  o  $\infty/\infty$ .) Entonces

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

si existe el límite del lado derecho (o es  $\infty$  o  $-\infty$ ).

# Formas Indeterminadas. Regla de L'Hôpital

[www.uneatlantico.es](http://www.uneatlantico.es)

## Ejemplo:

Calcule los siguientes límites:

$$a) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$$

# Formas Indeterminadas. Regla de L'Hôpital

[www.uneatlantico.es](http://www.uneatlantico.es)

## ■ Productos indeterminados

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$  (o  $-\infty$ ), entonces no es claro cuál es el valor de  $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)]$  si existe. Hay una lucha entre  $f$  y  $g$ . Si gana  $f$ , la respuesta será 0; si gana  $g$ , la respuesta será  $\infty$  (o  $-\infty$ ). O puede haber un comportamiento intermedio donde la respuesta es un número finito distinto de cero. Este tipo de límite se llama **forma indeterminada de tipo  $0 \cdot \infty$** , y se puede abordar expresando el producto  $fg$  como un cociente:

$$fg = \frac{f}{1/g} \quad \text{y} \quad fg = \frac{g}{1/f}$$

Esto convierte el límite dado en una forma indeterminada de tipo  $\frac{0}{0}$  o  $\frac{\infty}{\infty}$  por lo que se puede utilizar la regla de L'Hôpital.

# Formas Indeterminadas. Regla de L'Hôpital

[www.uneatlantico.es](http://www.uneatlantico.es)

## ■ Diferencias indeterminadas

Si  $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$  y  $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty$ , entonces el límite

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)]$$

se llama **forma indeterminada de tipo  $\infty - \infty$** . Una vez más hay una contienda entre  $f$  y  $g$ . ¿La respuesta será  $\infty$  (gana  $f$ ) o será  $-\infty$  (gana  $g$ ) o habrá un término intermedio en un número finito? Para encontrarlo, se intenta convertir la diferencia en un cociente (por ejemplo, utilizando un común denominador, racionalizando o factorizando un factor común), de manera que se tiene una forma indeterminada del tipo  $\frac{0}{0}$  o  $\frac{\infty}{\infty}$ .

# Formas Indeterminadas. Regla de L'Hôpital

www.uneatlantico.es

## ■ Potencias indeterminadas

Hay varias formas indeterminadas que surgen del límite

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^{g(x)}$$

$$1. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \quad \text{tipo } 0^0$$

$$2. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty \quad y \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0 \quad \text{tipo } \infty^0$$

$$3. \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 1 \quad y \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \pm\infty \quad \text{tipo } 1^\infty$$

Cada uno de estos tres casos se puede tratar ya sea tomando el logaritmo natural:

$$\text{sea } y = [f(x)]^{g(x)}, \quad \text{entonces } \ln y = g(x) \ln f(x)$$

o expresando la función como una exponencial:

$$[f(x)]^{g(x)} = e^{g(x) \ln f(x)}$$

# Formas Indeterminadas. Regla de L'Hôpital

[www.uneatlantico.es](http://www.uneatlantico.es)

## Ejemplo:

Calcule los siguientes límites:

a)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$

b)  $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x - x$

c)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^x$





Universidad  
Europea  
del Atlántico

[www.uneatlantico.es](http://www.uneatlantico.es)