

Introducción

Modelo de optimización: Asignación de personal por turnos

Conjuntos e índices

- \mathcal{P} : conjunto de trabajadores (personas), índices $p \in \mathcal{P}$.
- \mathcal{D} : conjunto de días del horizonte $\{1, \dots, H\}$, índice $d \in \mathcal{D}$.
- \mathcal{T} : conjunto de turnos $\{m, t, n\}$ (mañana, tarde, noche), índice $t \in \mathcal{T}$.
- \mathcal{W} : conjunto de semanas $\{1, \dots, W\}$, índice $w \in \mathcal{W}$,

donde H es el número total de días (el horizonte, comienza en lunes) y $W = \lceil H/7 \rceil$ es el número de semanas completas/partes de semana en el horizonte. Definimos la aplicación $\omega(d) = \lceil \frac{d}{7} \rceil$ que asigna cada día d a su semana $\omega(d)$. Los días se enumeran con lunes = 1, martes = 2, ..., domingo = 7, luego lunes = 8, etc.

Parámetros

- $\text{dem}_{d,t} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$: demanda (personal requerido) en el día d y turno t .
- $s_{p,d,t} \in \{0, 1, \dots, 10\}$: puntaje de disposición del trabajador p para (d, t) .

Variables

- $x_{p,d,t} \in \{0, 1\}$: 1 si el trabajador p está asignado el día d en el turno t , 0 en otro caso.
- $y_{p,w} \in \{0, 1\}$: 1 si el trabajador p trabaja al menos un turno en el fin de semana de la semana w , 0 si no.

Función objetivo

Maximizar la disposición total del personal asignado:

$$\max Z = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{d \in \mathcal{D}} \sum_{t \in \mathcal{T}} s_{p,d,t} x_{p,d,t}.$$

Restricciones

1. Cobertura por día-turno (cumplir la demanda):

$$\forall d \in \mathcal{D}, \forall t \in \mathcal{T} : \sum_{p \in \mathcal{P}} x_{p,d,t} \geq \text{dem}_{d,t}. \quad (\text{R1})$$

2. Ningún trabajador puede hacer más de dos turnos en el mismo día:

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall d \in \mathcal{D} : \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{p,d,t} \leq 2. \quad (\text{R2})$$

3. Prohibición de turno noche seguido por turno mañana al día siguiente:

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall d \in \{1, \dots, H-1\} : \quad x_{p,d,n} + x_{p,d+1,m} \leq 1. \quad (\text{R3})$$

4. Definición de “fin de semana trabajado” y vinculación con $y_{p,w}$:
Sea el conjunto de días del fin de semana en la semana w :

$$\mathcal{D}_{\text{wk}}(w) = \{d \in \mathcal{D} : \omega(d) = w \text{ y } d \text{ es sábado o domingo}\}.$$

(Con la numeración que usamos, los días con residuo modulo 7 iguales a 6 y 0 corresponden a sábado y domingo respectivamente.)

Para forzar que $y_{p,w} = 1$ si y sólo si la persona trabaja al menos un turno en ese fin de semana, podemos imponer:

$$\begin{aligned} \forall p \in \mathcal{P}, \forall w \in \mathcal{W} : \quad & \sum_{d \in \mathcal{D}_{\text{wk}}(w)} \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{p,d,t} \geq y_{p,w}, \\ & \forall d \in \mathcal{D}_{\text{wk}}(w), \forall t \in \mathcal{T} : \quad x_{p,d,t} \leq y_{p,w}. \end{aligned} \quad (\text{R4})$$

La primera desigualdad garantiza que si hay alguna asignación en el fin de semana entonces $y_{p,w}$ puede ser 1 (y debe ser 1 si forzamos integridad por minimización de costos; sin embargo, dado que maximizamos la disposición, esta forma asegura coherencia). La segunda (o alternativamente $y_{p,w} \leq \sum_{d \in \mathcal{D}_{\text{wk}}(w)} \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{p,d,t}$) impide que $y_{p,w} = 1$ si no hay asignaciones en ese fin de semana. (Si prefieres una sola forma compacta, usar $y_{p,w} \leq \sum_{d \in \mathcal{D}_{\text{wk}}(w)} \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{p,d,t}$ y $\sum_{d \in \mathcal{D}_{\text{wk}}(w)} \sum_{t \in \mathcal{T}} x_{p,d,t} \leq M y_{p,w}$ con $M = 2$ o un M grande también es común.)

5. No se permiten tres fines de semana consecutivos trabajados por la misma persona:

$$\forall p \in \mathcal{P}, \forall w \in \{1, \dots, W-2\} : \quad \sum_{k=0}^2 y_{p,w+k} \leq 2. \quad (\text{R5})$$

6. Dominios de las variables:

$$\forall p, d, t : \quad x_{p,d,t} \in \{0, 1\}, \quad \forall p, w : \quad y_{p,w} \in \{0, 1\}. \quad (\text{R6})$$

Observaciones adicionales y variantes

- Si se desea evitar sobredotación (asignar más personal del estrictamente necesario), se puede reemplazar la restricción (R1) por igualdad $\sum_p x_{p,d,t} = \text{dem}_{d,t}$ o añadir un parámetro $\text{cap}_{d,t}$ y forzar $\text{dem}_{d,t} \leq \sum_p x_{p,d,t} \leq \text{cap}_{d,t}$.
- La vinculación de $y_{p,w}$ con los turnos de sábado/domingo puede escribirse con una sola pareja de desigualdades compactas:

$$y_{p,w} \leq \sum_{d \in \mathcal{D}_{\text{wk}}(w)} \sum_t x_{p,d,t}, \quad \sum_{d \in \mathcal{D}_{\text{wk}}(w)} \sum_t x_{p,d,t} \leq M y_{p,w},$$

con M un entero mayor o igual al número máximo de turnos que un trabajador puede cubrir en el fin de semana (ej. $M = 4$ si se aceptan hasta 2 turnos por día y hay 2 días = 4).

- Si se requiere modelar preferencia por balance (p. ej. que nadie exceda mucho las horas totales), se pueden agregar restricciones de carga total por persona: $\sum_{d,t} x_{p,d,t} \leq U_p$ y $\geq L_p$.

Breve descripción (resumen)

- **Función objetivo:** maximizar la suma de puntajes de disposición $s_{p,d,t}$ sobre las asignaciones realizadas, favoreciendo así que las personas sean asignadas a los días/turnos donde están más dispuestas.
- **R1 (Cobertura):** asegura que en cada día y turno se cubre la demanda proyectada.
- **R2 (Máximo 2 turnos/día):** evita que un trabajador haga más de dos turnos en un mismo día.
- **R3 (Descanso noche→mañana):** prohíbe asignar a la misma persona la noche de un día y la mañana del siguiente para reducir fatiga.
- **R4 (Fin de semana trabajado):** introduce la variable binaria $y_{p,w}$ que indica si la persona trabaja el fin de semana de la semana w , y la vincula con las asignaciones de sábado y domingo.
- **R5 (No 3 fines de semana consecutivos):** impide que una misma persona trabaje tres fines de semana seguidos (ventana deslizante sobre semanas).