

分位数: $t_{0.975}(19) = 2.093$, $t_{0.975}(15) = 2.131$.

一、填空题 (每空 3 分, 共 42 分)

1. 设 A 、 B 为两事件, 且 $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$, $P(A \cup B) = 0.4$, 那么

$P(A - B) =$ (1)。

2. 设 10 件产品中有 2 件次品, 8 件正品, 现每次从中任取一件产品, 且取出后不放回, 试求第二次取到正品的概率为 (2); 若已知第二次取到次品, 则第一次也取到次品的概率为 (3)。

3. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} cx, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2} \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, 则常数 c 的取值

为 (4), $P\{|X| < 2\} =$ (5)。令 $Y = \sin X$, 则随机变量 Y 的密度函数

五、(12 分) 如果一个矩形的宽与长的比为 0.618, 那么它会给人们一种良好的感觉。某工艺品厂生产的矩形工艺品框架的宽与长之比服从正态分布, 现在随机抽取 25 个, 测得其比值的平均值与标准差分别为 $\bar{x} = 0.65$, $s = 0.08$ 。试问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下能否认为这种矩形工艺品宽与长之比的均值为 0.618?

六、(6 分) 设 $0 < P(B) < 1$, $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 证明事件 A 与 B 独立。

4. 设指数分布随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda) (\lambda > 0)$, 则 $P\left\{\left|X - \frac{1}{\lambda}\right| < \frac{3}{\lambda}\right\} \geq \underline{(7)}$ 。
5. 设随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 2; 4, 9; 0)$, 令 $U = X + Y$, $V = X - Y$, 则 $E(2X + Y - 2)^2 = \underline{(8)}$, $\rho(U, V) = \underline{(9)}$ 。
6. 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是来自分布 $P(\lambda)$ 的一个样本, S^2 为样本方差, 求期望 $E(S^2) = \underline{(10)}$ 。
7. 设 (X_1, X_2, \dots, X_n) 是来自总体 $B(n, p)$ 的样本, 试求样本均值的期望为 $E(\bar{X}) = \underline{(11)}$ 。
8. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$, X_1, X_2, \dots, X_n 为来自总体的一组样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 若 $\frac{1}{k} \bar{X} + k \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 是 σ^2 的无偏估计, 则 $k = \underline{(12)}$ 。
9. 设总体 $X \sim N(0, 1)$, 从总体取出一个容量为 6 的样本 X_1, X_2, \dots, X_6 , 设 $Y = (X_1 + X_2 + X_3)^2 + (X_4 + X_5 + X_6)^2$, 则当常数 $C = \underline{(13)}$ 时, 随机变量 CY 服从 χ^2 分布。
10. 设某产品的性能指标 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 现随机抽取 16 个产品进行检测, 检测后经计算得这些产品性能指标均值 $\bar{x} = 5.21$, 方差 $s^2 = 0.0049$, 试求 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为 $\underline{(14)}$ 。

二、(12分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$X \setminus Y$	-1	0	1
-1	a	0	0.2
0	0.1	b	0.2
1	0	0.1	c

其中 a, b, c 为常数, 且 X 的数学期望 $EX = -0.2$, $P\{Y \leq 0 | X \leq 0\} = 0.5$, 记 $Z = X + Y$, 求:

(1) a, b, c 的值; (2) Z 的概率分布; (3) 求 $P\{X = Z\}$ 。

三、(16分) 设随机变量 (X, Y) 的联合密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} k - x - y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

(1) 求 k ;

(2) 求 (X, Y) 的边缘密度函数, 问 X 和 Y 是否独立, 为什么?

(3) 求 $Z = X + Y$ 的密度函数 $f_Z(z)$ 。

四、(12分) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \sqrt{\theta} x^{\sqrt{\theta}-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases} (\theta > 0)$$

其中参数 θ 未知, x_1, x_2, \dots, x_{16} 是来自 X 的一组样本值, 且有 $\sum_{i=1}^{16} x_i = 9.6$,

$\sum_{i=1}^{16} \ln x_i = -11.2$ 。求:

(1) 参数 θ 的矩估计值; (2) 参数 θ 的极大似然估计值。